





























G. P. Frutner fecit.



*60*  
*239*  
*Frescob. sub no. 772. fol. 14.*

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI  
F V N G O R V M

QVI IN  
BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA  
RATISBONAM

NASCUNTVR  
I C O N E S  
NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE

EDITIO NOVA

COMMENTARIO AVCTA

A  
DR. C. H. PERSOON.



TOMVS TERTIVS.

ERLANGAE

APVD IOANNEM IACOBVM PALMIVM  
MDCCC.







KÖNIGL.  
LANDTHERAPIE-ANSTALT  
HAMBURG  
1875.

AGARICI  
Blätterschwämme.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE PRIMAE.

AGARICVS NONAGESIMVS.

Est fungus hydrophorus, tricolor, plerumque solitarius, fistulosus, carne destitutus, per aetatem varius; pileo ab initio cylindraceo, post campaniformi, ad oram fissò, lacerrato, reuoluto, lineolis secundum longitudinem exarato; petiolo longo, cylindraceo, quasi contorto, radicem versus crassiori; velo & annulo destitutus. *Bauaris* nomen est nullum.

- Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo campaniformi, oram versus fissò.  
 Fig. II. Par fungorum radicem versus connatorum; quorum maior explicatus, pileo ad oram reuoluto, minor explicari incipiens.  
 Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
 Fig. IV. V. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und ersten Kupfertafel.

Der neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger meist einzelner, hohler, unfleischiger, und dem Alter nach abänderlicher Wassertschwamm; mit einem anfangs walzigen, nachhero glockigen, am Rande gespaltenen, zerrissenen, aufgerollten, und nach der Länge herab linirten Hute; mit einem langen, runden, gleichsam gewundenen, und unten dicken Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit glockigen, am Rande gespaltenem Hute.  
 Fig. II. Ein paar unten zusammengewachsene Schwämme; davon der grössere entwickelt ist, und einem an Rande aufgerollten Hut hat; der kleinere aber sich zu entwickeln anfängt.  
 Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
 Fig. IV. V. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCI.



St. Leibel pax. R.

I. M. Frölich sc. Ruc.

*Agaricus tortus.*  
*Agaricus rufo-candicans* Schaaff.  
*Coprinus cylindricus* var.

216  
 237





Fig. III.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.

S. L. R.

L. A. F. & R.

*Agaricus acuminatus*, v. *fr.* Robt 3360  
*Agaricus papilionaceus* Bull. 561 Robt 3362

Robert



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SECVNDAE.  
 AGARICVS NONAGESIMVS PRIMVS.

Est fungus tricolor, solitarius, cauus, carne destitutus, parum varius; pileo tenui, campaniformi, acuminato, apice truncato; petiolo longo, tenui, recto vel curuato, fistuloso, ad radicem bulboso; nec velum nec annulum habens. *Bavari* nomen nesciunt.

- Fig. I. Fungus explicatus minor; pileo ad oram singulari modo formato, rotunde exciso et perforato.  
 Fig. II. Fungus explicatus maior; pileo ad oram lacerato.  
 Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
 Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
 Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwoten Kupfertafel.

Der ein und neunzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfarbiger, einzelner, hohler, unfleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem zarten, glodigen, spitzig zulaufenden und oben abgestutzten Hute; mit einem langen, zarten, geraden oder gekrümmten, hohlen und unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein kleiner entwickelter Schwamm; mit einem am Rande sonderbar gebildeten, rundlich ausgeschnittenen und gelöcherten Hute.  
 Fig. II. Ein grösserer entwickelter Schwamm; mit einem am Rande zerrissenen Hute.  
 Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
 Fig. VI. Ein senkrecht geschnittener Schwamm.  
 Fig. V. VI. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TERTIAE.

AGARICVS NONAGESIMVS SECVNDVS.

Est fungus bicolor, solitarius, cauus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globofo, post hemisphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, recto vel varie curuato, apice crassiori, radicibus tenuissimis saepe donato; annulo & velo carens. In *Bauaria* nomen deest.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo planiusculo; petiolo hinc inde curuato, radicato.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo globofo; petiolo curuato.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo in centro depresso; petiolo fere recto.

Fig. IV. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert und dritten Kupfertafel.

Der zwey und neunzigste Blatterschwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, einfacher, hohler wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, und endlich flachen Hute; mit einem runden, geraden und mannigfaltig gekrümmten, unten dicken und zart bewurzelten Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem etwas flachen Hute; mit einem geschlängelten und bewurzelten Stiele.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute, und gekrümmten Stiele.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten vertieften Hute, und einem fast geraden Stiele.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Sc. L. pinx. R.

L. M. F. po. R.

*Agaricus pasellus.*

*pediculus. v. R. Abb. 3490*





*Agaricus olivaceus. Boletus olivaceus, var. h.*  
comp. 5. 214. 18.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVARTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS TERTIVS.

Est fungus tricolor, solitarius, factus, carnosus, varius; pileo ab initio globofo, post hemisphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, apicem versus crassiori; nec velo, nec annulo, nec nomine, in *Bauaria* gaudens.

- Fig. I. Fungus parum explicatus; pileo hemisphaerico.  
Fig. II. Fungus parum explicatus; pileo reniformi.  
Fig. III. Fungus explicatus; pileo planiusculo, ad oram reuoluto.  
Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo ad apicem mamillano.  
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. VI. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierten Kupfertafel.

Der drey und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist ein dreyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, und endlich flachen Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit halbkugelrundem Hute.  
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit nierenartigen Hute.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, am Rande aufgerolltem Hute.  
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit einem oben bewarzten Hute.  
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterseite.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS QVARTVS.

Est fungus bicolor, & simplex & multiplex, fistulosus, carne destitutus, varius; pileo ante explicationem conico, post eam campaniformi, plano, saepe fissò & lacerato; petiolo cylindraceo, ad radicem crassiori; velo, annulo, & nomini in *Bauaria*, nullo.

Fig. I. Par fungorum ad radicem connatorum; quorum minor pileo conico, integro; maior campaniformi, fissò.

Fig. II. Fasciculus fungorum, pileis variae explicationis.

Fig. III. Fungus explicatus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen nativus et auctus.

Erklärung der zweyhundert und fünften Kupfertafel.

Der vier und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, hohler, unfleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem vor der Entwicklung kegelförmigen, nach der Entwicklung glockigen, flachen, oft gespaltenen und zerissenen Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar unten zusammengewachsene Schwämme; davon der kleinere einen kegelförmigen und ganzen, der grössere einen glockigen, gespaltenen Hut hat.

Fig. II. Ein Büschel Schwämme, mit Hüten von verschiedener Entwicklung.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCV.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



St. L. p. R.

I. G. F. & R.

*Agaricus farinulentus.*  
*Agaricus cornutus*, Horn. v. *St. L. 3390*



Tab. CCVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig.

II.



Fig. IV.



St. L. p. E.

Fig. VI.



I. G. F. sc. R.

*Agaricus alectorolophus.*

*Cantharellus aurantiaceus.*

1861.3190.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS QVINTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo plerumque difformi, plano vel infundibuliformi, varie ad oram exciso; petiolo recto, radicem versus tenuiori, saepe curuato; velum, annulus & nomen in *Bauaria* desideratur.

Fig. I. Par fungorum singulari modo connatorum.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo fere plano.

Fig. III. IV. Fungi euoluti, variae figurae.

Fig. V. Fungus explicatus quoad faciem inferiorem seu posteriorem.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VII. VIII. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und sechsten Kupfertafel.

Der fünf und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist ein solcher einfärbiger, einzelner, voller, fleischiger und abänderlicher Schwamm; mit einem meist ungestalten, flachen und trichterförmigen, am Rande verschieden eingeschnittenen Hute; mit einem geraden, nach unten zu dünnern, oft gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar auf eine besondere Art zusammengewachsene Schwämme.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit fast flachem Hute.

Fig. III. IV. Entwickelte Schwämme, von verschiedener Gestalt.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTIMAE.  
 AGARICVS NONAGESIMVS SEXTVS.

Est fungus unicolor, & simplex & multiplex, farctus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post conico, campaniformi, plano, saepe infundibuliformi, integro vel fisso; petiolo cylindraceo, radicem versus & tenuiori & crassiori; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen habet nullum.

- Fig. I. Fasciculus fungorum diuersae explicationis & figurae.  
 Fig. II. Fungus explicatus; pileo quasi tripetalo.  
 Fig. III. Par fungorum, quorum alter pileo plano, alter infundibuliformi.  
 Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
 Fig. V. Par fungorum vix explicatorum, multa aqua imbutorum, hinc colore mutato.  
 Fig. VI. VII. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und siebenten Kupfertafel.

Der sechs und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist ein einfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, voller, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelfunden, nachhero keglichen, glockigen, flachen, oft trichterigen, ganzen, oder gespaltenen Hute; mit einem runden, nach unten zu bald dünnern, bald dickeren Stiele. Ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme von verschiedener Entwicke lung und Aussehen.  
 Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gleichsam dreyblättrigem Hute.  
 Fig. III. Ein Paar Schwämme; davon der eine einen flachen, der andere einen trichterförmigen Hut hat.  
 Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
 Fig. V. Ein Paar unentwickelte Schwämme, die von dem stark angesaugten Wasser die Farbe geändert haben.  
 Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCVII.

Fig. I.




Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



St. L. p. R.

I. G. Esc. R.

*Agaricus umbilicatus*. Abb. 3709

89 256



Fig. I.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. II.

Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig.

VII.

St. L. pinæ. R.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus hypticus.*  
*Agaricus semipetiolatus, Sch.*  
*Panus hypticus, v. B.*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS NONAGESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus vnicolor, & simplex & multiplex, farctus, vix carnosus, valde varius & ex loco natali lignarius; pileo fere semper alio, plano, infundibuliformi, varie exciso & inciso; petiolo rotundo, inuerse conico, recto vel curuo; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nomine nullo.

- Fig. I. Fungi variae figurae, ligno insidentes.  
Fig. II. Fungus explicatus; pileo varie inciso.  
Fig. III. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. V. VI. VII. Fungi pileis perpendicularibus, incertae figurae.  
Fig. VIII. IX. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert und achten Kupfertafel.

Der sieben und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, so wohl einfacher als vielfacher, voller, wenig fleischiger, sehr veränderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit andern, flachen, trichterförmigen, verschieden aus- und eingeschnittenen Hute; mit einem runden, umgekehrt kegelförmigen, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Schwämme von verschiedener Gestalt, und wie sie dem Holze ansehn.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit einem verschieden eingeschnittenen Hute.  
Fig. III. Der vorige Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. V. VI. VII. Schwämme mit senkrechten und verschieden gebildeten Hüten.  
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAE.

AGARICVS NONAGESIMVS OCTAVVS.

Est fungus lignarius, bicolor, solitarius, fæctus, carnosus, varius; pileo, ab initio conico, post campaniformi, denique plano, semper piloso; petiolo rotundo, semper fere curuo; velo membranaceo, & annulo saepe spurio donatu. In *Bauaria* nomine caret.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo fere plano, pilose-squamoso.  
Fig. II. Fungus difformis, fere tripetalus.  
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo conico; velo adhuc integro.  
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VI. VII. Pollen natius & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunten Kupfertafel.

Der acht und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Holzschwamm; mit einem anfangs kegelligen, hernach glockigen, und endlich flachen, allezeit haarigen Hute; mit einem runden, fast allezeit frumgebogenen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und einem manchmal unächten Ringe. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit einem fast flachen und haarigschuppigen Hute.  
Fig. II. Ein ungefalteter, gleichsam dreyblättriger, Schwamm.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegeligem Hute und ganzer Saamendecke.  
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCIX.

Fig. I.



Fig. VI.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



St. L. pinc.

Fig. VII.




L.G. Esc. R.

*Agaricus filamentosus.*

*Agaricus aurivellus*, Vossch. v. Sch. Nth. 3512.



Tab. CCX.



St. Lohol. pinx. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

*Agaricus helvolus* *Ann.* 3529.  
*Agaricus helvolus* *Fr.*



AGARICVS NONAGESIMVS NONVS.

Est fungus hydrophorus, bicolor, fistulosus, non carnosus, parum varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, raro plano; petiolo longo, gracili, recto vel curuato; velo & annulo priuatus. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico, acuminato.  
 Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
 Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
 Fig. IV. Pollen natiuus.  
 Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und zehenden Kupfertafel.

Der neun und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, hohler, unfleischiger, wenig abänderlicher Wassertschwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachher glockigen, sehr selten flachen Hute; mit einem langen, dünnen, geraden, oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem und spizig zulaufendem Hute.  
 Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
 Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
 Fig. IV. Der natürliche Saamenschwamm.  
 Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VNDECIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS.

Est fungus hydrophorus, tenuis, fistulosus, vix carnosus, parum varius; pileo conico, post campaniformi, semper striis longitudinalibus notato; petiolo tenuiori, rotundo, recto vel varie curuato; nec velum nec annulum habens. *Bauari* nomen nesciunt.

- Fig. I. Fasciculus fungorum variae figurae & euolutionis.  
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und eilften Kupfertafel.



Der hundertste Blätterschwamm.

Es ist ein zarter, hohler, kaum fleischiger, wenig abänderlicher Wassertschwamm; mit einem kegelförmigen, nachher gloekförmigen, allezeit längs herunter laufenden Hute; mit einem zarten, runden, geraden, oder auf manche Art gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme von verschiedener Gestalt und Entwicklung.  
Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterseite.  
Fig. III. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-





Sc. L. p. B.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus disseminatus.*  
*Agaricus pallidescens, St.*  
*gymnopus 3376*





St. Louis, pinx. R.

I. G. F. R.

*Agaricus infundibuliformis.* n. 4. 252

*Ag. gibbus* Rabenh. 3848.



AGARICVS CENTESIMVS PRIMVS.

Est fungus bicolor, fere vnicolor, solitarius, farctus, non car-  
nosus, parum varius; pileo prope semper infundibuliformi;  
petiolo rotundo, ad radicem crassiori; velo & annu-  
lo nullo. In *Bauaria* nomen deest.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.  
Fig. II. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus explicatus, pileo planiusculo.  
Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. V. Pollen natiuus.  
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwölften Kupfertafel.

Der hundert und erste Blätterchwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast einfärbiger, einzelner, voller, unflei-  
schiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem fast allezeit trich-  
terigen Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Sa-  
mendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit trichterigem Hute.  
Fig. II. Der vorige Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit fast flachem Hute.  
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS SECVNDVS.

Est fungus bicolor, sessilis, fere tremulans, non carnosus, incertissimae & semper variae figurae; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen ignotum.

- Fig. I. Fungus, quasi alatus, seu aurem referens.  
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. — VIII. Varietates huius fungi.  
Fig. IX. X. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und dreyzehenden Kupfertafel.

Der hundert und zweyte Blätterschwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, fast zitternder, unfleischiger Schwamm, ohne Stiel und von gänzlich unbestimmter Gestalt. Hat weder Saamen, weder, noch Ring, noch auch einen Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein gleichsam gestügelter oder ohrähnlicher Schwamm.  
Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. — VIII. Abänderungen dieses Schwammes.  
Fig. IX. X. Der natürliche und veränderte Saamenstaub.

EXPL.






St. Loibel pinx. R.

L. G. F. sc. R.

Fig. 1-10 Agaricus mollis. n. 3424.  
L. L. Ag. mollis n. 3424. n. 3424. 3





*Agaricus xerampelinus.*  
comp. 204.

*L. G. P. sc. R.*

Tab. 330 B



AGARICVS CENTESIMVS TERTIVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globoso vel conico, post campaniformi, denique plano; petiolo rotundo, ad radicem crassiori, recto vel curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria* habens.

- Fig. I. Fungus, nondum explicatus; pileo fere globoso.  
Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano.  
Fig. III. IV. Fungi diuersae explicationis & figurae.  
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. VI. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VII. VIII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierzehenden Kupfertafel.

Der hundert und dritte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit anfangs kugelfunden oder kegelfigen, nachhero kugelfigen, endlich flachen Hute; mit einem runden, unten dickern, geraden oder krummgebogenen Stiele; hat weder Saamendecke, noch einen Namen in *Bayern*.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit fast kugelfunden Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.  
Fig. III. IV. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.  
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE QVINTAE.  
VARIETAS AGARICI CENTESIMI TERTII.

Haec fungi antecedentis varietas vere singularis est, & ad illustrandum fructificationis modum multum adiuuat.

Fig. I. Fungus maior, parum explicatus, ejus pileo minor explicatus infidet, interne vero cohaerent.

Fig. II. Fungus praecedens, ad perpendiculum dissectus.

Erklärung der zweyhundert und funfzehnten Kupfertafel.  
Abänderung des hundert und dritten Blätter-  
schwammes.

Diese Abänderung des vorhergehenden Schwammes ist sonderbar genug; und kann zur Erläuterung, wie die Schwämme sich oft fortpflanzen, vieles beytragen.

Fig. I. Ein grosser, wenig entwickelter Schwamm; dessen Hute ein anderer kleiner und entwickelter aufsteht, beyde aber innerlich nur einen Schwamm ausmachen.

Fig. II. Der vorige, aber senkrecht zerschnittene, Schwamm.

EXPLI.



Tab. CCXV.



Fig. I.




Fig. II.

St. L. p. R.

L. G. Tab. CC. R.

*Agaricus xerampelinus.*

*Rath 3993 A. leporinus*





*Agaricus margaritaceus* Sch.  
*Agaricus cinereus*, Patech.

. deliquescens, Sch. 3875, 3876  
 201

I. St. Loibl pinx. et sc. Rat.



AGARICVS CENTESIMVS QVARTVS.

Est fungus hydrophorus, bicolor, plerumque solitarius, fistulosus, carne destitutus, per aetatem varius; pileo ab initio fusiformi, post conico, denique campaniformi, variis modis ad oram lacerato seu reuoluto, semper lineolis secundum longitudinem exarato; petiolo cylindraceo, vel recto, vel curuato, ad basin crassiori; velo & annulo destitutus. Nomen in *Bauaria* nullum.

Fig. I. Par fungorum; quorum minor nondum explicatus, pileo integro; maior explicatus, pileo campaniformi, fisto & lacerato. Fig. II. Par fungorum; quorum minor explicari incipiens, pileo conico; maior explicatus, pileo campaniformi, ad oram reuoluto. Fig. III. Fungus, pileo campaniformi, ad oram reuoluto; petiolo basin versus crassiori. Fig. IV. V. Fungi variae explicationis. Fig. VI. VII. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und sechzehenden Kupfertafel.

Der hundert und vierte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens einfacher, hohler, unfleischiger, in der Zeitfolge veränderlicher, Wassertschwamm; mit einem anfangs spindel förmigen, hierauf kegelförmigen, und endlich glockförmigen, am Rande auf mancherley Art zerrissenen oder aufgerollten, allezeit längs herunter gestrichelten Hute; mit rundem, geradem, oder gebogenem, und nach unten zu dickerem Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere noch unentwickelt, mit ganzem Hute; der größere entwickelt, mit glockförmigen, gespaltenem und zerrissenem Hute. Fig. II. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere sich zu entwickeln anfängt, mit kegelförmigen Hute; der größere sich entwickelt hat, mit glockförmigen und am Rande aufgerolltem Hute. Fig. III. Ein Schwamm mit glockförmigen, am Rande aufgerolltem Hute; mit einem unten dickern Stiele. Fig. IV. V. Schwämme von verschiedener Entwicklung. Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenhaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINTVS.

Est fungus bicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo campanulato; petiolo cylindraco, recto, interdum curuato, ad basin crassiusculo; velo araneofo, annuloque tenuiori praeditus. *Bauaris* nomen deest.

- Fig. I. Par fungorum; quorum minor nondum euolutus, maior explicatus.  
Fig. II. Fungus explicatus, pileo campaniformi, petiolo annulato.  
Fig. III. Fungus explicari incipiens; velo araneofo, paullulum lacerato.  
Fig. IV. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. V. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VI. Pollen nativus.  
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und siebenzehenden Kupfertafel.

Der hundert und fünfte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens einfacher, voller, fleischiger, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem glockenförmigen Hute; mit einem runden, geraden, bisweilen getogenen, und unten dickeren Stiele; mit einer spinnenwebigen Saamendecke und Ring. Ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere unentwickelt, der andere entwickelt ist.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit gleichem Hute, und geringstem Stiele.  
Fig. III. Ein Schwamm, der sich zu entwickeln anfängt, und dessen spinnenwebige Saamendecke etwas aufgesprungen ist.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach seiner Unterflache.  
Fig. V. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.  
Fig. VI. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Fig. I.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.

Fig. V.



I. St. Lobl prime. et sc. Ret.

*Agaricus praecox* St. Rabb. 5314

*Agaricus candicans*, Schwaff. 5335. Nicht mit  
comp. St. Bull. 575 fig. E.  
non Bulliard





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.

L. de Lenthé pinx. et de Roi.

*Agaricus prasinus*, Schaef. 3972. Abb.  
*Agaricus olivaceus*, Batsch.



AGARICVS CENTESIMVS SEXTVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo ab initio globoso, post conico, denique plano; petiolo cylindraceo ad basin crassiori seu tuberoso; velo & annulo priuatus. Nomine in *Bauaria* nullo.

- Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo fere globoso.  
Fig. II. Fungus explicatus; pileo planiusculo.  
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus  
Fig. V. Pollen natiuus.  
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und achtzehenden Kupfertafel.

Der hundert und sechste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelförmigen, nachmals halbrunden, endlich flachen Hute; mit rundem, nach unten zu dickem, knolligem Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit fast kugelförmigem Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus tricolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globofo vel conico, post campaniformi seu plano, faepe in centro fastigiato; petiolo cylindraceo, basin versus crassiori; nec velo nec annulo donatus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

- Fig. I. Fungus paullulum explicatus; pileo conico.  
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo reniformi.  
Fig. III. Fungus nondum explicatus; pileo globofo.  
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo plano, in centro fastigiato.  
Fig. V. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.  
Fig. VI. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VII. Pollen natiuus.  
Fig. VIII. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunzehenden Kupfertafel.

Der hundert und siebende Blätterschwamm.


Es ist solcher ein dreysfärbiger, einfacher, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, oder kegelförmigen, nachher glöckigen, oder flachen, und in der Mitten oft zugespizten Hute; mit einem runden, nach unten zu sich verdickenden Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelförmigem Hute.  
Fig. II. Ein unentwickelter Schwamm; mit nierenähnlichem Hute.  
Fig. III. Ein unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem, und in der Mitte zugespiztem Hute.  
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCXIX.



L. St. Leibn. vinn. et Sc. Nat.  
*Agaricus rutilans*, Chauff. Abb. 1963





Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.

L. St. Loub. pinx. et J. Rat.

*Agaricus collinus.* v. *h.*

AW 3787



AGARICVS CENTESIMVS OCTAVVS.

Est fungus fere vnicolor, solitarius & multiplex, fistulosus, carnosus, parum varius; pileo ab initio conico, post campanulato, in centro fastigiato; petiolo cylindraceo, basin versus crassiori; nec velum, nec annulum habens. Nomen in *Bauaria* deest.

- Fig. I. Par fungorum explicatorum; pileo campanulato, fastigiato.  
 Fig. II. Fungus, explicatus, quoad faciem inferiorem.  
 Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
 Fig. IV. Pollen natiuus.  
 Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und achte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein fast einfärbiger, sowohl einfacher, als vielfacher, hohler kaum fleischiger, wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem anfänglich kegelförmigen, nachher glockigen, und in der Mitten spitzig auslaufenden Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

- Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit glockigem und zugespitztem Hute.  
 Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
 Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
 Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
 Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS NONVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio semiglobofo vel conico, post campanulato, denique plano, saepe deformi; petiolo cylindraceo, recto vel curuato, basi crasso; velo spurio, annulo nullo. *Bauari* nomen nesciunt.

- Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo fere globofo.  
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo conico, velo spurio.  
Fig. III. Fungus explicatus; pileo plano.  
Fig. IV. Fungus; pileo deformi.  
Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und neunte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs halbrunden oder kegeltigen, nachmals glozigen, endlich flachen, oft umgestalteten Hute; mit einem runden, geraden oder gebogenen, unten dickern Stiele; mit einer unächtten Saamendecke, aber ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit fast kugelrunden Hute.  
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegeltigem Hute und unächtter Saamendecke.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem Hute.  
Fig. IV. Ein Schwamm mit umgestaltetem Hute.  
Fig. V. Ein Schwamm nach der Unterfläche.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCXXI.



*Agaricus gilvus*. Rob. 3784.



Tab. CCXXII.



*Agaricus acicula.*  
comp. 2. 63.

21 2750

Loibl pinx. et Sc. Rat.



AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS.

Est fungus minimus, bicolor, fistulosus, non carnosus; pileo conico, post campanulato; petiolo longo, cylindraceo, radicato; velo & annulo orbatus. *Bauaris* nomen deest.

- Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo conico.  
Fig. II. Fungus explicatus, pileo campanulato.  
Fig. III. Fungus vitro auctus, nondum explicatus.  
Fig. IV. Fungus vitro auctus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. V. Fungus vitro auctus, ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VI. VII. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und zehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein sehr kleiner, zweyfärbiger, hohler, unfleischiger Schwamm; mit einem anfangs kegelförmigen, nachmals glockförmigen Hute; mit einem langen, runden, bewurzelten Stiele; hat weder eine Saamendecke, noch einen Ring, noch einen Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegelförmigem Hute.  
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit glockförmigem Hute.  
Fig. III. Ein vergrößerter unentwickelter Schwamm.  
Fig. IV. Ein vergrößerter Schwamm; nach seiner Unterfläche.  
Fig. V. Ein vergrößerter senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VI. VII. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS VNDECIMVS.

Est fungus vnicolor, seu bicolor, farctus, carnosus, varius; petiolo campanulato, saepe deformi; petiolo cylindraceo, recto vel varie curuato, striato, saepe lacerato et squamoso; nullo velo, nullo annulo. *Bauaris anonymus*.

Fig. I. Par fungorum, diuersae magnitudinis & figurae.

Fig. II. Fungus deformis.

Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundertdrey und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und eilfte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, oder zweyfärbiger, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem glockigen, oft ungestalteten Hute; mit einem runden, geraden, oder auf mancherley Art gekrümmten, oft zerrissenen und schuppigen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein paar Schwämme von verschiedener Größe und Gestalt.

Fig. II. Ein ungestalteter Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.

L. St. Loibl pinx. et J. Rat.

*Agaricus fasciatus.*

*Cortinarius castaneus*, v. L. N. 3526



Tab. CCXXIV.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



L. St. L. nobil. pinn. et de Ret.

*Agaricus tremulus*, Schaeff. 1784

Labench 26/74



EXPLICATIO TABULAE DVCENTESIMAE VICESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DVODECIMVS.

Est fungus bicolor, fere vnicolor, solitarius, vix carnosus, varius; pileo plerumque infundibuliformi, tremulante, saepe florem referente, deformi, lacerato; petiolo breui, rotundo, ad radicem plerumque tenuiori; nullo velo nulloque annulo. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Par fungorum, pileis connatorum.

Fig. IV. V. Fungi deformes.

Fig. VI. VII. Fungi flabellum aemulantes.

Fig. VIII. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IX. X. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und zwölfte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast einfärbiger, einzelner, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem meist trichterförmigen, zitternden, oft blumenartigen, ungestalten, zerrissenen Hute; mit einem kurzen, runden, und unten mehrentheils dünnern Stiele; ohne Saamendecke und Ring; auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmigen Hute.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Paar Schwämme, welche mit den Hüten zusammen gewachsen sind.

Fig. IV. V. Ungefaltete Schwämme.

Fig. VI. VII. Schwämme, welche einem Sonnenfächer gleich sehen.

Fig. VIII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

D

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
TERTIVS.

Est fungus unicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo plano, pilose-squamoso; petiolo crasso, rotundo, basin versus tenuiori; nec velo nec annulo donatus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Par fungorum, petiolo connatorum.

Fig. II. Idem par fungorum, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Particula pilei ad perpendiculum dissecti.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und dreyzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, meistens einzelner, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem flachen, haarigschwammigen Hute; einem dicken, runden, nach unten zu dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, welche am Stiele zusammen gewachsen sind.

Fig. II. Eben dasselbe Paar Schwämme, nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Stückgen senkrecht zerschnittenen Schwammes.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-





*Agaricus candidus.*

*• velenus. v. Abb. 3895.*

*I. Sr. Leibl. pinx. et Sc. Rat.*



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



I. St. Lohb. p. 100. et. R. Rot.

*Agaricus pulverulentus.*  
*echinoides*

3442

Bibliothek  
der Landwirtschaftlichen Fakultät  
der Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS QVARTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, fistulosus, vix carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, denique plano; petiolo tenui, rotundo, recto vel hinc inde curuato; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Trias fungorum, variae euolutionis et figurae.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und vierzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachhero glockigen, zuletzt flachen Hute; mit einem dünnen, runden, geraden oder geschlängelt gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. In Bayern hat er keinen besondern Namen.

Fig. I. Drey Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Ein Schwamm nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

D 2

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
QVINTVS.

Est fungus vnicolor, vel bicolor, plerumque solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globofo, post planiusculo, saepe infundibuliformi, semper piloso; petiolo vel recto, vel ad radicem crassiori, vel inuerse conico; velo spurio, sed annulo & nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi; petiolo inuerse conico. Fig. II. Par fungorum, diuersae explicationis. Fig. III. Fungus nondum explicatus. Fig. IV. Fungus nondum explicatus, quoad faciem inferiorem. Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem, vbi a guttulae lacteae. Fig. VI. VII. Fungi ad perpendicularum dissecti. Fig. VIII. IX. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und funfzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger oder zweyfärbiger, meist einzelner, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfänglich kugelförmigen, nachhero flachen, oft trichterförmigen, allezeit haarigen Hute; mit einem geraden, unten dickern oder umgekehrt kegelförmigen Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring und ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmigen Hute, und umgekehrt kegelförmigen Stiele. Fig. II. Ein paar Schwämme, von verschiedener Entwicklung. Fig. III. Ein noch unentwickelter Schwamm. Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche, und wo die milchigen Safttropfen. Fig. VI. VII. Senkrecht zerschnittene Schwämme. Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-





*Agaricus scrobiculatus.* Rab 2919 eders nicht.  
*Lactarius*  
 comp NO 12.228





I. St. Lmbl. pinos. et Sc. Rat.

*Agaricus crinitus.*  
*oleivoides* Rabh 3917  
 Comp II



AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
SEXTVS.

Est fungus unicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; lacteo turgens; pileo ab initio globoso, post plano, piloso, in centro saepe depresso seu infundibuliformi; petiolo breui, rotundo, recto, vel curuato, ad basin modo crassiori, modo tenuiori; velo spurio, sed annulus desideratur. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo globoso. Fig. II. Fungus explicari incipiens; pileo in centro depresso. Fig. III. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem, velumque spurium exhibens. Fig. IV. Fungus explicatus; pileo valde piloso & in centro depresso. Fig. V. VI. Fungi variae figurae. Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem, cum guttulis lacteis. Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum dissectus. Fig. IX. X. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und sechzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Milchschwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher flachen, haarigen, in der Mitten vertieften oder trichterigen Hute; mit einem kurzen, runden, geraden oder gekrümmten, nach unten zu bald dickern, bald dünnern Stiele; mit einer unächtigen Saamendecke, aber ohne Sting. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute. Fig. II. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit einem in der Mitte vertieften Hute. Fig. III. Der vorige Schwamm; nach seiner Unterfläche und unächtigen Saamendecke. Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit einem sehr haarigen und in der Mitte vertieften Hute. Fig. V. VI. Schwämme von verschiedener Gestalt. Fig. VII. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche und den milchigen Saattropfen. Fig. VIII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm. Fig. IX. X. Der natürlichste und vergroßerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
SEPTIMVS.

Est fungus tricolor, solitarius, fistulosus, minime carnosus, varius; pileo plicato, conico, acuminato; petiolo rotundo, recto vel varie curuato; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen nullum.

Fig. I. Par fungorum euolutorum; petiolo infra conatorum.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und siebenzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreysfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem faltigen, fegeiligen, zugespizten Hute; mit einem runden, geraden oder verschiedn gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme: welche unten am Stiele zusammenge-  
wachsen sind.

Fig. II. Ein Schwamm nach der Unterflache.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.


Se L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus pascuus*, Pers. *Abh.* 361.3  
*Agaricus pyramidalus*.



Tab. CCXXX.



S. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus campanella*, Batsch.  
*Agaricus fragilis*, Schoff.

3985



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE,  
 AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS.  
 OCTAVVS.

Est fungus vnicolor, & simplex, & multiplex, farctus, minime carnosus, varius; pileo plicato, conico, campaniformi, plano; petiolo tenuiori, recto vel curuato; velo et annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

- Fig. I. Fasciculus fungorum, variae euolutionis & figurae.  
 Fig. II. Par fungorum, petiolis ad radicem connatis.  
 Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.  
 Fig. IV. V. Fungi variae euolutionis.  
 Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem.  
 Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
 Fig. VIII. IX. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert und dreyßigsten Kupfertafel.  
 Der hundert und achtzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, sowohl einfacher, als vielfacher, voller, gar nicht fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem faltigen, kegelligen, glockenförmigen, flachen Hute; mit einem zarten, geraden und gebogenen Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring und ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwicklung und Gestalt.  
 Fig. II. Ein Paar mit dem Stiele zusammengewachsene Schwämme.  
 Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelligem Hute.  
 Fig. IV. V. Schwämme von verschiedener Entwicklung.  
 Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
 Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
 Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenslaub.

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
NONVS.

Est fungus unicolor, sessilis, & lignarius & lignofus, variae  
& incertissimae figurae. *Bavaris* nomen ignotum.

Fig. I. Fungus quoad faciem superiorem & inferiorem.

Fig. II. Pollen nativus.

Fig. III. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und neunzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, stielloser, harter Holzschwamm, von einer  
stets abänderlichen und höchst unbestimmten Gestalt. Hat in *Bayern*  
keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm nach seiner Ober- und Untersseite.

Fig. II. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. III. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCXXXI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.




St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus dubius.*  
*Enobolus quercina Pers 57*



Tab. CXXXII



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus niveus*, Scop. *Al. 3340.*  
*Agaricus virgineus*, Pers.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS.

Est fungus unicolor, solitarius, fistulosus, non carnosus, parum varius; pileo plano, ad oram plicato; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, destitutus.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, infundibuliformem aemulante.

Fig. II. Fungus explicatus, deformis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen nativus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und zwanzigste Blätterchwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger Schwamm, mit einem flachen, am Rande gefalteten Hute; mit einem runden, geraden oder frumgebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, und gleichsam trichterförmigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter ungestalteter Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

E

EXPLI-



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
PRIMVS.

Est fungus lignarius, bicolor, solitarius, farctus, carnosus, valde varius; pileo squamoso, fere semper alio, femicirculari, reniformi, oblongo; petiolo inuerse conico, breviori, longiori; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus euolutus; pileo oblongo.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo reniformi.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. Pollen natiuus.

Fig. VII. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, sehr abänderlicher Holzschwamm; mit einem schuppigen, fast allezeit andern, halbrunden, nierenförmigen, länglichen, Hute; mit einem umgekehrt kegelligen, bald längern, bald kürzern, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit länglichem Hute.

Fig. II. Entwickelter Schwamm, mit nierenförmigem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



L. St. Lohd. pino. et Jc. Rot.

*Agaricus dryinus*, Pers. *Alb.* 3685.  
*Agaricus dimidiatus*.






Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VII.

Lebl. p. 10. et 11.

*Agaricus atrovius.*  
mon. l. 1. p. 3382.



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
SECVNDVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo conico, seu campaniformi, in centro semper acuminato, petiolo tenui, cylindraceo, plerumque varie curuato, ad radicem bulboso; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. II. Fungi explicati; pileis campaniformibus.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.

Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig V. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und zwey zwanzigste Blatterschwamm.

Es ist solches ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegelligen oder glockigen, in der Mitten allezeit zugespizten Hute; mit einem dünnen, meist geschlängelten, unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. II. Entwickelte Schwämme; mit glockigen Hüten.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelligem Hute.

Fig. IV. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
TERTIVS.

Est fungus bi- vel tricolor, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post campaniformi, denique plano, variis lineis concentricis picto; petiolo cylindraco, recto vel curuato; nec velo, nec annulo, nec nomine in *Bauaria*, gaudens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campaniformi.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo deformi.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo fere plano.

Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo globoso.

Fig. V. Fungus multa aqua imbutus; hinc colore mutato.

Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem, vbi a. guttulae lacteae.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VIII. IX. Pollen natiuus ex vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert drey und zwanzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, voller, fleischiger, abänderlicher Milchschwamm; mit einem anfangs kugelfunden, nachhero glockigen, und endlich flachen Hute; mit einem meist runden, geraden oder gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring; auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit aufgerolltem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.

Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelfundem Hute.

Fig. V. Ein von Wasser stark angesaugter Schwamm, und von dunkler Farbe.

Fig. VI. Ein Schwamm nach seiner Unterflache; wo a. die Milchtropfen.

Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-






*Agaricus fuscus.*  
*Agaricus lactifluus, Pers.*  
*flexuosus. N° 3963. S*

Licht. p. 10. et 11. R. A.



Tab. CCXXXVI.



Leibl pinx. et sc. Rat.

*Agaricus griseus.*

*Convolvulus Mth. 2785*

3595<sup>2</sup>



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS QVARTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, fistulosus, non carnosus, varius; pileo globofo, post campaniformi, in centro rotundo, vel acuminato; pileo gracili, varie plerumque curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus, aqua imbutus; pileo campaniformi.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo colore naturali.

Fig. III — VII. Fungi variae explicationis & figurae.

Fig. VIII. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IX. X. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert vier und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem kugelfunden, nachher glockigen, in der Mitte gerundeten oder zugespizten Hute; mit einem zarten, gebogenen und geschlängelten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter und mit Wasser stark beschwängelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner natürlichen Farbe.

Fig. III — VII. Schwämme von verschiedenen Entwicklungen und Aussehen.

Fig. VIII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
QVINTVS.

Est fungus lignarius, tricolor, & simplex & multiplex, fistulosus, non carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, denique plano; petiolo cylindraceo, recto vel curuo, ab basin crassiori; velo annulo, & nomine in *Bauaria*, orbatus.

Fig. I. Fungi variae explicationis & figurae.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert fünf und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, hohler, unfeischiger, abänderlicher Holzschwamm; mit einem anfangs kegelförmigen, nachher glockigen, und endlich flachen Hute; mit einem runden, geraden oder gebogenen, und unten dickeren Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.







Fig. I.

Tab. CCXXXVIII.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. II.



Fig. III.



Fig.

IV.



Fig. V.

L. St. Lobl pinxit et Sc. Bati.

*Agaricus nitens.*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
SEXTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, farctus, parum carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi; petiolo cylindraceo, ad basin crassiori, plerumque curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, priuatus.

Fig. I. Fungus explicatus, pileo campanulato.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo conuexo.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.

Fig. IV. Fungus infundibulum aemulans; quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert sechs und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelfigen, nachhero glockigen Hute; mit einem runden, unten dickern, meist gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelfigem Hute.

Fig. IV. Ein trichterähnlicher Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
SEPTIMVS.

Est fungus lignarius, vni- vel bicolor, solitarius, farctus; non  
carnosus, varius; pileo ab initio globofo, post conico,  
denique conuexo, ad oram semper plicato; petiolo du-  
ro, tenui, recto vel curuato; nullo velo, nulloque an-  
nulo. Nomen *Bauaris* ignotum.

- Fig. I. Fungi varia explicationis & figurae.  
Fig. II. Fungi minores; pileis conicis.  
Fig. III. Fungi explicati; pileis floriformibus.  
Fig. IV. Fungus explicatus, pileo conuexo.  
Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert sieben und zwanzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger oder zweyfärbiger, einzelner, voller, unfleisch-  
ger, abänderlicher Holzschwamm; mit einem anfangs kugelförmigen, her-  
nach kegelförmigen, endlich gewölbten, am Rande allezeit gefalteten Hü-  
te; mit einem harten, zarten, geraden, oder gekrümmten Stiele;  
ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.


- Fig. I. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.  
Fig. II. Schwämme mit kegelförmigen Hüten.  
Fig. III. Entwickelte Schwämme, mit blumenähnlichen Hüten.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit gewölbtem Hute.  
Fig. V. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.





Fig. I.



Loibl piox. et Sc. Rat.

*Agaricus androsaceus.* 3764  
*Agaricus perforans, Hoffm.* 3765





*Agaricus guttatus. N. 3961.*

L. 1811. p. 1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
OCTAVVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio conico, post semicirculari seu plano, semper squamoso & striato; petiolo cylindraceo, ad radicem crassiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria* destitutus.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo semicirculari.  
Fig. II — IV. Fungi explicari incipientes; pileis conicis.  
Fig. V. Fungus explicatus, pileo planiusculo.  
Fig. VI. Fungus explicatus, quod faciem inferiorem.  
Fig. VII. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert acht und zwanzigste Blätterchwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachhero halbrunden oder flachen, allezeit schuppigen und gestrichelten Hute; mit einem runden, untern dickern Stiele; ohne Ring und Saamendecke. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.  
Fig. II — IV. Schwämme, die sich zu entwickeln anfangen; mit kegelligen Hüten.  
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit ziemlich flachem Hute.  
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

F

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS.  
NONVS.

Est fungus unicolor, solitarius, farctus, parum carnosus, parumque varius, volva spuria donatus; pileo ab initio globoso, post semicirculari; petiolo cylindraceo, ad basin crassiori; velo coriaceo, & annulo persistente praeditus. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

- Fig. I. Fungus explicatus, pileo semicirculari.  
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert neun und zwanzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller wenig fleischiger, und wenig abänderlicher, unächter Eyschwamm; mit einem anfangs kugelförmigen, nachher halbrunden Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und beständigem Ringe. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.  
Fig. II. Eben derselbe Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPL.





Fig. I.



Fig. II.

Fig. V.



Fig. III.



Fig. IV.

Lechl pins. et f. Ket.

*Agaricus bulbosus*, comp. *Neo. Abh. 3546. v. 4052*  
*Agaricus phalloides*.  
*Kappas. v. 40.*





Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. II.



Fig. III.

Fruct. an. + si. R. R.

*Agaricus Sylvaticus.* Alb. 3712

33.210



AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS.

Est fungus bicolor, solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoſo ſeu conico, poſt campaniformi, denique plano, ſemper ſquamoſo, pileo cylindraceo, ad baſin plerumque craſſiori, recto vel curuato; velo coriaceo & annulo perſiſtente donatus. *Bauaris* nomen eſt nullum.

- Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo conico.  
Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram fiſſo.  
Fig. III. Fungus explicatus; pileo campaniformi.  
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem; velo rupto.  
Fig. V. Fungus nondum explicatus, ad perpendicularum diſſectus.  
Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert und dreyſigſte Blätterschwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, oder kegelfigen, nachhero glockigen Hute; mit einem runden, unten meiſtentheils dickern, geraden oder krummgebogenen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beſtändigem Ringe. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein ſich entwickelter Schwamm; mit kegelfigem Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit ſachem, am Rande geſpaltenen, Hute.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.  
Fig. IV. Ein Schwamm nach ſeiner Unterſache, mit der zerriffenen Saamendecke.  
Fig. V. Ein ſich entwickelnder Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
PRIMVS.

Est fungus unicolor, & simplex & multiplex, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo plerumque infundibuliformi, ad oram saepe reuoluto; petiolo cylindraceo, recto vel curuato, radicem versus tenuiori. Nec velum, nec anulum, nec nomen in *Bauaria* habens.

Fig. I. Fasciculus fungorum; pileis variae figurae. Fig. II. Fasciculus fungorum, multa aqua imbutorum, hinc colore variato. Fig. III. Fasciculus fungorum; pileis fere planis. Fig. IV. Fungus explicatus; pileo floriformi. Fig. V. Fungus, explicatus; pileo reuoluto. Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem. Fig. VII. Fungus ad perpendicularum dissectus. Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert ein und dreyzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, theils einzelner, theils vielfacher, voller, wenig fleischiger und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem meistens trichterigen, am Rande oft aufgerollten Hute; mit einem runden, geraden, oder krümmgebogenen, und unten dünnern Stiele; ohne Saamenbedeck, ohne Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme; mit Hüten von verschiedener Gestalt. Fig. II. Ein Büschel Schwämme, die viel Wasser angefaugnet, und dadurch die Farbe geändert haben. Fig. III. Ein Büschel Schwämme, mit etwas flachen Hüten. Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit blumenähnlichem Hute. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, mit aufgerolltem Hute. Fig. VI. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche. Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm. Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-





*Agaricus degeneri*  
comp. T. 187.

L. 1751 pino. et G. Rat.





*Agaricus hyalinus.*  
*vaginatus.* W.B.

Loibl Sc.R.



AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
SECVNDVS.

Est fungus bicolor, solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius, volva praeditus; pileo ab initio ovali, post campaniformi; petiolo cylindraceo, recto vel curvato; velo, annulo & nomine in *Bauaria* nullo.

Varietas forsan fungi *sexagesimi sexti*. Tab. *LXAXV. LXXXVL*.

Fig. I. Fungus volvae adhuc inclusus.

Fig. II. Fungus e volva rupta adscendens.

Fig. III. Fungus volvae adhuc inclusus et ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Fungus minor & maior, pileis campaniformibus, ad oram striatis.

Fig. VI. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VIII. VII. Pollen nativius & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert zwey und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Eyschwamm; mit einem anfangs länglich runden, nachher glockigen Hute; mit einem rundlichen, geraden, oder frumgebogenen Stiele; ohn: Saamendecke, Ring und Namen in *Bayern*. Viel leicht eine Abänderung des sechs und sechzigsten Schwammes. Tab. *LXXXV. LXXXVI*.

Fig. I. Ein noch in seinem Eye verschlossener Schwamm.

Fig. II. Ein aus seinem Eye ausbrechender Schwamm.

Fig. III. Ein in dem Eye noch verschlossener Schwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. V. Ein kleiner und grosser Schwamm; mit glockigem, am Rande gestricheltem Hute.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
TERTIVS.

Est fungus bi-vel tricolor, solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius, volua donatus; pileo ab initio ouali, post conico, denique campaniformi; petiolo cylindraco, radicem versus crassiori, velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Fungus e volua adscendens. Fig. II. Fungus e volua egressus. Fig. III. Fungus explicatus; pileo campaniformi. Fig. IV. Fungus explicari incipiens; pileo conico. Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem. Fig. VI. Fungus ad perpendicularum dissectus. Fig. VII. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert drey und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Eyschwamm; mit einem anfänglich länglichrunden, hernach kegelförmigen, endlich glockigen Hute; mit einem runden, nach unten zudickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, wie er aus dem Eye durchbricht. Fig. II. Ein aus dem Eye aufsteigender Schwamm. Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute. Fig. IV. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit kegelförmigem Hute. Fig. V. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche. Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm. Fig. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-




Tab. CCXLV.



*Agaricus badius.*

*Agaricus badius* L. Fr. *Agaricus badius* L. Fr. *Agaricus badius* L. Fr.





St. L. p. R.

L. G. F. sc. R.

*Agaricus serotinus*,  
*Agaricus alneus*, Sch.  
*Scaphophorum agaricoides*, Ehrenb.

1-2. *Schizophyllum commune*. 3274. Abb.  
 3, 8, 9 *Agaricus atro-caruleus* 3668 "  
 5. *alpinus* 3661 "  
 6-7. *Lenzites tricolor*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
QVARTVS.

Est fungus lignarius, plerumque bicolor, & simplex & multiplex fœtilis, subtremulans, non modo figura, sed & per ætatem colore, adeo varius, vt certi quid determinari nequeat.

Fig. I — VIII. Varietates huius fungi.

Fig. IX. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. X. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. XI. Pollen natiuus.

Fig. XII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert vier und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist ein insgemein zweyfärbiger, sowohl einzelner als vielfacher, etwas zitternder Holzschwamm, ohne Stiel; und der Gestalt sowohl, als der Farbe nach, ein so abänderlicher und verschiedener Schwamm, daß sich etwas gewisses und beständiges nicht angeben läßt.

Fig. I — VIII. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. IX. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. XI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. XII. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. XIII. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
QVINTVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, vix carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, in centro fastigiato, semper piloso; petiolo cylindraceo, recto vel curuo, radicem versus crassiori; velo coriaceo & annulo persistente praeditus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campaniformi.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert fünf und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fast gar nicht fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelförmigen, nachhero Glockigen, in der Mitten erhöhten, allezeit haarigen Hute; mit rundem, geradem, oder gekrümmten, und nach unten zu dickern Stiele; mit einer lederhaften Saamendecke und beständigem Ringe. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCXLVII.




L. St. Loibl pinx. et sc. Rat.

*Agaricus caesareus*, Schaeff. 1055.

T. 258





Sc. L. p. 2.

L. C. F. p. 2.

*Agaricus tubaeformis.*  
*Lentinus suffruticosus*



AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
SEXTVS.

Est fungus unicolor, & lignarius, & lignosus, & simplex, & multiplex, farctus, varius; pileo, ob impedimenta loci, vbi nascitur, incerto, & fere semper alio; petiolo cylindraceo, longo, plerumque varie curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem posteriorem.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert sechs und dresßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, holziger, theils einzelner, theils vielfacher, voller, abänderlicher Holzschwamm; mit einem, nach den vorgefundenen Hindernissen des Ortes, wo er sich entwickelt, unbestimmten und fast allezeit andern Hute; mit einem runden, langen, meist mannigfaltig gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke, Ding und Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterigem Hute.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm; nach seiner hintern Fläche.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.

G

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
SEPTIMVS.

Etsi nullus dubito, quin hic fungus antecedentis fungi sit varietas, eum tamen, ob singularem evolutionis formam, pictum exhibere non abs re duxi.

Fig. I. Trias fungorum, quorum tertius pileo priuatus.

Fig. II. Pollen natiuus.

Fig. III. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert sieben und dreyßigste Blätter-  
schwamm.

Ob ich gleich selbst überzeuget bin, daß der gegenwärtige Schwamm blos eine Abänderung des vorhergehenden sey; so habe ich solchen doch, wegen seiner sonderbaren Entwicklung und Gestalt, nicht weglassen wollen.

Fig. I. Drey Schwämme, davon der eine ohne Hut ist.

Fig. II. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. III. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCXLIX.



Fig. III.

Fig. II.


Sc. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Cantarellus tubaeformis* f.  
*Lentinus suppositus* Don. T. 61



Tab. CCL.



St. L. p. K.

I. G. F. s. P.

*Agaricus pullus.*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
OCTAVVS.

Est fungus bi- vel tricolor, solitarius, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo conico, striato; petiolo cylindraceo, radicem versus crassiori; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico.  
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Idem fungus, ad perpendiculum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert acht und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einzelner, voller, fast gar nicht fleischiaer, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegelligen, gestreiften Hute; mit einem runden, unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.  
Fig. II. Eben derselbe Schwamm; nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Eben derselbe Schwamm; senkrecht zerschnitten.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
NONVS.

Est fungus bi- vel tricolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globofo, vel conico, apice faepe quasi truncato, post hemisphaerico; petiolo crasso, ad radicem bulbofo; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo fere conico, apice quasi truncato.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo hemisphaerico.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert neun und dreyßigste Blätterchwamm.

Es ist solcher ein zwey- oft dreyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, ab-  
änderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden oder kegeli-  
gen, oben gleichsam abgestuften, nachhero halbrunden Hute; mit  
einem dicken, unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke, Ring und  
Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein noch nicht entwickelter Schwamm; mit einem fast kegelligen, und oben  
abgestuften Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



St. L. p. R.

L. G. F. v. R.

*Agaricus truncatus.* No. 3476.  
*Agaricus truncatus*






Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.

S. L. n. R.

L. G. F. n. R.

*Agaricus cyathiformis.* Nbh. 3825.  
*Agaricus involutus.* Botch.  
*excentricus.*



AGARICVS CENTESIMVS QVADRA-  
GESIMVS.

Est fungus, ob locum natalem lignarius, vni- vel bicolor, so-  
litarius, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo fere  
semper infundibuliformi; petiolo cylindraceo, breui; velo,  
annulo, & nomine in *Bauaria*, priuatus.

Fig. I. Fungus explicatus; ligno insidens.

Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem, & cuius petiolo  
minor adnatus.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller kaum fleischiger, we-  
nig veränderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit trichter-  
gen Hute; mit einem runden und kurzen Stiele; ohne Saamende-  
cke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; wie er dem Holze aufsetzt.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche; und dessen Stiele ein  
anderer kleiner angewachsen ist.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamensaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamensaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS PRIMVS.

Est fungus, ob locum natalem lignarius, bicolor, solitarius, farctus, carne destitutus, parum varius; pileo fere semper conico; petiolo cylindraceo, ad radicem crassiori; nullo velo, annulo & nomine in *Bauaria*.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico; ligno insidens.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Erklärung der zweyhundert drey und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert ein und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, unfleischiger, wenig abänderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit kegelligen Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, wie er dem Holze aussiget.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



St. L. p. R.

I G. P. sc. 2.

*Agaricus dryophaeus. v. b.*



Tab. CCLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



*Agaricus purpureus.*  
*Russula nitida* v. G. 3300.  
 Comp. 15. 16. 58. 73. 92



AGARICVS CENTESIMVS QVADRA-  
GESIMVS SECVNDVS.

Est fungus tricolor, solitarius, farctus, non carnosus, varius;  
pileo ab initio globoso, post hemisphaerico, denique  
plano; petiolo cylindraco, ad radicem tenuiori; velum,  
annulus, & nomen in *Bauaria*, desideratur.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano.  
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert zwey und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, einzelner, voller, unfleischiger, abänderli-  
cher Schwamm; mit anfangs kugelförmem, nachhero halbrundem,  
endlich flachem Hute; mit einem runden, nach unten zu dünneren  
Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen  
Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.  
Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TAB. DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGE-  
SIMVS TERTIVS.

Est fungus bicolor, & simplex, & multiplex, cauus, non car-  
nosus; varius; pileo ab initio globoso, post hemisphaeri-  
co, denique plano, plicato, acuminato, in centro de-  
presso; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo,  
annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

- Fig. I. Fasciculus fungorum; variae explicationis & figurae.  
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert drey und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, theils einzelner, theils vielfacher, hohler,  
unfleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugel-  
runden, nachhero halbrunden, endlich flachen, gefalteten, zugespitzten,  
in der Mitten vertieften Hute; mit einem runden, geraden oder ge-  
krümmten Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen  
in *Bayer n*.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwicklung und Gestalt  
Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenslaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenslaub.

EXPLI.



Tab. CCLV

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.

Fig. V.



Loibl pinx. et sc. Ret.

*Agaricus ochraceus.*

*dryophiles v. Sta. Hb. 3781.*



Tab. CCLVI.



Leibl. pinat. J. R. R.

*Agaricus albus*, Schaeff. *h. 14* 39. 29.

207.256



EXPLICATIO TAB. DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRA-  
GESIMVS QVARTVS.

Est fungus vnicolor, fere bicolor, solitarius, farctus, carnosus,  
parum varius; pileo ab initio globofo, post hemisphae-  
rico, tandem plano; petiolo cylindraceo, radicem versus  
crassiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo hemisphaerico.  
Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert vier und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger,  
wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, nachher  
halbrunden, endlich flachen Hute; mit einem runden, nach unten  
zu dickern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Na-  
men in Bayern.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.  
Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

H

EXPLI.



EXPLICATIO TAB. DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGE-  
SIMVS QVINTVS.

Est fungus vnicolor, & simplex, & multiplex, fæctus, carne destitutus, parum varius; pileo conico, post planiusculo, in centro acuminato, integro vel fissilo; petiolo cylindraceo, radicem versus crassiori, sæpe radicibus donato. Velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo in centro acuminato.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Fasciculus fungorum; pileis ad oram fissis.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert fünf und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, so wohl einzelner, als vielfacher, voller, unfleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegelligen, nachhero etwas flachen, in der Mitten erhöhten, ganzen oder gespaltenen Hüte; mit einem runden, nach unten zu dickern, oft bewurzelten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitte erhöhten Hüte.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Ein Büschel Schwämme; deren Hüte am Rande gespalten sind.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



St. L. p. K.

F. F. p. 2

*Agaricus lacer* N. 3495  
Thadus p. 60.

1-3. *A. calceatus* on the  
4. *A. geophyllus* 3488



Tab. CCIVIII.



Sc. L. p. B.

L. G. F. r. P.

*Agaricus caesareus, phalloides? var.*  
247



AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SEXTVS.

Est fungus fere unicolor, solitarius, fæctus, paullulum carnosus, parum varius, volua spuria saepe donatus; pileo ab initio conico vel globoso, post hemisphaerico, petiolo crasso, cylindraceo, ad radicem bulboso, vel volua spuria praedito; velum coriaceum & annulum persistenter habens. Nomen in *Bauaria* deest.

- Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo conico.  
Fig. II. Fungus explicatus, annulo & volua spuria donatus.  
Fig. III. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus explicatus, annulo persistente.  
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert sechs und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, etwas fleischiger, wenig abänderlicher, unächter Eyschwamm; mit einem Anfangs kegelligen oder kugelrunden, nachhero halbrunden Hute; mit einem starken, runden, unten knolligen, oder Astereye versehenen, Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und beständigen Ringe. Hat in *Bayern* keinen Namen.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegligem Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit dem Ringe und Astereye.  
Fig. III. Ein sich entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit dem beständigen Ringe.  
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus bicolor, plerumque multiplex, farctus, carnosus, parum varius; pileo semper conico & in centro acuminato, petiolo crasso, apicem & radicem versus tenuiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, destitutus.

- Fig. I. Fasciculus fungorum; pileis hinc inde connatis.  
Fig. II. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert sieben und vierzigste Blätterschwamm.


Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens vielfacher, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem allezeit kegelförmigen und in der Mitten zugespitzten Hute; mit einem dicken, nach oben und unten zu dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme, mit zusammengewachsenen Hüten.  
Fig. II. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCLIX.



St. L. p. R.

L. G. F. sc. R.

*Agaricus oedematopus*, Schaff. v. 1. 181.



Tab. CCLIX.



Fig. II.



Fig. I.

Fig. III.



Fig. IV.



St. L. p. R.

I. G. F. p. R.

*Agaricus monstrosus.*  
*Continarius fibrosus, v. l. v.*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE.  
 AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGE-  
 SIMVS OCTAVVS.

Est fungus singularis; cuius pileo par fungorum quasi insident.  
 Num varietas fungi septuagesimi septimi? Tab. LXXXVII.  
 LXXXVIII.

- Fig. I. Fungus figurae naturalis.  
 Fig. II. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
 Fig. III. Pollen natiuus.  
 Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert und sechzigsten Kupfertafel.

Der hundert acht und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist ein sonderbarer und ausserordentlicher Schwamm; auf dessen Hu-  
 te ein paar Schwämme verkehrt aufgewachsen zu seyn scheinen. Viel-  
 leicht eine Abänderung des sieben und siebenzigsten Schwammes?  
 Tab. LXXXVII. LXXXVIII.

- Fig. I. Ein Schwamm, nach seiner natürlichen Bildung.  
 Fig. II. Eben derselbe Schwamm, senkrecht zerschnitten.  
 Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.  
 Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS NONVS.

Est fungus volua spuria donatus, bicolor, solitarius, faretus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post hemisphaerico, denique plano; petiolo crasso, tuberoso; velo coriaceo & annulo persistente praeditus. In *Bauaria* nominatur *wilder Fliegenchwamm*.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo globoso.

Fig. II. Fungus nondum explicatus; quoad faciem inferiorem, velo adhuc integro.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo hemisphaerico, varie maculato.

Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und sechzigsten Kupfertafel.

Der hundert neun und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, abänderlicher, unächter Eyschwamm; mit einem anfangs kugelfunden, endlich flachen Hute; mit einem dicken, knolligen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beständigem Ringe. In *Bayern* heißt er *wilder Fliegenchwamm*.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelfundem Hute.

Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; nach seiner Unterflache und der noch ganzen Saamendecke.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem und geflecktem Hute.

Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCLXI.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.

Sc. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Agaricus myodes*  
*Agaricus muscarius* variet. 5. Willd.  
*nebulosus* variet. 4044.







BOLETI.  
Löcher schwämme.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SECVNDAE.

BOLETVS VICESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus tubulosus, multicolor, sessilis, durus, & lignarius  
& lignosus, persistens, varius; pileo fere semper alio.  
In *Bauaria* nomen habet nullum.

- Fig. I. Fungus semicircularis.  
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus pedem equinum referens.  
Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und sechzigsten Kupfertafel.

Der sieben und zwanzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, vielfarbiger, stielloser, harter und holziger,  
dauerhafter, abänderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit  
anderen Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein halbrunder Schwamm.  
Fig. II. Eben derselbe Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein Pferdhufiger Schwamm.  
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Fig. I.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



T. de Linné p. 100. a. f. Rat.

*Boletus fulvus*, comp. 127, 28.

*Boletus marginatus*, Schaef.

*Polyporus pinnicula*, v. L. Abb. 3100

*Boletus igneus* Linn.





I. Sc. L. uhl. pin. A. R. n.

*Boletus variegatus*, Sch.  
*Pyrenopeziza liquida*, Sch. 3207  
 an *P. resinosa* Labh 9173



BOLETVS VICESIMVS OCTAVVS.

Est fungus tubulosus, bi-vel tricolor, & sessilis & petiolatus, durus, & lignarius & lignosus, persistens, varius; pileo plerumque semicirculari, non raro deformi. In *Bauaria* nomen habet nullum, *Num varietas Boleti vicesimi quinti? Tab. CXXXIII.*

Fig. I. Fungus semicircularis; petiolo donatus.

Fig. II. Fungus sessilis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und sechzigsten Kupfertafel.

Der acht und zwanzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zwey- oder dreyförmiger, sowohl bestielter, als auch stielloser, harter, holziger, dauerhafter, abänderlicher Holzschwamm; mit einem meistens halbkreisförmigen, jedoch auch sehr oft ungestalteten Hute. Hat in *Bayern* keinen Namen. Vielleicht eine Abänderung des fünf und zwanzigsten Bilzes? *Tab. CXXXIII.*

Fig. I. Ein halbrunder bestielter Schwamm.

Fig. II. Ein stielloser Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

I

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE QVARTAE.

BOLETVS VICESIMVS NONVS.

Est fungus tubulosus, bicolor, singularis, deformis, durus lignosus, persistens; pileo & petiolo donatus.

Fig. I. Fungus, quoad faciem superiorem & inferiorem.

Fig. II. Particula fungi ad perpendiculum dissecti.

Fig. III. Pollen nativus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und sechzigsten Kupfertafel.

Der neun und zwanzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zweyfärbiger, einzelner, ungestalteter, harter, holziger, dauerhafter Schwamm; mit einem Hute und Stiele.

Fig. I. Der Schwamm nach seiner obern und untern Fläche.

Fig. II. Ein Stückgen dieses Schwammes senkrecht abgeschnitten.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Fig. I.




Fig. IV.

Fig. II.



Fig. III.



St. L. p. v.

I. C. F. sc. R.

*Doletus deformis.*


*Polyporus*

*Nomen nuda varietas Hal. ovini T. 122?*



Tab. CCLXV.

Fig. I.



Se. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Boletus ramosissimus.*

*Polyporus umbellatus.* 1727-1729



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE QVINTAE.

BOLETVS TRICESIMVS.

Est fungus tubulosus, esculentus, bicolor, ramosus, farctus, carnosus, arborius, parum varius; pileis ab initio globosis, post hemisphaericis; petiolis varie flexis & tortuosis. In *Bauaria* dicitur *Eichhaase*.

Fig. I. Fungus, quoad faciem anteriorem.

Erklärung der zweyhundert fünf und sechzigsten Kupfertafel.

Der dreysigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, estbarer, zweyfärbiger, aestiger, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Baumschwamm; mit anfangs kugelrundem, nachher halbrundem Hute; mit verschieden gebogenem und gerundem Stiele. Heisset in *Bayern* *Eichhaase*.

Fig. I. Der Schwamm, wie er sich auf der vordern Seite zeigt.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SEXTAE.

BOLETVS ANTECEDENS TRICESIMVS.

Vt de structura boleti antecedentis eo magis iudicari queat,  
haec tabula eum a parte inferiori seu posteriori exhibet.

Fig. I. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem seu posteriorem.

Fig. II. Ramulus huius fungi ad perpendicularum dissecti.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und sechzigsten Kupfertafel.

Der vorhergehende dreßzigste Bilz.

Damit der Bau dieses Bilzes um so kenntlicher seyn möge; so habe ich  
solchen auf dieser Tafel noch einmal abbilden lassen.

Fig. I. Der entwiцfelte Schwamm, nach seiner Unterfläche und nach der Hinterfläche.

Fig. II. Ein senkrecht abgeschnittener Ast dieses Schwammes.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.

St. I. p. R.

L. G. Esc. R.

*Boletus ramosissimus.*  
*Polyporus umbellatus,*



Tab. CCL. XVII.



*Boletus mesentericus*, Sch.

con huius referri debet *B. imbricatus* Bull. t. 260  
*Polyporus giganteus* L. Abh. 3200



BOLETVS TRICESIMVS PRIMVS.

Est fungus tubulosus, bi- vel tricolor, plerumque multiplex, durus, floriformis; petiolo plano, ad oram varie exciso & formato; petiolo inuerse conico. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum, & pileo & petiolo connatorum.

Fig. II. Fasciculus fungorum, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und sechzigsten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigste Bilz.

Es ist ein röhriger, zwey- oder dreyfärbiger, meistens vielfacher, harter, blumenähnlicher Schwamm; mit flachem, am Rande mannigfaltig aus- und eingeschnittenem Hute; mit einem umgekehrt kegelligen Stiele. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, mit den Hüten und Stielen zusammen gewachsen.

Fig. II. Ein Büschel Schwämme, nach der Unterfläche.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE OCTAVAE.

BOLETVS TRICESIMVS SECVNDVS.

Est fungus tubulosus, bicolor, lignarius, & simplex & multiplex, membranaceus, fessilis, foliaceus & floriformis. A *Bauaris* nullo nomine insignitur.

Fig. I. Fungi, & multiplices, & simplices, ligno insidentes.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und sechzigsten Kupfertafel.

Der zwey und dreyßigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zweyfärbiger, so wohl einzelner als vielfacher, häutger, stielloser, blättericher und blumenähnlicher Schwamm. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Einzelne und vielfache Schwämme; wie sie aus dem Holze gewachsen sind.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Fig. I.



Fig. II.




Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



*Boletus atrovirens*, Lk.  
*Polyporus versicolor* fr. v. Lk. Kbh. 3140  
 non Beschreiv. 45





*Pileatus multicolor*, Schaeff.

Leonardus Rabenh. 3174.  
w. h. f.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE NONAE.

BOLETVS TRICESIMVS TERTIVS.

Est fungus tubulosus, sessilis, lignarius, membranaceus, persistens; pileo plerumque semicirculari, lineolis concentricis, a centro ad oram radiatis, picto. In *Bavaria* nomen est nullum.

Fig. I. II. Fungi variae figurae, ligno insidentes.

Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Particula fungi dissecti.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und sechzigsten Kupfertafel.

Der drey und dreszigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, stielloser, holziger, häutiger, dauerhafter Schwamm; mit meistens halbkugelrundem, und in der Mitten gegen den Rand zu gestrahltem, zirkelförmigem Hute. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von unterschiedener Gestalt, wie sie dem Holze ansehn.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein Stückgen Schwamm, senkrecht abgeschnitten.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE.

BOLETVS TRICESIMVS QVARTVS.

Est fungus tubulosus, bicolor, durus, & lignarius & lignosus, fessilis; pileo semicirculari, vndoso. Forsan varietas boleti vicesimi sexti? Tab. CXXXVII. CXXXVIII.

Fig. I. Fungus, quoad faciem superiorem.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und siebenzigsten Kupfertafel.

Der vier und drehzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zweyfärbiger, harter, holziger, stielloser Holzschwamm; mit einem halbkreisförmigen, gewässerten Hute. Vielleicht eine Abänderung des sechs und zwanzigsten Bilzes? Tab. CXXXVII. CXXXVIII.

Fig. I. Der Schwamm nach seiner Oberfläche.

Fig. II. Der Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



L'ail. mine et f. Rot.

*Boletus ellipticus.*  
*Boletus semioroides, Sch.*  
*Polyporus marginatus 3159.*



**Bibliothek**  
der landwirtschaftlichen Fakultät  
der Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg





HYDNA  
Stachelschwämme.

K

EXPLI.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE PRIMAE.

HYDNVM NONVM.

Est fungus vnicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, fus, duriusculus, varius; pileo plano, integro vel varie exciso & inciso, ad oram radiato; petiolo breui, inuersè conico, infra rotundato vel truncato. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, varie inciso, ad oram radiato & reuoluto.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und siebenzigsten Kupfertafel.

Der neunte Stachelschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, meistens einzelner, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit flachem, ganzen oder mannigfaltig aus- und eingeschnittenem, am Rande gestrahltem Hute; mit einem kurzen, umgekehrt kegelligen, unten gerundeten oder abgestuften Stiele. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, mannigfaltig ein- und ausgeschnittenem, am Rande gestrahltem und aufgerolltem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCLXXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Se. L. r. R.

T. G. N. P.

*Hydnum striatum, Sch.*  
*Scabrescens var.*



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



St. L. p. R.

L. G. F. sc. R.

*Hydnum pullum.*  
*Hydnum melaleucum* fr. ab. 3073



HYDNVM DECIMVM.

Est fungus bicolor, plerumque solitarius, farctus, membranaceus, varius; pileo plano, ad oram fimbriato, exciso, saepe floriformi; petiolo cylindraceo, radicem versus tenuiori. *Bauari* nomen nesciunt.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor quasi dipetalus, maior quoad faciem inferiorem.

Fig. II. Par fungorum connatorum.

Fig. III. Fungus quasi floriformis, monopetalus.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und siebenzigsten Kupfertafel.

Der zehente Stachelschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens einzelner, voller, häutiger, abänderlicher Schwamm; mit flachem, am Rande bekräntem und ausgeschnittem, blumenartigem Hute; mit einem runden, nach unten zu dünnern, Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein paar Schwämme, davon der kleinere zweyblättrig, der grössere aber nach seiner Unterfläche sich zeigt.

Fig. II. Ein paar zusammengewachsene Schwämme.

Fig. III. Ein gleichsam einblättriger, blumenartiger Schwamm.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE TERTIAE.

HYDNUM VNDECIMVM.

Est fungus vni- seu bicolor, solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo conuexo, squamoso; petiolo inuerse conico. Nomine in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conuexo, squamoso, quasi reniformi, in centro depresso.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und siebenzigsten Kupfertafel.

Der eilfte Stachelschwamm.

Es ist solcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem gewölbtem, schuppigen Hute; mit einem umgekehrt kegelligen Stiele. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit gewölbtem, schuppigem, gleichsam nierenförmigem und in der Mitte vertieftem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

ELVELAE



Tab. CCLXXXIII.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



St. L. p. R.

I. C. F. s. R.

*Hydnum squamosum.* v. L.  
*subsquamosum* Kth 3091.







ELVELAE:  
Saltenschwämme.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVARTAE.

ELVELA VICESIMA PRIMA.

Est fungus sessilis, bicolor, & simplex & multiplex, cereus, fragilis, intus & extus laevis, cyathiformis, varie contortus & plicatus. *Bavari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungi explicari incipientes.

Fig. II — VI. Varietates huius fungi, diversae explicationis & figurae.

Fig. VII. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. VIII. IX. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und siebenzigsten Kupfertafel.

Der ein und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein stielloser, zweyfärbiger, so wohl einzelner als vielfacher, wächserner, zerbrechlicher, von außen und innen glatter, becherartiger, auf mannigfaltige Art gewundener und gefalteter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Einige Schwämme, wie sie sich eben entwickeln.

Fig. II — VI. Abänderungen dieses Schwammes; nach verschiedenen Entwickelungen und Gestalt.

Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



St. L. p. R.

I. G. F. 12. R.

*Peziza umbrina.*  
*Elvela oditoleuca*, Schaef.  
*Peziza scutellata*, Pers., 2805.



Tab. CCLXXV

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.




Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VIII.

Se. L. p. R.

L. G. F. p. R.

*Elvela tubulosa* Schaaff.  
*Crocodrellus clavatus* Schaaff. *Sept. 30/7*  
 165 168



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVINTAE.

ELVELA VICESIMA SECVNDA.

Est fungus bicolor, & solitarius & cespitosus, coriaceus, tubiformis, valde varius. Forſan varietas eluelae decimae ſeptimae. Tab. CLXV.

Fig. I. Fungus ore amplo.

Fig. II. III. Fungi explicari incipientes, ore fere clauſo.

Fig. IV. V. Varietates huius fungi.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. VIII. Pollen natius & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der zwey und zwanzigſte Kaltſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, lederhafter, trompetenähnlicher, ſehr abänderlicher Schwamm. Vielleicht eine Abänderung des ſiebenzehenden Kaltſchwammes. Tab. CLXV.

Fig. I. Ein Schwamm, mit etwas offener Mündung.

Fig. II. III. Schwämme, die ſich zu entwickeln anfangen, mit noch meiſt verſchloſſener Mündung.

Fig. IV. V. Abänderungen dieſes Schwammes.

Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SEXTAE.

ELVELA VICESIMA TERTIA.

Est fungus bicolor, & simplex & multiplex, carnosus, durisculus, clauiformis, plicatus, supra truncatus, varie incisus & excisus. Num varietas eluelae decimae sextae? Tab. CLXIV.

- Fig. I. Fungi quatuor connati.  
Fig. II. Fungus solitarius, ad radicem fissus.  
Fig. III. Fungus supra duplex, infra simplex.  
Fig. IV. Fungus clauam referens.  
Fig. V. Fungus floriformis.  
Fig. VI. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. VII. VIII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und siebenzigsten Kupfertafel.

Der drey und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, so wohl einzelner als vielfacher, fleischiger, härlicher, käulartiger, gefaltener, oben abgestutzter, mannigfaltig aus- und eingeschnittener Schwamm. Vielleicht eine Abänderung des sechzehenden Faltenschwammes? Tab. CLXIV.

- Fig. I. Vier zusammen gewachsene Schwämme.  
Fig. II. Ein einzelner, unten gespaltenen Schwamm.  
Fig. III. Ein oben doppelter, unten einfacher Schwamm.  
Fig. IV. Ein käulenartiger Schwamm.  
Fig. V. Ein blumenähnlicher Schwamm.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.





*Elvela purpurascens, Sch.*  
*Craterellus cochleatus, Fr.*



Tab. CCLXXVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. IV.



S. L. f. R.

L. G. F. R.

*Elvela infundibuliformis.*  
*Discina scrobiculata. v. H.*



ELVELA VICESIMA QVARTA.

Est fungus bicolor, plerumque cespitosus, coriaceus, intus  
& extus laevis, florem seu tubam referens. Nomine in  
*Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. Trias fungorum, variae figurae.

Fig. II. Fungi quoad faciem exteriorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und siebenzigsten Kupfertafel.

Der vier und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens vielfacher, lederhafter, von  
innen und aussen glatter, blumenartiger, oder trompetenähnlicher  
Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey Schwämme, von verschiedner Gestalt.

Fig. II. Schwämme, wie sie sich von aussen zeigen.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



ELVELA VICESIMA QVINTA.

Est fungus vnicolor, & solitarius & cespitosus, coriaceus, extus & intus laevis, ad oram varie excisus, florem & tubam aemulans. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum, flores infundibuliformes aemulantium.

Fig. II. Fungus solitarius.

Fig. III. Fungus ramosus, quoad faciem posteriorem.

Fig. IV. V. Varietates huius fungi.

Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und siebenzigsten Kupfertafel. ]

Der fünf und zwanzigste Saltenschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, so wohl einzelner als vielfacher, lederhafter, von aussen und innen glatter, am Rande mannigfaltig ausgeschnittener, blumen- und trompetenartiger Schwamm. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel blumentrichterartige Schwämme.

Fig. II. Ein einzelner Schwamm.

Fig. III. Ein ästiger Schwamm; nach seiner Hinterfläche.

Fig. IV. V. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCLXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. VI.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



S. L. p. R.

I. G. P. sc. R.

*Helvela floriformis*, Lh.  
*Helvella crispa*, Bull.  
*Cantarellus undulatus* fr.  
*Thelephora* " *multa*



Tab. CCLXXIX.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.



I. 201. p. 10. 2. 2. 2.

*Elvela clavus*, Sch.

*Asperophora lycoperidoides* v. Fr. Hb. 2542.



ELVELA VICESIMA TERTIA.

Est fungus vnicolor, & solitarius & caespitosus, membranaceus, extus & intus laevis; pileo conuexo; petiolo cylindraceo. Nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus ex genere agaricorum, cuius pileo eluelae insident.

Fig. II. Eluela, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Eluela ad perpendicularum dissecta.

Fig. IV. V. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und siebenzigsten Kupfertafel.

Der sechs und zwanzigste Kaltenschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, theils einzelner, theils vielfacher, von außen und innen glatter Schwamm; mit einem gewölbten Hute; und einem runden Stiele. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Blätterschwamm, dessen Hute die Kaltenschwämme aufsitzen.

Fig. II. Ein Kaltenschwamm, nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Kaltenschwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE.

ELVELA VICESIMA SEPTIMA.

Est fungus sessilis, unicolor, plerumque simplex, cereus, fragilis, cauus, laevis, infra plicatus, supra varie excisus, saepe cyathiformis. *Bauari* nomen nesciunt.

- Fig. I. Fungus maior, oblongus, excavatus, infra plicatus, supra excisus.  
Fig. II. III. Varietates huius fungi.  
Fig. IV. Fungus cyathiformis.  
Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und achtzigsten Kupfertafel.

Der sieben und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein stielloser, einfärbiger, meist einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, hohler, glatter, unten gefaltener, oben mannichfaltig ausgezackter, oft becherartiger Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein größerer, länglicher, ausgehöhlter, unten gefalteter Schwamm.  
Fig. II. III. Abänderungen dieses Schwammes.  
Fig. IV. Ein becherartiger Schwamm.  
Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCLXXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Leicht vom or. d. K.

*Peziza pyxidata*, Sch.

concreta Sch.

*Peziza marsupium* *pyxidata*  
Pers. Mycol. p. 641.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



L. Sch. pinet. & Rar.

*Elvela Pileus, Sch.*  
*Polyporus brumalis fr. v. Sch.*



ELVELA VICESIMA OCTAVA.

Est fungus bicolor, & petiolatus & fessilis, cereus, fragilis, laevis; pileo rotundo vel tricuspidato. Nomen in *Bauaria* habet nullum.

Fig. I. Fungus petiolatus, capitulo tricuspidato.

Fig. II. Fungus fessilis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und achtzigsten Kupfertafel.

Der acht und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl stielloser, als bestielter, wachsartiger, zerbrechlicher, glatter Schwamm; mit einem rundlichen und dreyspitzigen Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein bestielter Schwamm, mit dreyspitzigem Hute.

Fig. II. Ein stielloser Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



ELVELA VICESIMA NONA.

Est fungus unicolor, solitarius, cereus, fragilis, phalliformis; pileo inflato, plicato, in mucrones definente; petiolo inflato, radicem versus bulbofo, extus plicato, intus fistuloso. *Bavaris* anonymus.

Fig. I. Fungus bicuspidatus.

Fig. II. Fungus tricuspidatus.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und achtzigsten Kupfertafel.

Der neun und zwanzigste Kaltenschwamm.

Es ist ein einfärbiger, einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, unächter Moorgeschwamm; mit aufgeblasenem, gefaltenem, spitzig auslaufendem Hute; mit aufgeblasenem, nach unten zu knolligem, von außen gefaltenem, von innen hohlem Stiele. Hat keinen Namen in Bayern.

Fig. I. Ein zweyspitziger Schwamm.

Fig. II. Ein dreyspitziger Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-





Fig. I.



Fig. II.



Fig.

III.

Fig. IV.



Fig. V.



Lonbi p. m. v. s. h. M. s.

*Helvella leucophaca.*  
*Elvela pallida, Sh.*

*Helvella crispa* M. 1917, v. s. h.





Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



*Leont. pinn. et R. Rat.*

*Elvela spadicea, Sch.*

or *H. monachella*. 2903. Alp.



ELVELA TRICESIMA.

Est fungus uni- vel bicolor, folitarius, cereus, fragilis, phal-  
liformis; pileo membranaceo, plicato, compresso, varie  
exciso, incertae figurae; petiolo compresso, curuato,  
saepe plicato. Nomen in *Bauaria* est nullum.

Fig. I. Fungus pileo compresso; petiolo tenui, plicato, quasi contorto.

Fig. II. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. III. Fungus maior; pileo deformi; petiolo crasso, rotundiusculo.

Fig. IV. V. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und achtzigsten Kupfertafel.

Der dreyßigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, wachsartiger, zer-  
brechlicher, unächter Moorgeschwamm; mit einem häutigen, gefal-  
teten, gedruckten, mannigfaltig ausgeschnittenen Hute; mit einem  
gedruckten, gebogenen, oft faltigen Stiele.

Fig. I. Ein Schwamm mit gedrucktem Hute; mit einem zarten, gefalteten und  
gleichsam gewundenen Stiele.

Fig. II. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. III. Ein grösserer Schwamm; mit ungestaltetem Hute; und einem dicken  
rundlichen Stiele.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE QVARTAE.

ELVELA TRICESIMA PRIMA.

Est fungus ex minoribus, sessilis, vnicolor, coriaceus, cyathi in formam excavatus, hemisphaericus; intus laevis. extus & in margine hirsutus, radicibus tenuissimis praeditus. Apud Bauaros nomen habet nullum.

- Fig. I. Fungi variae figurae & magnitudinis.  
Fig. II. III. Varietates huius fungi.  
Fig. IV. Fungus lente auctus, quoad faciem internam & externam.  
Fig. V. Fungus, quoad faciem internam.  
Fig. VI. Fungus radicibus tenuissimis donatus.  
Fig. VII. VIII. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und achtzigsten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigste Faltenschwamm.

Es ist ein kleiner, stielloser, einfärbiger, lederhafter, becherartiger, halb-cirkelrunder, inwendig glatter, auswendig und am Rande haariger, bewurzelter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Schwämme von verschiedener Gestalt und Größe.  
Fig. II. III. Abänderungen dieses Schwammes.  
Fig. IV. Ein vergrößerter Schwamm, nach seiner innern und äussern Fläche.  
Fig. V. Ein vergrößerter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. VI. Ein Schwamm mit seinen zarten Wurzeln.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.

Bibliothek  
der landwirthschaftlichen Fakultät  
der Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Löwbl. pinus. A. K. 1805.

*Peziza scutellata*, L. v. H. Bot. 2805,  
*Elvela ciliata*.







CLAVARIAE.  
K a u l s c h w ä m m e.

M

EXPL.



CLAVARIA DECIMA.

Est fungus coralloides, bicolor, mollis, carnosus; corpore multifido, ramoso; ramis ab initio obscuris, in apices brevissimos terminatis. In *Bavaria* nomine caret.

Fig. I. Fungus recens natus, ramis obscuris.

Fig. II. Fungus minor.

Fig. III. Ramus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Fungus evolutus, ramis multifidis.

Fig. V. Pollen nativus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und achtzigsten Kupfertafel.

Der zehende Kaulschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, weicher, fleischiger, vielspaltiger, ästiger Corallenschwamm, dessen Nester anfangs wenig sichtbar sind, und in zarte Spitzen auslaufen. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein noch nicht ausgewachsener Schwamm; mit noch unsichtbaren Nesten.

Fig. II. Ein dergleichen kleiner Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Ast.

Fig. IV. Ein ausgewachsener Schwamm, mit häufigen und gespaltenen Nesten.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Lehl p. et. f. Rat

*Clavaria flavescens.*  
*aurca. v. h. 2523. A. h.*



Tab. CCLXXXVI.



*Clavaria flava.*  
*conjugata, sp. 3*

Leibl pins, et. J. L. L.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE SEXTAE.

CLAVARIA VNDECIMA.

Est fungus coralloides, fere vnicolor, carnosus, mollis; corpore multifido, ramoso; ramis ab initio crasslis, & in apices breuissimos terminatis. In *Bauaria* nomine insignitur nul'o.

Fig. I. II. Fungi diuersae figurae.

Fig. III. Fungus integer.

Fig. IV. Ramus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und achtzigsten Kupfertafel.

Der eilfte Käulschwamm.

Es ist ein meist einfärbiger, fleischiger, weicher, vielspaltiger, ästiger Corallenschwamm; dessen Aeste einen dicklichen Anfang haben und sich in sehr kurze und kleine Spitzen endigen. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme, von verschiedenem Aussehen.

Fig. III. Ein Ast ganz und unzerschnitten.

Fig. IV. Ein Ast senkrecht zerschnitten.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE SEPTIMAE.

CLAVARIA DVODECIMA.

Est fungus coralloides, bicolor, carnosus, mollis; corpore  
ramoso; ramis ab initio crassioribus vel tenuioribus, in  
apices breuissimos terminatis. Nomine in *Bauaria* gaudet  
nullo.

Fig. I. II. Fungi diuersae explicationis & figurae.

Fig. III. Ramus huius fungi.

Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und achtzigsten Kupfertafel.

Der zwölfte Käulschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fleischiger, weicher, ästiger, Corallen-  
schwamm; dessen Aeste einen dicken Anfang nehmen, und in sehr  
kurze Spitzen auslaufen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. III. Ein Ast dieses Schwammes.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.


Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.









*Clavaria rufescens*, Sch.  
*aurea*, Sch.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE OCTAVAE.

CLAVARIA DECIMA TERTIA.

Est fungus coralloides, tricolor, carnosus, mollis; corpore ramoso, ramis ab initio crassioribus vel tenuioribus, in apices tenuissimos terminatis. In *Bauaria* nomen habet nulum.

Fig. I. II. Fungi diuersae explicationis & figurae.

Fig. III. Ramus huius fungi.

Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und achtzigsten Kupfertafel.

Der dreyzehende Käulschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, fleischiger, weicher, ästiger Corallenschwamm; dessen Nester anfangs mehr oder weniger dicke sind, und in zarte Spizen auslaufen. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. III. Ein Ast dieses Schwammes.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



CLAVARIA DECIMA QVARTA.

Est fungus coralloides, vnicolor, carnosus, duriusculus; corpore multifido, ramofo; ramis in apices, & longiores & breuiiores, acutos vel truncatos, terminatis, cornua ceruina optime aculantibus. In *Bauaria* nomen desideratur.

Fig. I. Fungus, ramis acute & truncate terminatis.

Fig. II. Ramulus maior & integer.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und achtzigsten Kupfertafel.

Der vierzehende Käulschwamm.

Es ist ein meistens einfärbiger, fleischiger, etwas harter Corallenschwamm; dessen Nester sich theils in längere, theils in kürzere, scharfe und abgestuhte, Spizen endigen, und welche denen Hirschgeweihen ziemlich ähnlich sehen. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, dessen Nester theils scharf spizig, theils abgestuht, auslaufen.

Fig. II. Ein etwas grosser und unzerschnittener Schwamm.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrösserte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCLXXXIX.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. II.



Lindb. n. et L. Rar.

*Clavaria cornuta*, comp. L. n.

unicomata n. Nr. 2608





Fig. I.



Fig. II.

Fig. IV.



Fig. III.



*Clavaria gemmata*, Schaef.

*Craterellus pistillarius* var. *an Clavaria pistillaris* Rph 3



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE.

CLAVARIA DECIMA QVINTA.

Est fungus perpendicularis, vnicolor, solitarius, carnosus, durisculus, gemmatus, clauam herculeam optime referens.  
In *Bauaria* nomen ignotum est.

- Fig. I. Fungus, quoad faciem exteriorem.  
Fig. II. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. III. Pollen natiuus.  
Fig. IV. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunzigsten Kupfertafel.

Der funfzehende Käulschwamm.

Es ist ein gerader, einfärbigter, einzelner, fleischiger, härlicher, wie mit Edelgesteinen besetzter Schwamm; der mit einer Herkuleskåule viel ähnliches hat.

- Fig. I. Der Schwamm nach seinem äußern Ansehen.  
Fig. II. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE PRIMAE.

CLAVARIA DECIMA SEXTA.

Est fungus unicolor, solitarius, non ramosus, parum carnosus, mollis, in apices tenuissimos terminatus. *Bavaris* nomen ignotum.

Fig. I. II. Fungi variae figurae.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und neunzigsten Kupfertafel.

Der sechzehende Käulschwamm.

Es ist ein einfärbiger, einzelner, ästenloser, wenig fleischiger und härterer Schwamm, und der sich in sehr zarte und vielfache Spitzen theilt und ausläuft. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

LYCO.



Tab. CCXCI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.

Löblp. et Sc. Rat.

*Clavaria laciniata.*  
*Clavaria rugosa*, Bull. in An. Mch. 25, 31.







LYCOPEDRA.  
Staubschwämme.

N

EXPLI.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE NONAGESIMAE SECVNDAE.

LYCOPERDON VNDECIMVM.

Est fungus vnicolor, petiolatus, &, vt mihi videtur, plane deformis. Num varietas lycoperdi sexti, vel decimi quarti? Tab. CLXXXVII. CCXCXV.

Fig. I. Fungus deformis, cuius petiolo fungi minores agariciformes adnati sunt.

Erklärung der zweyhundert zwey und neunzigsten Kupfertafel.

Der eilfte Staubschwamm.

Es ist ein einfacher, befielter, und, wie ich davor halte, ungestalteter Schwamm. Vielleicht eine Abänderung des sechsten oder vierzehenden Staubschwammes. Tab. CLXXXVII. CCXCXV.

Fig. I. Der ungestaltete Schwamm, dessen Stiele zwey blätterschwammähnliche kleinere Schwämme angewachsen sind.

EXPLI.



Tab. CCXCII.

Fig. I.




Loibl p. u. Sc. P.

*Lycoperdon excipuliforme:*

*gemmatum compositum v. l.*

187  
295





*Lycopodium pyriforme*. Roth, 2381.  
 polymorph. v. Calloni, v. Roth



EXPLICATIO TABVL DVCENTESIMAE NONAGESIMAE TERTIAE.

LYCOPERDON DVODECIMVM.

Est fungus vnicolor. & petiolatus & sessilis, & piriformis & oblongus, saepe deformis; per maturitatem quoad partem superiorem in furfuraceas portiunculas, & quoad pulpam internam in pollinem farinaceum, solutus; parte inferiori & petiolo persistente. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus petiolatus piriformis; capitulo marmoreo.

Fig. II. III. Fungi sessiles, oblongi; capitulis vndosis.

Fig. IV. Fungus deformis; capitulo gemmato.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und neunzigsten Kupfertafel.

Der zwölfte Staubschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, so wohl befielter, als stielloser, so wohl birnförmiger, als länglicher, Schwamm; dessen obere Hälfte sich nach und nach in allerhand kleine Stücken, das innere Wesen in einen Saamenstaub, auflöset; die untere Hälfte aber, nebst dem Stiele, lange Zeit sich unverletzt erhält.

Fig. I. Ein befielter birnartiger Schwamm; mit gemarmortem Kopfe

F. II. III. Ein stielloser länglicher Schwamm; mit gewässertem Kopfe.

Fig. IV. Ein ungestalteter Schwamm; mit gestreuetem Kopfe.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE NONAGESIMAE QVARTAE.

LYCOPERDON DECIMVM TERTIVM.

Est fungus unicolor, subglobosus, sessilis, petiolo tamen spurio saepe donatus, supra quasi punctatus, infra radicatus; per maturitatem quoad superiorem partem solutus & difflatus, quoad inferiorem persistens; interne lanugine filamentosa & pollinifera repletus. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus integer, quoad facem superiorem.

Fig. II. Fungus integer, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und neunzigsten Kupfertafel.

Der drenzehende Staubschwamm.

Es ist ein einfärbiger, rundlicher, stielloser, wenigstens nur unächt befestigter, oben gedoppelter, unten bewurzelter Schwamm; dessen obere Hälfte sich nach und nach auflöst und verschiebet, die untere aber lange Zeit übrig bleibt; und dessen inneres Wesen mit einer sadigen Saamenvolle angefüllt ist. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein unverletzter Schwamm, nach seiner Oberfläche.

Fig. II. Ein unverletzter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



Tab. CCXCIV.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.

Sc. L. p. R.

I. C. F. sc. R.

*Lycopodium furfuraceum*. Abb. 2382, c. ?  
*polymorphum* v. L.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Sc. L. p. 2.

I. G. F. R.

*Lycoperdon excipuliforme* 23826. 1364

T 137

292



LYCOPERDON DECIMVM QVARTVM.

Est fungus vnicolor, petiolatus; ab initio stellulis minimis ob-  
situs, post laevis; per maturitatem in furfuraceas portiun-  
culas, & quoad pulpam internam in pollinem farinaceum,  
solutus; petiolo persistente. *Bauaris* nomen est nullum.

Fig. I. Fungus recens natus, stellulis obsitus.

Fig. II. Fungus per aetatem laevis.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und neunzigsten Kupfertafel.

Der vierzehende Staubschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, bestielter, anfänglich zart besterter, mit  
der Zeit glatter Schwamm; der oben sich nach und nach in aller-  
hand Stücke, das innere Wesen in einen Saamenstaub, auflöset,  
der Stiel aber sich lange Zeit erhält. Hat in B a y e r n keinen Namen.

Fig. I. Ein besterter ordentlicher Schwamm.

Fig. II. Ein glatter älterer Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.







MVCORES.

Unächte Staubschwämme.

EXPL.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE NONAGESIMAE SEXTAE.

MVCOR QVINTVS.

Est fungus ex minimis, lignarius, sessilis, globosus; recens natus argenteus, post flauescens, denique nigrescens; cortice tenui, in puluerem per aetatem fatiscens, obductus; interne polline, filamentis adhaerente, repletus. *Bauaris* anonymus.

- Fig. I. Fungus recens natus, colore argenteo.  
Fig. II. Fungus senior, colore flauescens.  
Fig. III. Fungus maturus, colore nigrescente.  
Fig. IV. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und neunzigsten Kupfertafel.

Der fünfte unächte Staubschwamm.

Es ist solcher ein kleiner, stielloser, kugelförmiger, anfangs silberfarbiger, nachher gelblicher, und endlich schwärzlicher Hellschwamm; dessen zarte Rinde mit der Zeit aufspringet, und den innerhalb liegenden Saamenstaub abfliegen läßt. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein erst entstandener silberfarbiger Schwamm.  
Fig. II. Ein älterer gelblicher Schwamm.  
Fig. III. Ein vollkommener reif gewordener schwärzlicher Schwamm.  
Fig. IV. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.



Tab. CCXCVI.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. II.



Fig. III.



St. L. p. R.

I. G. F. s. R.

*Mucor granulatus*, St.

*Trichia ? varia*, v. L. Abb. 2162.



Tab. CCXCVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



*Mucor Aemonitis.*  
*Aemonitis Typhina.*

*Typhina in H. Abh. 226.*



MVCOR SEXTVS.

Est fungus ex minimis, lignarius, petiolatus; recens natus colore carneo, maturus nigro; capitulo membrana tenuissima, per aetatem dehiscente, pollinemque eiiciente, obducto; petiolo gracili, recto vel curuato. *Bauaris* nomen est nullum.

Fig. I. Fungi recens nati, colore carneo.

Fig. II. Fungi maturi, colore nigro.

Fig. III. Trias fungorum, vitro auctorum.

Fig. IV. Fungus lente auctus, maturus, pileo dehiscente et pollinem eiiciente.

Fig. V. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und neunzigsten Kupfertafel.

Der sechste Schimmelschwamm.

Es ist solcher ein kleiner, bestielter, anfangs fleischfarbiger, zuletzt schwarzer Holzschwamm; mit einem dünnhäutigen, in der Zeitfolge zerplattendem, und den Saamenstaub von sich werfenden, Kopfe; mit einem ganzen, geraden oder gekrümmten Stiele.

Fig. I. Schwämme, in ihrem ersten Zeitalter, und wie sie eine Fleischfarbe haben.

Fig. II. Schwämme, in ihrer Reife, und wie sich die anfängliche Fleischfarbe in eine schwarze verwandelt hat.

Fig. III. Drey vergrößerte Schwämme.

Fig. IV. Ein reifer vergrößerter Schwamm, mit aufgesprungenem Kopfe und von sich werfendem Saamenstaube.

Fig. V. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.

O

PHALLI



Bibliothek  
der landwirtsch.-mathem. Fakultät  
der Martin-Luther-Universität  
Halle - Wittenberg



# PHALLI.

Siebt = oder Morchelschwämme.

EXPLI.



EXPLICATIO TABVL. DVCENTESIMAE NONAGESIMAE OCTAVAE.

PHALLVS TERTIVS.

Est fungus esculentus, vnicolor seu bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, conico, acute seu obtusè terminato; intus inflato seu excauato; petiolo cylindraceo, laevi, ad radicem tuberoso, intus fistuloso. In *Bauaria* dicitur: *Grosse Maurache*.

Fig. I. II. Fungi variae figurae.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und neunzigsten Kupfertafel.

Der dritte Morchelschwamm.

Es ist ein essbarer, ein oder zweyfärbiger, häutiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Morchelschwamm; mit einem gegitterten, fegeligen, mehr und weniger spizig auslaufenden, aufgeblasnen, und inwendig hohlen, Kopfe; mit einem glatten, runden, und unten knoligen Stiele. In *Bayern* heist er *grosse Maurache*.


Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt.

Fig. III. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI.





*Phallus esculentus* L.  
*Morchella esculenta*, Pers.

14. 2915  
 7. 199



Tab. CCXCIX.

Fig. V.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. III.



St. L. p. R.

Fig. II.



L. G. F. sc. R.

*Phallus esculentus.*  
Horchel

W. 1. 1/2



PHALLVS QVARTVS.

Est fungus esculentus, bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, & acute & obtuse terminato, inflato, intus excauato; petiolo cylindraceo, laevi, radicem versus crasso. In *Bauaria* nomine *grosse Maurache* gaudet. Num varietas fungi antecedentis.

Fig. I. II. Fungi variae figurae.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und neunzigsten Kupfertafel.

Der vierte Morchelschwamm.

Es ist solcher ein essbarer, zweyfärbiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Schwamm; mit einem gegitterten, sowohl scharf spitzig, als auch stumpf spitzig, auslaufenden, aufgeblasenen, inwendig hohlen Kopfe; mit einem runden, glatten, nach unten zu dickeren Stiele. Ist in *Bayern* unter dem Namen *grosse Maurache* bekannt.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.

EXPLI-



PHALLVS QVINTVS.

Est fungus esculentus, bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, conico, rotunde acuminato, inflato, intus cauo, saepe deformi; petiolo cylindraceo, tuberoso, intus fistuloso. In *Bauaria* appellatur *grosse Maurache*.

Fig. I. Fungus capitulo conico, rotunde acuminato.

Fig. II. Fungus capitulo deformi, elusiformi.

Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der dreyhundertsten Kupfertafel.

Der fünfte Morchelschwamm.

Es ist solcher ein essbarer, zweyfärbiger, häutiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Schwamm; mit gegittertem, fegeiligem, rundlich zugespitztem, aufgeblasenem, inwendig hohlem, oft ungestaltetem Koyse; mit einem runden, aufgeblasenen, inwendig hohlen Stiele. Heisset in Bayern insgemein *grosse Maurache*.

Fig. I. Ein Schwamm, mit fegeiligem und rundlichspitzig auslaufendem Koyse.

Fig. II. Ein Schwamm, mit einem ungestalteten, faltenschwammähnlichen Koyse.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamensaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamensaub.



Tab. CCC.



Fig. V.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.

Sc. L. p. R.


I. G. F. v. R.

*Phallus esculentus* L.  
*Morchella esculenta*, Pers.  
*crucij. p. v. R.*
































66  
239

Incant. sub no. 772. fol. 89A.

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI  
F V N G O R V M

QVI IN  
BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA  
RATISBONAM

NASCVNTVR

ICONES

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE

EDITIO NOVA

COMMENTARIO AVCTA

A  
DR. C. H. PERSOON.



TOMVS TERTIVS.

ERLANGAE

APVD IOANNEM IACOBVM PALMIUM

