



DISSERTATIO PERIODICA
DE
**PLEBOTOMIA APVD PLE.
THORICOS CATHARSI
PRAEMITTENDA**

QVAM

PRAESIDE

IOHANNE FRIDERICO CARTHEVSER,

MED. DOCT. ET PROF. PVBL. ORD.

Die XXX. Novembr. MDCCXXXVII.

H. L. Q. C.

DEFENDET

AVCTOR


DANIEL FRIDERICVS MÖSTNER,

BEVTHENA - SILESIUS.



FRANCOFVRTI ad VIADRVM,

Typis IOHANNIS CHRISTIANI WINTERI, Acad. Reg. Typ.



§. I.

Plethora, quæ in genere sanguinis boni abundantiam, qua corporis functiones plus minusve laeduntur, denotat, vulgo in *plethoran* ad *mensuram* sive *vasa*, & *plethoran* ad *pondus* sive *vires* dividitur: Hæc in vera croris densi, ac solito ponderosioris abundantia, cui nulla, vel non adeo notabilis tamen vasorum turgescentia juncta deprehenditur, consistit, & proinde unice propemodum ex virium imminutione cognoscitur; illa autem ex sola vasorum turgescentia patescere, ac meram sanguinis, parum cæteroquin abundantis, expansionem atque rarefactionem, nulla virium imminutione sensibili siipatam, supponere creditur.

§. II.

Circa præmissam plethoræ divisionem multa quidem monenda forent: Attamen, ne spatiū, arctissimis hac vice limiti-

4 DE PLEBOTOMIA APVD PLETHORICOS

limitibus circumseptum, ventilando momento primario präripiatur, paucis folummodo dixisse sufficiat, distinctionem hanc, si singulas videlicet circumstantias examini rigoroso subjecere velimus, non adeo firmo niti fundamento, dum solide quemquam demonstrare posse haud credo, präfente plethora ad vasa, nullam proflus in corpore virium imminutionem observari. Perinde enim esse videtur, an justo largior sanguinis densi ac ponderosi moles, an sanguis valde rarefactus fortiori resistentia sua vasorum contractionem, cuius vigor vegeti humorum circuitus, viriumque caufa präcipua existit, minuat, languidioriique reddat.

§. III.

Plethora maxime generatur apud homines, qui vitæ sedentariae dediti corpus suum motu & laboribus parum exercent, & lauta nihilominus diæta utuntur; idque eo magis accidit atque citius, quando creberimæ aeris atque tempestatum mutationes superveniunt, & transpirationem cutaneam, partiumque solidarum tonum modo augent, modo minuunt, adeoque proportionem, quæ adsuntorum & excretorum quantitatem necessariò intercedere debet, turbant, ac plus minusve tollunt: Immo, plethora spuria, seu ad vasa apud subiecta, quæ potulenta spirituosa amant, eademque largius hauriunt, facilimè nascitur,

§. IV.

Abundantiae sanguinis frequentissimè complicata reperitur succorum impuritas, cuius origo persæpè in ventriculo & intestinis, corrupta faburra repletis, querenda est; hinc patientes quoque atque medici de vitio utroque per venæsectionem non minus, quam purgantia tempestivè removendo rectè quidem cogitant, ast multi nihilosecius circa ordinem, tempore usus observandum, creberimè committunt

tunt errores: Alii enim, qui vera artis salutaris fundamenta ignorant, vel ea tamen parum perpendunt, tum curandi, tum maxime præservandi fine, promiscue venæsectionem purgationi ventris, & hanc illi præmittere consueverunt, dum perinde esse existimant, an prior, an vero posterior primum vocetur in usum; alii autem semper catharsin, præfertim periodicam autumnalem ac vernalem, ad morbos avertendos suscepunt, plebotomiae præmittendam esse opinantur. Verum enim vero, neque his, neque illis assensum meum simpliciter possum largiri: Variæ enim circumstantiae apud subiecta diversissima occurunt, quæ nunc venam prius fecari, nunc autem ventrem prius impuritatibus collectis liberari jubent; & quum cautela hæc maxime apud subiecta plethorica observanda sit, paullo vberius in sequentibus, præmissa tamen generali Catharticorum contemplatione, ostendere conabor, plebotomiam apud homines plethoricos longe securius ante, quam post purgationem ventris, præfertim si remedium utrumque duntaxat præservandi scopo adhibendum sit, institui.

§. V.

Cathartica completa, de quibus hoc loco maxime sermo est, principio activo vel *gummoſo*, vel *resinoſo*, vel *resinoſo-gummeo*, immo, si mineralis prosapia finit, *sulphureo-arsenicali*, pro specierum diversitate nunc majori nunc minori acredine prædicto, reperiuntur instructa, & ideo etiam operationem suam in ventriculo & intestinis fortiter stimulando absolvunt. Post resolutionem enim, sive illa extra corpus per menstrua congrua, sive in ventriculo demum & intestinis liquoris gastrici &c. ope facta fuerit, particulæ sive moleculæ minores memoriarum partium tunicis hinc inde pertinaciter adhaerescunt, & a calore, aere expanso, liquoribus solventibus, & ipso motu peristaltico incitatæ & adiæ, tunicam villosam tenerimam perforando substratum nerveam

6 DE PLEBOTOMIA APVD PLETHORICOS

nerveam pungunt ac vellicant, adeoque stimulis hisce multoties reiteratis efficiunt, vt non ea tantum, sed arctissime quoque connexa musculara in celeriores & vehementiores contractiones ruat; vnde sit, vt contenta intra breve tempus liquidiora evadant, & celerius postea atque copiosius per anum expellantur.

§. VI.

Non credendum interea est, actionem purgantium in solo ventriculo, & intestinis terminari, sed inde pariter illa ipsa ad viscera vicina, immo in totum corpus, & quidem triplici modo, extenditur. Primo nimurum motus celeriores atque fortiores, in ventriculi & intestinorum tunicis per purgantium puncturas ac vellicationes fuscitati, non tantum mesenterium, quod tunicam intestinorum membranaceam format, & pleraque imi ventris viscera conneicit, ad partes abdominis, sed per nervos quoque ad remotiores corporis partes propagantur: Secundo sanguis, qui per ventriculi & intestinorum vasa progreditur, sub celeriori ac validiori tunicarum, praesertim muscularis, contractione in motum redigitur velociorem, eumque postea reliquis humoribus circumartibus communicat: Et tertio denique multae partes activae, quarum indolem in antecedente §vo adumbravi, ad ipsum sanguinem, ipsamque lympham transferuntur, &, cum liquidis hisce per vasa circumactae, canarium, praesertim minorum, parietibus vividos sub transitu, aut diuturniori hinc inde adhaesione stimulos imprimit, adeoque omnium quoque vasorum contractionem celeriorem validioremque reddunt.

§. VII.

Cognita ac debite pensata catharticorum operatione generali, effectus pariter, ab actione eorundem in corporibus

bus plethoricos exspectandi, non amplius, facta scilicet convenienti singulorum adapplicatione & comparatione, obscuri erunt. Vnumquemque enim, modice saltem rerum medicarum notitia imbutum, facilime perspecturum esse spero, quod sub ipsa eorum operatione, & post eandem necessario plethora, antea quieta, in commotam mutari, & sanguis quoque, nonnihil pridem rarefactus, ad majorem expansionis gradum deduci debeat: Quid aliud autem, superveniente mutatione memorata, metuendum, nisi densi, ponderosi, ac re vera abundantis, vel solummodo etiam, citra notabiliorum abundantiam expansi, sanguinis major in solida continentia impetus, fortior renitentia, & longe major atque violentior vasorum distensio ac turgescencia? Si antea enim fluidorum resistentia minor vim contractilem & ipsam contractionem vasorum minuere, vires in toto corpore debilitare, & motus atque functiones laedere potuit, nullo sane modo dubitandum erit, quin renitentia major, eum majori inprimis motus velocitate & impetu conjuncta, vegetae contractionis libertatem magis prohibitura, majoremque functionibus lassionem illatura sit.

§. VIII.

Leviora quidem incommoda, quæ inde oriuntur, adhuc perforanda essent, nisi subinde graviores quoque, quin gravissimæ sanitatis turbæ post usum catharticorum intempestivum apud plethoricos supervenirent. Ratio enim nos docet, quod repentinis ac violentis hisce cruxis abundantis commotionibus vehementes congestiones ad partes nobiliores & loca incongrua, nec minus periculose vasorum valde turgidorum rupturæ succedere possint, ac debeat; immo, ipsa, eaque multiplex, experientia testatur abunde, quod persæpe noxiæ ejusmodi effectus re vera succedant. Nonne igitur ex memoratis congestionibus vterius inflammations partium solitariae, quin continua febre stipatae, nec minus

8 DE PLEBOTOMIA APVD PLETHORICOS

minus apoplexia, vertigo, palpitatio aut tamen ad minimum trémor cordis, respiratio difficultis, & morbi similes resultare possunt? Nonne etiam ex vasculorum ruptura vomitus cruentus, hæmoptysis, hæmorrhagiae vteri, aliaque ominosa sanguinis profluvia subito proficiunt? Ego fane de omnibus hisce minime dubito, nec aliis quoque dubitatuos esse credo, si morborum memoratorum originem ac causas cum violentis plethorae subito commotæ effectibus conferre, & singula scrutinio vberiori submittere velint.

§. IX.

Facilius, quod adhuc monendum duco, morbi allegati inde nascentur apud subjecta plethorica, quæ simul viscerum imi ventris obstructionibus, itemque fluxus menstrui & hæmorrhoidalis suppressione laborant. Sanguis enim per purgantia modo prædicto commotus, ac libere nihilominus per vasa ac viscera abdominis obstruta meare ac remeare nesciens, adeoque ad partes superiores, maxime autem pulmones & cerebrum, largius regurgitare coactus, adeo partes laudatas obruit, vt violentæ vasorum distensiones, quin ipsæ nonnunquam rupturæ, & proinde non tantum morbi recensiti, sed ejusdem quoque commatis alii sequantur.

§. X.

Diutius profecto considerandis, explicandis, ac confirmandis hisce immorari vellem lubentissime, nisi maxima spatiū destinati angustia, de qua in limine statim conqueritus sum, ea relinquere, & pedem ad delibanda, quæ restant, promovere memet ferio juberet. Paucis nimirum adhuc

adhuc subjugendum erit, purgationem ventris, imminuta prius plethora, suscep tam, non solum longe securiorem esse, sed melius etiam atque felicius succedere. Major secu ritas ex antecedentibus liquido patescit: Quod feliciorem vero successum attinet, ille partim in detumescientia va forum sanguiferorum, & restituta contractionis libertate, partim in emendato se- & excretionis negotio suum funda mentum habet. Quando superflua enim cruoris quantitas venæflectionis beneficio ablata, ac corpus universum onere molesto liberatum est, minuitur iterum justo major fluidorum resistentia atque pressio, vasa sanguifera, præfertim arteriosa, ad naturalem redeunt diametrum, restituitur pristi nus contractionis vigor, humores rursum per vasa liberius progre di incipiunt, & se- & excretiones, quæ, præsente statu contrario, nonnihil turbatæ, & hinc inde plus minus ve sufflaminatae erant, iterum promptius succedunt: Quibus suppositis, ratio protinus adparet, cur, adsumto postea cathartico, impuri humores, in glandulis intestinalibus fecer nendi, largius ad intestina confluant, & ob liberiorem quoque vegetioremque motum peristalticum promptior inde impu ritatum exclusio per alvum contingat.

§. XI.


Non desunt quidem, quod prorsus silentio præter mittere nequeo, qui, venæflectione ante catharsin admis trata, largiore faburræ in primis viis coacervatae trans lationem ad sanguinem pertimescant. Verum enim vero, metum hunc plane frustraneum esse firmiter credo: Nullam quippe rationem video, cur, extracto sanguine superflu, & motuum vigore restituto, impuritates copiosius ex inte stin is ad humores circulantes transfire debeant. Creden dum potius erit, illas ipsas, mediante motu peristaltico nunc iterum vegetiori atque validiori, melius attenuari, &

B

prom

promptius per amplum canalem ordinarium promoveri, tandemque copiosius pariter per alvum expelli. Hicce accedit, quod, emendato digestionis negotio, cuius vigor atque integritas a vegeto in primis ac valido motu ventriculi peristaltico dependet, tam larga, quam antea, cum ventriculi motus memoratus adhuc debilior esset, impuritatum genesis atque collectio post esculentorum resolutionem nequaquam metuenda sit.

T A N T V M.



00 A-6271

E17

VD18

3


ULB Halle
003 571 882





Farbkarte #13

B.I.G.



32.
TATIO PERIODICA
DE
COMIA APVD PLE-
COS CATHARSI
EMITTENDA

QVAM
PRAESIDE
RIDERICO CARTHEVSE,

DOCT. ET PROF. PVBL. ORD.

Novembr. MDCCXXXVII.

H. L. Q. C.

DEFENDET

AVCTOR

F RIDERICVS MÖSTNER,
BEVTHENA - SILESIVS.

COFVRTI ad VIADRVM,
CHRISTIANI WINTERI, Acad. Reg. Typ.