



00 662

294<sup>2</sup>  
qm.



MEDICATIO DUORUM ÆGORUM,  
QUORUM UNUS  
**GONORRHÆA SIMPLICI,**

A L T E R A

**I L E O**

LABORAT.

*Q V A M,*

DEO OPT. MAX. AUXILIANTE;  
SUB PRÆSIDIO

*VIRI CLARISSIMI*

**D. HENRICI REGII,**

Reip. Ultraject. POLIATRI, & Medicinæ  
Professoris Ordinarii, ac Philosophi  
eximii,

*Publicæ disquisitioni exhibet*

**ADRIANUS DE BACK**, Rotterod.-Batav.

*Ad diem 16. octobris, horâ 9. matutinâ.*



TRAJECTI AD RHENUM,  
TYPIS Gisberti à Zyll, & Theodori ab Ackersdyck,

CLO IO C L.



*Eruditissimo, Spectatissimo Viro,*

D. J A C O B O D E B A C K , apud Rotterodamenses Medicinæ Doctori ordinario & in praxi primario, Patri venerando.

U T E T

*Pietate conspicuis Viris*

D. S A M U E L I D E B A C K , ibidem Cerevisiarum Coetori, Patruo honorando.

D. A R N O L D O H O F F L A N D T , Orphanotrophii quæstori fidelissimo.

D. T H E O D O R O L A E K E N S , Mercatori vigilantissimo: avunculis diligendis.

*Gravissimo, multaque experientia celeberrimo Viro,*

D. H E N R I C O R E G I O , Medico expertissimo, Philosopho acutissimo, Reipubl: Ultrajectinæ Poliatro, Medicinæ Professori Ordinario, Praesidi venerando.

*Eruditione eximio Viro*

D. HENRICO SWAERDECROON , Gymnasi Rotterodamensis Gymnasiarchæ , Litteratori peritissimo, de studiis multum merito.

*Has Disputationes*

Inscribit

A D R I A N U S D E B A C K

# MEDICATIO VIRI GONORRHÆA SIMPLICI LABORANTIS.

## I.

**V**ix triginta quinque annorum, temperamento pituitoso, diu alimentis humectantibus usus, jam à longo tempore ex urethra inscius & sine sensu frequenter emitte liquorem aquosum, crudum, viscidum. Toto corpore gracilescit: oculi sunt concavi. Vires ejus indies magis magisque imminuuntur. Cum impura fœmina non confuevit.

## II.

*Afficitur* in hoc ægro totum corpus; quod ex gracilitate & ejus debilitate innotescit. Sed præcipue afficiuntur prostatæ & alia partes, quæ seminis generationi inserviunt; quod testatur involuntarium illud ac imperceptum liquoris istius aquosí crudi & viscidí effluvium.

## III.

*Morbus*, qui hunc ægrum affigit, est intemperies frigida ac humida & laxa prostatarum & paraсттарум, quæ excretionem liquoris aquosí crudi & viscidí, ac sine sensu ex urethra effluentis, & magnam totius corporis extenuationem inducens, *Gonorrhæa simplex* appellari solet.

## IV.

*Causa procatarctica* hujus morbi est diutinus alimentorum humectantium usus. Inde vero adjuvante temperamento ægri pituitoso, aquei in corpore geniti humores *antecedentem* huic morbo præbuerunt causam. Pars vero ad paraстtas & prostatas delata, iisque partibus intemperiem frigidam ac laxam impariens, *continens*, hujus morbi, & aquosí & crudi & viscidí humoris, per urethram sine sensu effluentis, symptomatumque, hinc sequentium, est cauſa.

D 2

V. Dum

V.

Dum enim sanguis à corde in illas partes, intemperie ista laborantes, impellitur, propter ipsarum intemperiem frigidam & humidam relinquitur crudus, ac convertitur in materiam aqueam & viscidam, quæ, cum nulos aut paucos habeat spiritus, è partibus ipsis ob laxitatem earum nimiam, sine ullo voluptatis sensu emittitur.

VI.

Et quoniam ille fluxus est perpetuus, quo succus alimentarius subducitur toti corpori; hinc totius corporis est extenuatio, oculorum excavatio, viriumque quotidie sese augens debilitatio.

VII.

Affectus hic quia diu duravit, & est in partibus genitalibus interioribus & à ventriculo remotis, ad quas vis medicamentorum difficulter deferri potest; satis difficilis ejus erit *curatio*.

VIII.

Quæ in causæ procatarcticæ, antecedentis & continentis ablatione, & intemperiei correctione consistet.

IX.

Primo itaque ad causæ antecedentis, nempe pituitosorum humorum evacuationem præscribatur hoc purgans:

Rx. el. diacathol. 3 β. turbith pul. 3 β.  
rabar. 3 β. cinamom. gr. iiiij.  
dissolve in aq. card. benedict. 3 ij. β.  
aq. fænicul. 3 β. Misce F. haustus  
aliquoties repetendus.

Interim utatur hoc decocto ad intemperiei alterationem:

Rx. fol. menth. absinthij rom. an. m. j.  
sem. agni casti. rutæ, myrthi,  
cupular. gland. sem. rosar. rubr. an. 3jβ.  
F. decoctio in vino rubro gallico ad lib. j. cum saccar. q. s.

Et fiat

Et fiat apozema, de quo sumat haustum  
3ij. omni mane & vespera.

Et inungatur regio lumborum & perinæi, inter scrotum & anum,  
hoc unguento:

Rx. ol. mastichini 3j. rutacei, mentacei an. 3ij.  
sem. agni casti, urticæ, rutæ an. 3j.  
menthæ, cariophyll. an. 3β.  
cæræ q. s.  
pulverisatis pulverisandis F. unguentum.

Postea utatur dragma una sequentis pulveris, cum haustu vini ru-  
bri, vel cum lacte, cubitum iturus :

Rx. gland. quercus in furno exsiccatarum 3vj.  
sacc. ros. tabellati 3j. mastiches, thuris an. 3j.  
sem. coriand. 3j β. succini 3β.  
viticis, fol. menth. an. 3j.  
oculor. cancri 3j.  
fiat pulvis subtilissimus.

Si hæc & similia parum juvent, poterit per cauterium potentia-  
le fonticulus excitari in utraque tibia, paulo infra poplitem, in par-  
tibus internis, ad humores pituitosos, cum materia feminis ad ge-  
nitales partes fluentes, ealque nimis laxantes, aliò deducendum.

## X.

In diæta alimenta sint exsiccantia & calefacentia, & frequens  
orizæ usus.

MEDI-

M E D I C A T I O F O E M I N Æ,  
ILEO, EX BUBONOCELE,  
L A B O R A N T I S.

I.

**M**Ulier quadraginta annorum, jam à multis annis ex partu in dextro inguine herniosa, incidit in diarrhœam; qua, dum alvum frequenter deponere cogitur, intestina, quæ ligamentis externis artificialibus in loco suo retinere solebat, in inguen cum tumore sunt prolapsa; cumque ea, ob duritiem renitentem, in locum reduci non possent, incidit in intolerabilem ventris dolorem, circa umbilicum ipsam potissimum torquentem, ac cum vomitu enormi & continuo variorum excrementorum, imo ipsarum etiam fæcum alvi, conjunctum. Jam à biduo hoc torquetur malo, multaque remedia per os & anum sunt adhibita, sed ea hactenus fuerunt irrita. Adeò febricula.

II.

Afficitur in hac ægra *inguen dextrum*, quod ex ejus tumore; & *intestina*, quod ex dolore ventris, circa umbilicum ipsam potissimum torqueante, & tumorem in inguine faciente, nec non ex enormi illo vomitu, est manifestum.

III.

*Morbus*, qui ipsam affigit, est tumor inguinis dextri, ex intestinorum in illud prolapsu ortus; qui intolerabilem ventris dolorem, vomitumque excrementorum, imo etiam ipsarum fæcum, enormem & continuum faciens, *ileus ex bubonocele* appellari solet.

IV.

*Causa procatarctica* hujus morbi est diarrhœa illa, qua ægra alvum frequenter evacuare corpusque inclinare coacta, intestina cum copiosis fæcibus frequenti illo motu in inguen deturbavit; quæ ibi hærentia, atque contorta ac pressa, partesque vicinas distensionia, ac dolorem in iis excitantia, descensumque excrementorum impedientia, *continens* hujus morbi & symptomatum sunt causa.

V. Ab

## V.

Ab illapsis enim intestinis factus est inguinis tumor & tensio & intestini clausio; inde dolor ; à dolore pori in cerebro ita fuerunt aperti & spiritus ita in eo determinati, ut illi in inguen multos impellerent humores , tumoremque & dolorem ita ibi augerent , ut tumor induraretur & dolor intolerabilis evaderet : in fibras vero intestinorum oblique ascendentis spiritus continuo ita influerent, ut ea , versus superiora magno impetu abiis contracta, quicquid in iis continetur magna vi per vomitum continuo ejicerent.

## VI.

*Morbus hic periculosisimus est.* Metus enim est ne intestini illapsi fiat inflammatio , ex qua oriatur gangrena : Et præterea ne ex vomitu & dolore vires ita prosternantur, ut ægra in lethalem incidat lipothymiam.

## VII.

Celerrima itaque, quantum fieri potest , curatione morbus est impugnandus : quæ tota in intestini reductione , & doloris sedatione consistet.

## VIII.

Itaque tali decocto emolliente & fatus discutiente inguen dolens continuo foveatur:

Rx. fol. Malv. flor: camomil, anethi,  
Sem: lin: an. Mj. sem. cumini 3ij.

Coquantur in lacte bubulo pro fotu,  
quo spongia imbuantur, eaque calide adhibeantur,  
& leni pressione manuum reductio intestini  
tentetur.

Dum autem hoc agitur, ægra ita in lecto erit collocanda , ut caput valde sit declive, crura vero elata.

## IX.

Si vero hac ratione intestinum non potest reduci, cutis & peritonæum in inguine, ad intestini illapsi restitutionem, chirurgiā erunt aperienda: & intestina reducta, ope subligaruli, in abdomen retinenda.

# C O R O L L A R I A.

I.

**F**ebris est incalescentia sanguinis in corde; interdum naturali major; interdum minor: sed semper malignior.

II.

**E**rrant illi, qui existimant in Epilepsia cerebrum à materia acri & maligna irritatum, acrimoniam & malignitatem illam sentire, atque ideo se contrahere, & ad eam expellendam insurgere: illud porro contractum omnes nervos, tanquam lora sibi alligata, variis motibus contrahere & agitare; & hinc omnes illos violentos inordinatosque motus variarum partium observatos in epilepticis originem ducere.

III.

*In vertigine imaginatio non luditur.*

IV.

**A**qua collectæ in ventriculis cerebri hydrocephali nihil obstant, quo minus spiritus in ventriculis, ad functiones animales perpetuo peragendas, gignantur.

V.

**P**alpitatio cordis vehemens non solum oritur à vehementiore sanguinis in corde effervescentia; verum etiam ab influxu spiritum vehementi, & inordinato.

VI.

**P**us in cavitate thoracis existens per urethram evacuari potest.

VII.

**A**pituita potest oriri febris.

VIII.

**I**n pulmonum & thoracis vicio frigida adstringentia non sunt adhibenda.

IX.

**I**n abdomen hydropicorum per evaporationem potissimum colliguntur aquæ.

X.

**P**leuritis non semper oritur ab inflammata pleura.

F I N I S.

00 A 6396

ULB Halle  
002 928 167

3



Stra



MEDICATIO DUORUM ÆGRORUM,  
QUORUM UNUS  
**GONORRHÆA SIMPLICI,**

A L T E R A  
**I L E O**

LABORAT.

*Q V A M,*

DEO OPT. MAX. AUXILIANTE;  
SUB PRÆSIDIO

*VIRI CLARISSIMI*

**D. H E N R I C I R E G I I,**

Reip. Ultraject. POLIATRI, & Medicinæ  
Professoris Ordinarii, ac Philosophi  
eximii,

*Publicæ disquisitioni exhibit*

**ADRIANUS DE BACK**, Rotterod.-Batav.

*Ad diem 16. Octobris, horâ 9. matutinâ.*



T R A I E C T I A D R H E N U M,  
T Y P I S *Gisberti à Zijl, & Theodori ab Ackersdijck,*

c I o I o C L.

