

Kem
462

Kem 462

DE
V A R I O
L E G E F F E S T U M
V S V
D I S S E R T A T I O

QVAM
SVMMI NVMINIS AVSPICIIS
ACADEMIAE FRIDERICO-ALEXANDRINAЕ
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO
SERENISSIMO PRINCIPЕ AC DOMINO
DOMINO

CHRISTIANO FRIDERICO
CAROLO ALEXANDRO

MARGGRAVIO BRANDENBURGICO BORVSSIAE
SILESIAEQUE DVCE REL. BVRGGRAVIO NORIMBERGENSI
VTRIVSQVE PRINCIPATVS REL. REL.

EX DECRETO
GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS
AC IMMVNITATIBVS RITE OBTINENDIS.
D. SEPT. MDCCCLXXXVI.
PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI OFFERT
GEORGIVS FRANCISCVS HOFFMANN
FRANCONVS.

S E C T . II.

ERLANGAE
STANNO ELLRODTIANO.

Kem
462

— Natura nihil frustra creaverit, posteros tamen tot inventuros utilitates ex Muscis auguror, quot ex reliquis vegetabilibus.

Qui bono? Amoen. Acad. III. p. 241.

SERENISSIMO PRINCIPI AC DOMINO
DOMINO
CHRISTIANO FRIDERICO
CAROLO ALEXANDRO

MARGGRAVIO BRANDENBURGICO BORVSSIAE
SILESIAE MAGDEBURGI CLIVIAE IVLIAI MONTIVM STETINI POMERA-
NIAE CASSVBORVM ET VANDALORVM MEGAPOLEOS ET CROSSAE DVCI
BVRGGRAVIO NORIMBERGENSI VTRIVSQVE PRINCIPATVS PRINCIPI HAL-
BERSTADII MINDAE CAMINI VANDALIAE SVERINI RACEBURGI ET MVR-
SIAE COMITI GLAZAE HOHENZOLLERAE MARCAE RAVENSBERGAE ET
SVERINI DYNASTAE RAVENSTEINII ROSTOCHII ET STARGARDIAE
COMITI SAYNAE ET WITTGENSTEINAE DOMINO

LIMBURGI RELIQUA RELIQUA
CIRCULI FRANCONICI CAPITANEO ET SVMMO CASTRORVM PRAEFECTO
AVGVSTISSIMI ROMANORVM IMPERATORIS GENERALI EXCVBIARVM
MILITARIVM PRAEFECTO POTENTISSIMI BORVSSORVM REGIS SVPREMO BELLI
LEGATO TRIVMQVE LEGIONVM EQUESTRIVM TRIBUNO.

CHRISTIANO TRIBALICO
CYRILLO-ALEXANDRO
MAGISTER AIAO SVANDESKYGO FORVATI
GEGENWARTIGE KUNSTSCHAU DER STADT DRESDEN
VON DR. J. G. FRIEDRICH VON KLEIST
DIE IN DEN HALLEN DER STADTSCHULE DRESDEN
VOM 15. SEPTEMBER BIS 20. OCTOBER 1816
GEZEIGT WERDEN. EINZELNES STÜCK
VON 10. SEPTEMBER BIS 10. NOVEMBER 1816

SERENISSIME MARGGRAVIE!
PRINCEPS AC DOMINE CLEMENTISSIME!

*F*unc libellum devoti animi mei testem ut Serenissimo No-
mini TUO inscriberem, eaedem me benignitatis TUAE
atque in bonas litteras earumque cultores amoris rationes induxe-
runt, quae bonos omnes in tanti Principis praedicatione ac ve-
neratione jam dudum tenent. Quorum ego pietati ac votis pro-
TUA, qua nostra omnium continetur, salute nuncupandis, eo lu-
bentius justiusque accedo, quo jam beneficiis *ovo* meo, boneſo
bujus urbis civi, et patruo amitaeque marito, in eadem hac
vrbe professoribus, collatis totus sum TUUS. Accipe igitur,
SERENISSIME PRINCEPS, AC DOMINE
CLEMENTISSIME, leve hoc meae pietatis monumentum

* 2

ea,

SERENISSIME MAGISTRALI
THEATRIS AC DOMINIS CLEMENS

ea, qua praedicaris, indulgentia, ac, si preces addere licet suppli-
ces, meas quoque res meque benignitatis TUAE afflatu in poste-
rum subleva

SERENISSIMO NOMINI TVO

Scr. Erlang. id. Oct. 1515 CCLXXXVI.

addictum et devotum

Georg. Franciscum Hoffmann.






P R A E F A T I O.

Si verum est, Lichenes, plantas singularis quidem structurae, ubivis terrarum parasitice fere provenientes, et forma non parum inter se discrepantes, (aliqui enim fungis, aliqui vero plantis marinis, Zoophytis, Corallinis vicini esse videntur,) specierum numero, reliquis algarum generibus non cedere, sed ea potius, quotidie novis emergentibus speciebus, superare: tum certe verissimum puto, considerato eorum multiplici ac vario usu, eos non inter algas solum, sed etiam inter reliquos muscos et cryptogamica vegetabilia, longe eminere et praestantiores esse. Pauci enim sunt ratione muscorum, de quibus aliquem usum praedicare nequeas, permulti vero de quibus hoc possis. Jam nihil dicam, quod fertilitatem telluris et vegetationem promoveant, quod cum aliis muscis habent commune; sed quod multi usui oeconomico, ad chartam conficiendam, ad dealbandos crines, ad pabulum pecoris ut

A 2

L.




L. fraxineus, prunastri, islandicus, rangiferinus, &c. in quo unico omnis fundata est Lapponum oeconomia, non pauciores medico, ut L. Island. caninus, pyxidatus &c., plurimi vero tinctorio inservire possunt; inter quos sufficit L. Roccellam unice nominasse, ex quo color ille purpureus in Anglia et Gallia, nomine Orseille tinctoribus notus, praeparatur. Quamobrem non plane inutilem et indignum me suscepturum laborem putabam, si in peculiari Dissertatione ea, quae sparsim in scriptis Botanicorum de iis occurrunt, colligerem, etiam ipse novis experimentis magis illustrarem, et cum iis praesertim, quibus animus esset alias vel certas species amplius inquirere, communicarem. Plures itaque, de quibus plane antea nihil constabat, examini praesertim tinctorio subjecti, in quo opere maxime mihi laudandus venit Cl. FRISCHMANNUS, exercitatisissimus pharmocopola, quem adjutorem habui, colores non paucos, teneros, floridos, austeros et quoque saturos duxerunt. Siquidem permultae colorum varietates et commissurae (nuanceen) obortae sunt, ut fere impossibile esset omnes exprimere transitus colorum. Attamen plerique non inelegantes et immutables, et jam ea de causa commendabiles, quia magnas non requirunt impensas. Methodus tingendi nobis haec fuit. Lichenes humida praesertim tempestate collecti, et ab alienis particulis follicite purgati, fiscinati, et in pulverem redacti, per aliquod tempus urina et calce viva macerati, intumescebant, et majus volumen plerumque acquirebant, soluti tandem in uniformem massam pulsiti spissitudine, praesertim ii ex foliaceorum et imbricatorum ordine. Sicque in loco tepido sepositi, et frequenter, ubi necesse erat, urina adfusa irrigati, aliqui longiori aliqui breviori tempore, quatuordecim circiter dierum, colorem ducebant, prout nempe mucilaginosae eorum partes,

tes, quibus plerique abundant, involventes saepe tenacissime tingentes, maceratione dissolverentur. Non raro contigit, ut ii, de quibus plane nihil sperabam, intra horae fere spatum colorem elegantem ostenderent, producta maceratione saepe saturatius tintum. Pulmento nunc satiis tincto et sufficiente aquae copia diluto, indita sunt segmenta panni lanei albi, (neque enim serica fila neque xyлина firmiter colorem tenebant,) prius alumine et cremore tartari imbuta, quae nunc ex sola tintura vel additione aliqua salium, tamdiu saturata usque dum color certus oriretur, coloribus variis, qui praesertim pictoribus intermedii audiunt, coctione circiter quadrantis horae tincta sunt. Haec in aqua frigida postremum elota, etiam saponacea, ut periculum de firmitate colorum faceret, et siccata praeloque more pannificum commissa, colorem optime suum servabant. De omnibus vero hoc monendum, eos, si cum calce viva et urina simul macerentur, praesertim calcarei et tartarei, melius ad tingendum adhiberi posse; et quo vetustiores sunt Lichenes, eo melius et facilius colorem ducere, recentiores vero, longiori tempore macerari debere; denique non paucos superest Lichenes, quorum vel sufficiens copia mihi desuit, vel quorum macerationem nimis precipitanter turbavi, qui aeque elegantem, nisi pulchriorem, promittant colorem ac L. Roccella. Quod jam HELLOT *) testatur, se ex diversis Lichenibus indigenis colorem purpureum Roccellae similem obtinuisse, simulque sequentem modum, at non satis certum, indicat, quo experientum putat an Lichen purpureo tingendo aptus sit, nec ne Lichenis parvam copiam vitro inditam, humectat aquae calcis et spiritu salis ammoniaci ana, et pugillum salis ammoniaci

A 3

ammoniaci

*) Färbe Kunst p. 360.




moniaci addit, vitrumque vesica humectat, clausum, aliquot tempus reponit, inter quod si rubrum massâ ducit color, Lichenem usui infervire posse autumat. Multorum faliuum affusione saepe plane nullos ex aliis elicere potui colores, quae utpote irrita experimenta silentio transire volui, ea solummodo commemorans, quibus facile hic, vel ille color obtinetur.

Ceterum ut quisque de specie, quam experimendo tintorio constitui, certus esset, enumerationem meam Lichenum, quoad prodidit citavi, nomina ordinis quibus usus sum praefixi, Linnaeanum novem, ubi existaret, adduxi, vel synonymon, vel figuram selectam. Habitationis denique locum ubique indicavi.



Plan-



Plantarum nonnullae, quae Lichenes dicuntur, vel a sanandis Lichenibus, (impetigines etiam vocant medici,) vel ob similitudinem cum his pustulis in cute provenientibus, veteribus jam cognitae quidem fuere, sed musicis eas indeterminate adsociabant, nomen vero Lichen etiam aliis longe perfectioribus plantis imponebant, quae ad genus Linnaeanum Marchantiae pertinent, a DILLENIO praecepue sub illo nomine comprehensum. TOURNEFORTIUS autem et MICHELII primi fere, nomen Lichen vagum characteribus certis circumscriptum plantulis nostris reddebant, et peculiare ex iis constringebant genus. Et posterior quidem, plantarum cryptogamicarum diligentissimus et oculatissimus observator, Lichenum flores ac semina *) non solum accurate descripsit, sed etiam multarum specierum depinxit et generis characteres ex iis constituit. Corpuscula illa, quae scutellarum vel peltarum nomine veniunt, florum receptacula, pulverem vero superficie vel margini Lichenum inharentem, vel etiam in aliis sub cuticula reconditum granulosum opus, vera semina interpretatur, etiam pulverem illum germinasse afferit. Alter sentiebat DILLENIUS, qui potius existimavit, pulverem illum substantiae et figurae similitudinem respondere antherarum farinæ, tubercula vero esse vascula seminalia, vel etiam ipsa semina aut propagationes a matre abscedentes, ut in Allio et Bistorta **). Postea LINNAEUS hoc genus sub familia Algarum recepit, eique characteres genericos adposuit.

*) Nova Plant. Gen. p. 73.

**) Hist. Musc. p. 75.

suit. Mares dixit receptacula illa varia, subrotunda, planiuscula et nitida continere, farinam vero foliis in eadem vel diversa planta adspersam feminas constituere. B. HALLERUS, et plerique Botanicorum, ab hac MICHELII ET LINNAEI opinione non discedebant. Nuper vero Cel. HEDWIG in proprio libro de generatione et fructificatione plantarum cryptogamicarum conscripto *) suam etiam de hoc genere protulit sententiam, partesque fructificationis explicavit, in quibus describendis, verbis hujus Viri, feli-cissimi Indagatoris plantarum cryptogamiae, et gravissimi circa has plantulas judicii, uti, quam mutilam delineationem sistere, malo. „Lichen, inquit **), nimis vastum genus. DILLENIUS, MICHELIIUS, LINNAEUS perverse scutella marem, grumosam farinaceam compagem foeminam dixerunt. MICHELIIUS proxime a vero abfuit. Bene enim vidit semina scutellorum, quae flores communiter cognominavit. Quodsi vero etiam e farina quorundam nonnullas plantulas crescere observavit, facilis error est, cum seminibus majoribus microscopii augmentis tantum affequenda, sese hirsutie aut inaequalitati tunc deformi farinosae massae immiscere queant. Plerique Lichenes praeter scutella concava, aut fungillos convexos, vel farinosam massam, in superficie non minus saepe quadam circumferentia scutellae-formi cinctam, vel puncta quaedam aliquid diversum ab ipsa fronde notantia produnt. Si cuncta rite attendamus, animadvertemus, ista tempore esse priora, simplicioris mechanismi breviorisque durationis, ac quidem scutella. At-tamen non minus de ipsius rarioris substantiae fabrica, tota filamen-

*) Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum &c. Diss. quae praemio ab Acad. Petrop. ornata est. Petrop. 1784. 4. c. Tab. aen. 37.
**) p. 120. l. c.

filamentoso - vasculosa velut originem, sic et succum habent. Videamus Lich. ciliarem Linn. Ad me nunc non pertinent radicantia ejus de extremitate, ut audiunt, cilia, nec tomentum plantae totius superficiem obducens, a quo arido cinereus color, abscondens viorem naturalem. Prae omnibus mihi sermo hic est et esse debet, de scutellis verrucisque illis, quae vel in scutelligeris, vel in distinctis speciminiibus, a DILLENIO egregie expressis, apparent. Ambo a protuberante quodammodo nodulo in superficie prona plantulae ordiuntur. Quod vero eorum, verruca tantum est mansum, brevi in vertice macula fusca, dein nigricante, notatur. Hanc, priusquam fuscescere incipit, si verticaliter utrinque secaverimus, intra communia plantulae vascula, omnium tenerima, apparet distinctus sub vertice loculus, modo simplex, modo quasi duplicatus, granulosa massa refertus. Quam primum vero summitas hujus protuberantiae nigricans punctum accipit, (quod omnino emissarium intus contentorum est) evanuit granulosa massa, ejusque loco quid gelatinosi inest, quod tamen dein etiam corruptitur et disparet, cum nigredine et inductione totius tuberculi. Haec intra breve temporis spatium absolvuntur. Quae autem particula eminula in scutellam est abitura, continuato incremento foveola viridi sese statim distinguit, subter quam si de vertice sectionem perpendiculararem traducimus, quasi de centro foveolae strias a reliquis intra substantiam locatis plane distinctis, in semicirculum dirigi videmus; quarum illae ad confinia circularis lineae paulo opaciora apparent. Sed hic non desistit crescere, quin indies sensim ampliatur, foveola dehisceit suo de centro in foramen ad incrementi normam continuo patentius. Intro appareat primo rutilans fundus, qui successu profundiorem colorem induit. Emergit denique in comple-

B

tam

tam sic dictam scutellam, sessilem vel brevi de collo eminentem, margine evidenti, modo integro, modo crenato, cuius concavitas, si madet, nigra est; aut cinerea, fere alba, si arescit. Sic dispositam scutellam, si ab utraque facie perpendiculariter secando, tenerimam particulam auferimus, inque aquae guttula lustramus, mox sub nigra crusta, inter strias levissimas, lineae imagine a reliqua substantia inferne distinctas, quasi intra loculos evidenter conspiciuntur granula nigra, in columnulam quasi conglomerata. Haec inde exenta, et lente maxime augente considerata, corpusecula sunt ovata, profundiore transversali per medium linea distincta quasi didyma. Iudicet nunc quisque gnarus, quae-nam descriptarum partium mascula, quae-nam feminea sit. Crediderim sane, neminem nisi praejudiciis occoecatum forre, qui cunctis rite perpen-sis, verrucis nigro punctulo notatis, masculum, illis vero in scutellam adolescentibus, femineum munus adjudicet, ut inde granula hic delitescentia vera harum plantularum sint semina. Cum jam omnium scutellatorum in Lichenoidibus Usneisque DILLENII idem vegetandi, florendique sit modus, eadem disci maturi dispositio; in aprico positum esse arbitror: omnium etiam specierum vel intra substantiam contentas ut Licheni ciliari, vel extra eandem editas farinaceas granosas partes, nuspia-m deficiente-s masculas esse. Neque ab ludunt certe vel sua conformatio-ne ab horum organorum natura. Si enim tem-pestive lustrantur, e meris vesiculis conglomeratis constare inveniemus. Variant tamen maxime loco, ita, ut in aliis in apicibus divisionum tumidis prodeant, ut Lich. physodis, aliis ad margines locentur, ut Lich. farinaceo, fraxineo, vel e superficie prona emergant, e gr. Lich. pulmonar. aphthoso cet. ubi nonnunquam orbiculos scutelliformes praesen-tant.

tant ut Lich. stellaris cet. Sic et inter scutellorum formam et discorum villum seminaque discrimina varia intercedunt. E. g. a communi forma ab ludunt illa coriaceorum, et quae inter simillimas ciliari strias, stellari intersunt feminula itidem testiculata, at paulo rotundiora, Lich. furfurac. florid. seminae sphaerica sunt, sed tenerima brevissimaque stupa indita. His positis intelligentes mox perspicient, unde rectius extra modum numerosum Linneanum genus in plura dividii possit non solum, sed animadventent etiam illico, alias species Linneo et aliis cryptogamicarum enumeratoribus adhuc diversas e. g. Lichen. farinaceum et calicarem, hirtum et floridum conjungendas esse. Multa certe habent Lich. familia, quae sollertia exercere, perbelle possunt, si secundum fructificationis partes rite coordinare species ac exacte definire voluerint. „Sic cel. HEDWIG. Si liceat, pace tantorum virorum, meam de fructificatione Lichenum proferre sententiam, potius cum MICHELIO consentire vellem, qui farinam illam pro semine habuit. Id quod non solum magis cum natura hujus farinae, admodum copiosae in multis Lichenibus, et substantiae ratione habitacum polline aliorum vegetabilium, nimis compactae, et ut ita dicam rudioris et uniformis, convenire, sed etiam modo ac viae, quibus Lichenes multiplicari solent, non male respondere videtur. Ex polline enim vel farina strata ubique fere plurimi Lichenes originem ducunt, cuius saepissime tanta existit copia, et in quibusdam ita raro inventu sunt scuta, ut illo polline naturam fere omnino abuti diceret, quod in aliis vegetabilibus aequa non accedit, nisi ex eo propagari possent Lichenes. Nascendi tamem viam jam ita eleganter exposuit per ill. SCHMIDELIUS, perspicacia et subtilitate eadem fere, ut de polline, male sic olim seminibus vocatis, Muscorum et Algarum

B 2

nunc

nunc valet illius magni viri sententia, ut non melioribus
verbis quam per ill. SCHMIDELII uti possim.,, Deprehe-
dimus interim, sic audiunt verba, aliquos ex Muscis ibi
jamdum vegetare, ubi Fungi nondum crescere possunt. Fungi
plerumque ex humo, ut producto vegetabili, aut ex ligno
mollescente putridoque, vel alio aliquo vegetabili pullu-
lant; quin et intermedium quasi illud genus Lichenum
crustaceorum, praesertim id, cuius tubera carnea sunt, nul-
libi ex nostra observatione laetius, ac in terra limosa,
Muscis putridis, aliisque Lichenibus destructis germinat.
Non pauci vero Lichenes in sterillissimo solo nudissimisque
petris crescunt. Ut unicum saltem excitemus exemplum,
pluries observavimus in lapidibus, ex mera arena compactis,
superficie, ubi imbris saepius humectata fuit, sensim in
farinam friabilemque pulverem corrosam fuisse. Ex hoc
polline paullatim glomeres, scrobiculi, et tubercula ex nigro
cinerea elevantur, acervatim demum posita, sed ex mera
adhuc farina conglatinata. Sensim aliqui globuli ejusdem
farinae viridescere incipiunt, et postmodum in puncta flava,
nudis oculis conspicua, coadunantur, ex quibus successu
temporis ampliatis foliola quasi progerminant; atque tunc
demum in farina et arena subjacente mollissima radiculae
albae, Mucoris aut Byssi cuiusvis instar tenuissimae spar-
guntur. Haec denique cuncta, cum undique ex uno
centro ita fiant, integrum cespitem formant Lichenis le-
prosi, quem DILLENIUS *Lichenoides crustosum orbiculis et*
scutellis flavis, Hist. Musc. p. 136. n. 18. Tab. 18. fig. 18.
vocavit *). „In hoc etiam convenient observationes ill.
SCHREBERI Fautoris pie colendi ex ejus ore exceptae,
qui eadem directione, qua pluvia farinam Lichenum quo-
rundam

*) *Diss. de Buxbaumia Ed. revis. p. 32.*

rundam abluere potuit, novas ejusdem speciei progerminasse viderit. In scutis vero aequae contineri semina, (quod praefertim iis accidit, qui saepissime pulvere carent,) sive larga manu minimorum vegetabilium proventum naturam providisse, pollen autem verum in ipsa eorum substantia latere, vel ante perfectam explicationem fructificationem eorum jam peragi, ut multa nunc alia cryptogamica exemplo sunt, non plane a veritate diversum videtur. Attamen cum hae partes, flores nempe et semina, extra visum, ut cum DILLENIUS loquar, plerunque locentur, vel saltem sint ejusmodi, ut nullae inde vel tamen difficiliores, ex quibus ob nimiam partium distinguendarum parvitatem multum levaminis in determinandis generibus vel speciebus expectaveris, notae characteristicae desumi queant, sufficit nobis crassior consideratio figurae, habitualis nempe, qua ab aliis generibus et inter se facile Lichenes distinguuntur. Neque minus vero tantorum virorum nomina, quorum acuta et subtili indagatione in intima naturae penetrante, de veritate systematis sexualis etiam in his antea obscuris plantulis convicti et certi sumus, semper cum summa admiratione ac veneratione dicenda erunt.

Lichenes itaque pro varia sua natura, quae vel pulverulenta, vel foliosa, vel coriacea, vel tremellosa &c. et pro varia forma, nunc imbricata, nunc fruticulosa nunc filamentosa, in ordines redigamus. Facilius enim adspectu et externa sua forma cognosci possunt, quam definitione generica, quod ne philosophis quidem, ut jam R A J U S observavit, facile fuerit. Ordines diversos ab externa eorum facie desumptos, vel genera minora, ad sublevandam eorum cognitionem Botanici varii extruxerunt, quorum aliquos praestantiores saltem enumerabo. MICHELius sollicitus

plantarum minorum observator, XXXVIII. Lichenum ordines exstruxit, et seminum, ut farinam Lichenum vocat, situm, ad eorum definitionem adhibuit. DILLENIUS in genera summa: *Usnea*, *Coralloides* et *Lichenoides*, haecce iterum in *ordines*, *series*, *divisiones* et *subdivisiones* sejunxit. HALLERUS X. Lichenum agmina constituit, quorum *collocatio* sequens est: 1) *Corniculati*. 2) *Coralloidei*. 3) *Usneae*. 4) *Lacunati cyprii*. 5) *Antilyff.* 6) *Pulmonarii*. 7) *Pforae*. 8) *Noftoch.* 9) *Herpetes*. 10) *Leprae*. Idemque autor per eleganter affinitatem eorum sequenti exposuit modo. *Corniculati* cavi, polline pleni, indiviso nexo coralloideis cohaerent, cornubus bifidis et subdivisis, inde cum pyxidatis Lichenibus, quando mucro cornuum intumescit, deprimitur inque cavum infundibulum mutatur. Idem pyxidarii de summo margine ramos educunt ramosos, ut cum coralloideis coëant. Isti cum usneis figura ramosa consentiunt, et eaedem usneae scutellatis Lichenibus proximae sunt. Isti et pulmonarii reperiuntur, foliis planis ramosis et duris; et demum crustae potius glebosae, quam foliis scutellae insident. Porro cel. SCOPOLI *) Lichenes in *Confervas arboreas*, *Terras vegetabilis*, *Corallia florate* et *Fucos terrestris* distinxit. LINNAEUS autem sequenti ordine genos Lichenum distribuit: 1) *Leprofi tuberculati*. 2) *Leprofi scutellati*. 3) *Imbricati*. 4) *Foliacei*. 5) *Coriaceti*. 6) *Umbilicati*. 7) *Scyphiferi*. 8) *Fruticulosi*. 9) *Filamentosi*. Hisce cel. HAGEN **), praeountibus HALLERO et SCHREBERO ***), decimum ordinem pulverulentorum, qui Bysfos pulverulentas LINNAEII comprehendit, addidit. Novissime cel. WIGGERS ****) ordinem non solum novum nomine Aspidofera-
rum

*) Fl. Carn. Ed. 2. Tom. II. *** Spicil. Lips.

p. 356.

****) Primit. Fl. Holsat. Kiliae

**) Hist. Litb. Pruss.

1780, 8.

rum ex Lichenibus construxit, sed eos quoque in nova quasi genera dispersit, quae sic audiunt: 1) *Verrucaria*.
 2) *Tubercularia*. 3) *Placodium*. 4) *Lichen*. 5) *Collema*.
 6) *Cladonia*. 7) *Usnea*. Ultimo demum et ego in Enumeratione mea Lichenum annis sum, ad eorum cognitio-
 nem sublevandam ordines, qui pro generibus haberi possunt,
 quoad externam eorum faciem et affinitatem, construere,
 et denominations partim ab aliis jam receptas, partim
 proprias iis imposui. Quod eo magis necessarium mihi
 visum est, quum numerus Lichenum, quorum in novissima
 systematis Vegetabilium editione tantum 139 proponuntur,
 ultra 300 increverit, et multis novis speciebus ampliatus sit.

Sed haec de collocatione Lichenum sufficient, consideratus potius eorum indolem ac naturam. Simplicitate structurae, utpote quae ex simili substantia saepe omni cellulosa destituta componi videtur, aliis plantis quidem cedere et minus praestantiores esse vulgo putantur, quare a LINNAEO rustici pauperrimi et arborum pedissequi nominantur, sed nitida saepius figura sua, ut Coralloidei, Usneae, imbricati, qui encarpa non male referunt &c. et colorum elegantia ac varietate, aequa fere observatori diligenti Naturae, ut aliae plantae commendant. Plerique radiculis vel villis in inferiore sua parte, vel una radice scutiformi, ut in umbilicatis et filamentosis, vel in utraque superficie hiantibus porulis, quibus nutrimentum fugunt, ut tremelloidei, instruuntur; plantam vero omnem nunc re praesentant folium varie expansum et laciniatum, vel rami multifariam divisi et erecti, vel filamenta intorta et pendula, vel crusta tantum, et uniformis farina; fructificationis partes autem, quantum oculis nudis licet obser-
 vare, effigunt varia illa corpuscula, fungosa, verrucosa

et

et tuberculosa, quae si excavata sint, acetabula vel scutella, sin vero plana, peltæ vel scuta Botanicis audiunt. Sed haec frequenter defunt, et in quibusdam solummodo squamæ e. g. in scyphiferis, in aliis vero pulverulenta quædam materia adesse solent.

Habitant Lichenes vel in terra, vel in arborum cortice et ligno putrefcente, vel in rupibus et saxis. Et ad distinguendas arbores vel lapides quodammodo inservire possunt, e. g. *L. geographicus* nascitur saepissime in faxo albo cotaceo - quartzoso, *L. calcarius* in calcareis lapidibus, *L. faxatilis*, plerumque in saxis, *L. fagineus* praecipue in Fago, *L. carpineus* in Carpini cortice, *Lichen Betulinus* in Betula, *L. Ulmi* (SWARTZ *) in Ulmo, *L. Tiliaeus* in Tilia, *L. fraxineus* in Fraxino, *L. prunastri* in Pruno, *L. pinastri* in Pinu, *L. Juniperinus*, in Junipero, *L. ciliatus* in Juglande, *L. ciliaris* et *pulmonarius* in Quercu &c. Sed hoc non ita intelligendum, quasi nunquam aliis locis etiam provenirent praedicti Lichenes; saepissime enim arborei in lapidibus, et rupestres in terra vel cortice arborum crescunt, facilius vero certo inhabitationis loco inveniri possunt, et etiam aliqui nunquam laete alieno vegetant solo. Vigent potissimum, ut reliqua cryptogamicarum cohors, vere et autumno, hicme etiam et aestate, tempestate humida. Humore irrigati etiam vetustissimi reviviscunt. Proveniunt fere in omni terrarum plaga, septentrionem versus plurimi; tenuissima terra contenti, vel etiam ex aere nutriti primum vegetationis momentum struunt **). Etenim nuper nudos Lichenes pulverulenti et crustacei primo investiunt, aere tanquam et pluvia contenti; hi senio


*) Nov. Act. Ups. Tom. 4. ai. 1784. LINN. in Diff. oecon. Naturæ,

**) Eleganter exposuit modum Amoen. acad. T. II. p. 25.

senio consumti in terram tenuissimam mutantur, quae Lichenum imbricatorum proventui inservit; demum etiam his putrefactis jam haec terrae copia sufficit, ut musci varii, Brya, Hypna, Polytricha, radices facile agere possint; ex quorum tandem destructione, ea humi copia prodit, qua non solum herbae, sed etiam frutices et arbusculae nutriti ac sustentari queant. Haec de iis, qui rupes inhabitant. Anne etiam arborei vegetationem promovent vel potius prohibent? Sunt aliqui, qui in hanc sententiam adducti, sequentibus rationibus eam tueri putabant. Primo dicebant Lichenes succum arboribus, ut omnes plantae parasitae, detrahere, et quia poros arborum, qui aeri permeanti patere semper debeant, occluderent, et rorem et pluviam nimia copia attraherent, arborum incrementum impedire non solum, sed etiam cohibere. Addebat quartum argumentum, infectis illos omnino etiam in ruinam arborum domicilia praebere. Sed facile ad haec respondemus. Primum argumentum quod attinet, Lichenes omnino potius ex aere, quam de arborum succo, videntur nutriti. Idem Lichenes in arborum cortice et super faxa et lapides vegetant et laete vivunt, substituti arborum succo. Illi vero, qui corticibus adnascuntur, eo tempore ubi omnes fere arbores succi copia turgent, aestate nempe, contabescunt et fere evanescunt; autumno et hieme vero, succo arborum immuno, potissimum et laete augmenta sumunt et luxuriantur. Nec minus in vetustissimis etiam arborum truncis exsuccis paene et putridis. Arbores vivas autem nunquam tanta copia obducunt, ut liberum aeris accessum impedire queant, nedum poros omnes obturarent. Et si sunt plerumque ex foliaceorum et imbricatorum ordine, qui admodum laxe cortici adhaerent, et undique vel exhalare vel

C

inha-



inhalare arbores finuant. Denique rorem quidem et humorem aliquem ex aere attrahunt, neque vero majori copia, quam qua natura et proventus eorum exigunt. Etiam contrarium si ponamus, tamen nimiam ejus copiam ex adversa sua parte exhalarē facile possent. Ultima vero obiectio nullius plane videtur momenti, namque in arborum cortice et in quacunque alia parte facilis nidulantur insecta, quam in Lichenibus, quod *Dermestes typographus* et *piniperda* satis demonstrant, totas sylvas saepius devastantes. E contrario Lichenes defendunt arbores a tempestatum et frigoris injurya *), qua de re semper videmus arbores septentrionali latere densius iis obductas, et in frigidioribus regionibus hisce quasi pelle contra frigus a provida Natura defensas; humectant eas, vel saltem impediunt, quo minus exarescere in sicca tempestate et a solis ardore exsiccati possint; in nimia autem humorum abundantia ex LINNEI sententia fonticulos quasi praefstant. Ut taceam quod oculos multiplici suo colore et structura non parum oblectent, et diligentia naturae scrutatori etiam hieme, silente flora, occasionem praebant, plantas colligendi, et in parvis et abjectis plantulis summi Conditoris sapientiam et magnitudinem admirandi. Certum est, hoc contemptum et paene neglectum vegetabilium genus multiplici usui inservire. Alii enim praebent alimentum et hominibus et animalibus, alii inserviant usui oeconomico et tinctorio, et nonnulli inter medicamenta ipsa recepti sunt. Quibusdam inest specifica vis morbis medendi, ut L. Islandico, pulmonario, cani-

*) *Schriften der Leipz. oecon. Societät* T. 6, a. 1784. ubi plane evincit, muscos neque arborum incrementum neque eorum vegetationem impedire posse, radiculas enim te-

neres non in vascula usque circumvelandas, quam denuo penetrare. Et arbores potius

canino, aphthoso, pyxidato &c. Haec melius in singularum specierum enumeratione patebunt. Praemittenda antea sunt quaedam de partibus eorum constitutivis. Siquidem chemia analysi aliqui Lichenes subjecti, ejusque ope explorati, quales fuere *L. physodes*, *L. hirtus*, *L. farinaceus* et *L. pulmonarius*, sequentia principia vegetabilium reliquorum omnino analoga, quaeque fusius Cel. GEORGI in altera parte Actorum Academiae Petropolitanae anni 1779. descripsit, prodiderunt.

Lichenes igitur supra nominati, in aqua cocti, juscum praebuere flavescentes, mucilaginosum, paene insipidum, et ipsi Lichenes addito sale edules fiebant. Urgente itaque annonae difficultate, pauperibus pro cibo inservire possunt. Extractum eorum aquosum, paene illi, quod e radicibus Althaeae et Malvae obtinetur simile, gummosum nempe et mucilaginosum. Idem extractum e recenter collectis Lichenibus paratum et per anni spatium repositum, nullum sal praebuit essentiale. Extractum resinosum tenax, brunnescens, ratione quantitatis $\frac{1}{2}$ constituebat partem. Lichenes siccatae et e vitrea retorta destillati primo phlegma limpidum, insipidum dedere, alterum quod secatum est, empyrevmaticum fuit, odore acidulo, nec alcalinorum nec acidorum affusione mutandum; tertio prodiit flavum cum innatante oleo empyrevmatico, et alio nigrescente, fundum quod petebat; utrumque vero et phlegma et oleum odorem praeftitere volatilem et urinosum, gustumque pungentem. Caput mortuum ex hac destillatione relictum, et elotum, calci praebuit vegetable cum acidis prompte effervescentes. Lichenes autem in aperto igne calcinati, post elixivationem majorem calci fixi vegetabilis copiam dedere, sed nemiculam quidem salis muriatici. Ex elotis cineribus cal-

carea terra per acidum nitri obtenta est. Solutioni salis tartari illa solutio instillata, limpida mansit, tum demum calx sub forma gelatinæ præceps facta est, post edulcorationem similis magnesiae. Terra post extractam calcem remanens et edulcorata, nigricans, levis et insipida fuit, in igne fusorio cum sale tartari liquata in vitrum flavescent, quod in aere nigrescebat et humescet, commutata fuit. Lichenes demum putrefacti, humum dederunt nigrum, similem pinguissimae humo hortensi, in ore mucosam, salivam flavo tingentem colore, gustu subacido; destillationi subiecta haec terra easdem quidem partes ut Lichenes, sed diversa quantitate exhibuit; et longe majorem olei empyrevmatici quantitatem, ut facile de origine petrolei sit judicium, si a terrificatione Lichenum, ad formationem Turfae et carbonum fossilem liceat concludere. Illa enim vegetabilia, ut appareat, tantam oleosi principii ex se evolutione suppeditare posse, quantum in ipsis fossilibus plerumque inveniamus.

Hisce demum omnibus breviter comprehensis, e libra sedecim unciarum Lichenum supra nominatorum et in aere fccatorum prodire debent:

- 1) Substantiae mucilaginosae, sub specie gummi siccatae, adusque uncias viij.
- 2) Resinae vegetabilis fere uncia 1. drachmae 3.
- 3) Phlegmatis insipidi ad sesquiunciam.
- 4) Phlegmatis empyrevmatici cum evidenti acido vegetabili ad uncias tres cum dimidia.
- 5) Destillatione sicca, olei empyrevmatici separabilis, circiter drachmae vi.
- 6) Ci-

- 6) Cineres combustorum Lichenum ex eadem quantitate largiuntur:
- 7) Salis alcalini fixi vegetabilis drachmam i. cum scrupulis 2.
- 8) Ceterum ad tuas tertias terra calcarea,
- 9) tertia parte terrae siliceae constant.

Humus putrefactio[n]e Lichenum unitus Librae paranda, pondus quinque unciarum cum tribus Drachmis aequat.

Ex eaque sicca destillatione:

- 1) Olei empyrevmatici separabilis prodit ad minimum Uncia.
- 2) Eadem combusta in carbone continet Alcali fixi circa grana xxv.
- 3) Tandemque post calcinationem et elixivationem terrae calcareae atque siliceae sesquiunciam fere praebet.

Ex hisce patet: praeter in certis (quibusdam de coriaceorum ordine exemptis) alcali volatilis vestigium, principia reliquis vegetabilibus analoga largiri per chemicam analysin Lichenes. Inest iis praesertim mucilaginosum nutriens principium, ut L. Islandico, et adstringens cum americante et balsamico in quibusdam mixtum. Neque omnes volatili destituuntur, e. g. L. sylvaticus, urinosum ac foetentem odorem spargens. In aliis vero odor amoenus, praesertim is, qui nos aestate sylvulam umbrosam intrantes tam suaviter afficit, a Lichenibus terrestribus praesertim proveniens.

Sed haec sufficient quasi generaliter et summatim tantum de Lichenum natura prolata. Ordiamur nunc singularum specierum enumerationem ac usum.

1. Lepra citrina.

Lichen crustaceus, faxatilis, tenuiori substantia, neque rimosus, neque verrucosus, pulverulentus, citrini coloris. MICH. Gen. pl. p. 100. n. 64. Enum. Lich. p. 3.

Habitat in Europae rupibus praesertim calcareis.

Uſus. In uripa maceratus per aliquot septimanas hic Lichen colorem eleganter rubrum prodit. Ex urina de novo coctus, color obtinetur armeniacocinnamomeus, addita solutione stanni flavo-cinamomeus, addito vitriolo martis carneo-murinus.

2. Lepra farinosa. *Enum. Lich. n. 10. T. I. Fig. 1.*

Lichen crustaceus, arboribus adnascens, neque rimosus, neque verrucosus, candidus, pulvifculo concole ore adspersus. MICH. Gen. p. 99. n. 62. T. 53. f. 4.

Habitat in cortice arborum.

Uſus. Hic Lichen in urina maceratus et calce viva cum alumine coctus, pannum tingebat colore cinereo-lividio.

3. Verrucaria calcaria. *Enum. Lich. n. 38.*

Lichen calcarius; leprosus candidus tuberculis atris.

LINN. *Syst. veget. Ed. 14.*

Lichenoides tartarum tinctorium candidum, tuberculis atris. DILL. *Hist. musc. p. 128. Tab. 18. f. 8.*

Habitat in Europae rupibus praesertim calcareis.

Uſus. Dignoscuntur lapides calcarei hoc Lichene. Pro colore rubro tingendo inservit. DILLENIUS l. c. refert, incolas insulae Skie decrescente Luna, mense Augusto, quo maxime maturum existimant, hunc

Liche-

Lichenem colligere, et ficcatum et pulverisatum per tres septimanas urina in vase clauso maceratum coquere cum filis tingendis.

4. Verrucaria faginea. *Enum. Lich. n. 21. Tab. 2. fig. 4.*
Lichen fagineus; leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. LINN. Syst. veget. Ed. 14.

Habitat in Europae arboribus et axis.

Ufus. Cum alumine tingit colore ferrugineo-fusco.

5. Tubercularia ericetorum. *Enum. Lich. n. 45. Tab. 8. fig. 3.*
Lichen Baeomyces; leprosus, albicans, tuberculis stipitatis carneis. LINN. Suppl. n. 450.

Habitat in Europae sterilibus.

Ufus. Addito vitr. martis et alumine tingebat colore cinereo-cervino.

6. Scutellaria Parella. *Enum. Lich. n. 69. Tab. 6. fig. 2.*
Lichen Parellus; crustaceus albus, peltis concavis obtusis pallidis. Syst. veget. Ed. 14.

Habitat in muris et rupibus Europae.

Ufus. Laccam coeruleam, vulgo Lacmus (Parella d'Auvergne - TOURNEF. It. I. p. 233.) ex lichene Parella parari jam observavit VALENTINI *). Cel. FERBER, qui fabricam prope Amstelodamum, in qua haec lacea praeparatur, perlustravit, hoc confirmat **). Vedit enim hunc Lichenem in arcis ligneis, sub tectum aedifici positis, urina, aqua calcis, calce extincta et cineribus clavellatis tam diu macerari, donec Lichen coeruleum acquirebat colorem et consisten-

*) Natur- und Materialien-Kammer. I. p. 226.

**) Neue Beyträge zur Mineralgeschichte &c., I. p. 378.

sistentiam pultiformem. Molae singularis structurae tum committitur, per pannum setaceum exprimitur et in formis parallelepipedis siccatur.

7. *Scutellaria androgyna*. *Enum. Lich. n. 70. Tab. 7. fig. 3.*

Habitat in ligno seu scandulis putridis.

Uſus. Hic Lichen in multis cum priori et *L. tartarea* convenit. In aqua maceratus eam rubro tingit colore. In urina maceratus cum aqua calcis vivae et addida urina tingebat pannum colore pallide carneo in flavum paululum tendente.

8. *Scutellaria tartarea*. *Enum. Lich. n. 51.*

Lichen tartareus; crustaceus ex albido - virescens, scutellis flavescentibus: margine albo. LINN. *Syst. veget. Ed. 14.*

Lichenoides tartareum farinaceum, scutellarum umbo-ne fusco. DILL. *Hift. Musc. p. 131. Tab. 18. fig. 12. 13.*

Habitat in Europae rupibus.

Uſus. Westrogothi ex hoc Lichene rubrum fabricant colorem, quem sub nomine *Boettelet*, per totam ob ejus pulchritudinem Sueciam divendant. Humida tempestate seu post pluviam a scopulis derasum, commolitum, et aqua, in qua prius macerant, elotum, et alienis particulis purgatum, exsiccant, urinamque ei affundunt; sicque per quinque vel sex hebdomadas quieti tradunt. Hujus pulmenti cochlear unum alterumve aqua diluunt, coquunt, et tingenda immittunt *). Cum alumine pannum tingebat colore pallide violaceo-purpureo. Cum Terra Aluminis in acido Salis soluta pallide roseo - carneo.

9) Scu-

*) LINN. *It. W-Goth. p. 170.*

9. *Scutellaria scruposa*. *Enum. Lich. n. 50.* *Tab. 6. fig. 1.*
Lichen scruposus; crustaceus cinereus granulosus, scutellis immersis atris; margine crenulato. SCHREB.
Spicil. p. 133. n. 1133.

Habitat in saxis et rupibus Europae.

Uſus. Ob similitudinem, quam hic *Lichen* cum *Parelo* et *tartareo* habet, experimentum institui, an etiam ad tingendum adhiberi possit? sed cum alumine panum solummodo colore ex *cinereo* canescente infiebat. Forsan, si per aliquot menses maceratur urina, colorem meliorem ostendit.

10. *Scutellaria argentata*.

Lichen argentatus. HOUT. *Nat. H. T. 2. St. 14. p. 510.*
Tab. 18. f. 13. (Fig. DILL. Tab. 18. Fig. 13.) *Enum. Lich. p. 52.* (*var. D. L. subf.*)

Uſus. Cambri, qui eum *Caddlod* et *Kengwin* vocant, ex hoc cum urina macerato colorem rubrum eliciunt, quo lanam et alia tingunt. DILL. l. c. *)

11. *Psora candelaria*. *Enum. Lich. n. 72.* *Tab. 9. fig. 3.*

Lichen candelarius; crustaceus flavus, scutellis luteis. LINN. *syst. veget.* Ed. 14. p. 958.

Habitat in Europae lignis et arboribus.

Uſus. Rusticos Smolandiae hunc *Lichenem* a parietibus abrasum et linteo involutum, aqua, quae luteo ab illo inficitur colore, excoquere et decoctum tandem cum sebo miscere, quocum candelas pro diebus festivis praeparant, quae ob luteum colorem aemu-

*) WATSON. *Phil. Trans. for the year 1757.* T. 2. 675.

æmulentur cereas, narrat LINNAEUS *). In hoc Lichene intra cucullum habitat Phalaena Lichenellæ femina **). Cum sale ammoniaco colore praebuit pallide cinereo - carneum, cum alumine et vitriolo martis ex viridi in cinereum vergentem.

12. Psora flavescens. *Enum. Lich. n. 78.*

Lichen flavescens; crustaceus flavo-virescens, scutellis rufo-luteis. HUDES. *Fl. Angl. Ed. 2. p. 528.*

Habitat in cortice arborum et muris.

Usus. Cum vitriolo martis tingit colore spadiceo-fusco.

13. Psora murorum. *Enum. n. 80. Tab. 9. fig. 2.*

Lichen murorum; crustaceus imbricatus, foliis pulposis angustis luteis, scutellis concoloribus. *Ibid.*

Habitat in Europæ muris et testis schisteis.

Usus. Per se tingit colore cinereo-coriaceo, cum vitriolo martis ex ochreo-carneo, cum alumine et vitriolo martis pallide cinereo-carneo, cum vitriolo martis et cum aqua dilutus ex cinnamomeo spadiceo, cum hepate sulphuris et aceto chalybeato ex violaceo in cinereum vergente colore.

14. Lichen centrifugus. *Enum. Lich. n. 95. Tab. 10. fig. 3.*

Lichen centrifugus; imbricatus, foliolis obsolete multifidis laevisbus flavescentibus centrifugis, scutellis rufo-fuscis. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 958.*

Habitat in Europæ lapidibus et asseribus putridis.

Usus. Hic Lichen cum solutione stanni colore exhibuit spadiceo-flavescentem.

15. Li-

*) *H. Oeland.* p. 36.

**) LINN. *syst. nat. I. p. 899. n. 452. HAGEN Hift. Lich. p. 59.*

15. Lichen saxatilis. *Enum. Lich. Tab. 15. fig. I.*

Lichen saxatilis; foliis sinuatis scabris, lacunosis, scutellis folio concoloribus. LINN. *syst. veg. Ed. 14. p. 958.*

Habitat in saxis et plerisque lapidibus, excepto calcareo.

Uſus. Haec est praesertim species, quae crania obducit humana, tempestate diu exposita, ideoque Usnea humana vocari solet, olim magni habita in epilepsia et sanguinis fluxu. Sed plures sub hoc nomine in medicina recepti sunt musci, ex varia potius superstitione, quam propter efficaciam suam. Inter compositiones nonnulli recepti quondam sunt, v. g. ad pulverem antepilept. Cellar. cum cast. ad Holsat. et mirab. Mysicht. &c. Rustici in Oelandia et Gothlandia fila colore fusco, seu purpurascente, insciunt, cum haec una cum Lichene stratum super stratum disponant, et cum aqua et lixivio coquant*). Vestes rusticorum Norvegiae rufae praesertim hoc, saepe addito Lichene parietino vel cortice alni tintæ sunt. Immo et honoratores jam incepere vestes gerere ex lana indigena nobiliore textas, et hoc Lichene tintas **). Leithæ in Anglia officina reperitur, ubi in praeparatione coloris pulchri et perpetui rubri, ex hac alga eliciendi, occupati sunt ducenti homines, illam colligentes, quam in formam pulveris redactam aqua macerant ***). Colorem rubrum, etiamsi per quatuor septimanas in urina maceravi et recentem et exsiccatum hunc Lichenem, obtine-

D 2

*) LINN. *It. Oel. p. 35.*

*** FERBER, l. c. p. 455*

**) GUNN, *Fl. Norv. p. 210.*

obtinere non potui, sed cochlear hujus macerati Lichenis aqua dilutum, addito aceto chalybis, pannum per quadrantem horae incoctum colore inficiebat ex umbrino in olivaceum vergente, cum vitriolo martis colore ex umbrino ferrugineo, et cum alumine adhuc saturatori. Anne hic Lichen tintorius antea LINNAEO sic dictus?

16. *Lichen stygius.* *Enum. Lich. n. 92. Tab. 14. fig. 2.*

Lichen stygius; imbricatus foliolis palmatis recurvis atris. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 959*

Habitat in Europae rupibus.

Uſus. Dicitur purpureo saturato tingere *). Chartam quidem rubro inficit colore. *Lichen Fahlunensis,* quocum ob similitudinem periculum feci, cum vitriolo martis et alumine solummodo pannum cervino - canescente tingebat.

17. *Lichen omphalodes.*

Lichen omphalodes; imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 959.*

Lichenoides faxatile tintorium, foliis pilosis purpureis.

DILL. *Hift. Muſt. p. 185. Tab. 24. fig. 80?*

Habitat in Europae rupibus.

Uſus. Referente PARKINSONIO **), MERETO et RAJO ***), pauperes Derbyenses, Lancastrienses et Cambri tingendo utuntur. In pulverem comminutum muscum in massam humidam cogunt et in dolis

*) *Fl. Suec. 1079.*

***) *Hift. Pl. p. 116.*

**) PARK. *Th. Bot. p. 1315.*

liis recondunt, sic pannis obscure purpurascente (vel potius subfusco) colore tingendis infervit, qui, quamvis facile eluatur, nec diu duret, sufficit tamen pauperibus pro vestimentis insciendis *). LINNAEUS mulieres Oelandicas absque salibus pannos incoquere, et flavescente colore imbuere refert **). Saporem ex serit siccum, subamarum et in recessu nonnihil acrem. Praeter utilitatem, quam in tinctoria arte praestare debet, usneae humanae locum et vices in officinis explere solet, teste LINNAEO ***). Planta incerta ac dubia mihi.

18. *Lichen olivaceus*. *Enum. Lich. n. 99. Tab. 13. fig. 3. 4. 5.*

Lichen olivaceus; imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 959.*

Habitat in Europae rupibus et arboribus.

Ufus. Cum solutione stanni colorem elegantem ex rubello fuscum, cum alumine et vitriolo martis in cinereum, paululum tamen cum rubello fusco vergentem, ostendit.

19. *Lichen caperatus*. *Enum. Lich. n. 103. Tab. 19. fig. 2.*

Lichen caperatus; pallide viridis rugosus margine undulatus. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 960.*

Habitat ad arbores et faxa.

Ufus. Hic *Lichen* sola additione vitrioli martis eleganter praebet colorem ex umbrino ferrugineum.

20. *Lichen glaucus*. *Enum. Lich. n. 105. Tab. 20. fig. 1.*

Lichen glaucus; foliaceus depresso lobatus glaber, margine criso farinaceo. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 961.*

D 3

Habi-

*) DILL. *Hist. Musc. 1. c.*

) Fl. Lapp. 343. addito etiam roucou. * Fl. Suec. n. 1076.

Habitat in Europaē arboribus.

Uſus. Cum vitriolo martis et alumine ex cervino carneo, vel coriaceo tingit colore.

21. *Lichen Pinastrī.* *Enum. Lichen. Tab. 22. fig. 2.*

Habitat ad radices, truncos Pini.

Uſus. Elegans hic *Lichen* ubivis provenit. Colorem cum solutione stanni praebet ex sulphureo pallide vireſcentem cum alumine magis in cinereum vergentem, cum vitrioli martis ex flavescenti spadiceum.

22. *Lichen parietinus.* *Enum. Lich. n. 100. Tab. 18. fig. 1.*

Lichen parietinus; imbricatus, foliolis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *LINN. Syst. veget. Ed. 14.*
p. 504.

Habitat in Europaē arboribus, ſepimentis parietibus.

Uſus. Manipulum hujus *Lichenis*, vel et *Lichenis canadelarii*, cum uno lactis sextario per quadrantem horae sub operculo coquunt *Bedfladienses*, et cyathum murrhīnum, decocti probe decolati, mane et vespера contra iſterum hauriunt, quod quidem remedium summe laudatur, ut refert *GUNNERUS* *). In Diarrhoea adſtrin-
gere afferit *HALLERUS*. Omnes vero in virtute hu-
jus *Lichenis* luteo tingendi autores conſentiant, imo aliqui lintea eo amoenissimo tingi carneo et quidem durabili perhibent. Sed vario modo rem aggressus,
nullum luteum ex eo elicere potui colorem. Cum
aceto vini olivaceo-vireſcentem addito adhuc vitrio-
lo martis umbrino-carneum prodidit colorem.

23. *Lichen physodes.* *Enum. Lich. Tab. 15. fig. 2.*

Lichen physodes; imbricatus, laciniis obtusis subinflatī.

LINN. Syst. veget. Ed. 14.

Habi-

*) *Fl. Norv. 207.*

Habitat in corticibus arborum.

Uſus. Cum sale ammoniaco et alumine tingit colore ex griseo flavescente, cum iisdem falibus, sine praegressa maceratione, colore ex griseo-cervino.

24. *Lichen tenellus.*

Lichen foliaceus, laciniatus, albus; laciniis suberectis, obtusis, pilos; scutellis sessilibus. SCOP. *Fl. Carn.*
Ed. 2. n. 1406.

Habitat in faxis et arboribus.

Uſus. Cum alumine et gypſo umbrinum dat pallide cinereum colorem.

Lichen acetabulum. ENUM. *Lich. n. 102. Tab. 18. fig. 2.*

Lichen acetabulum; fronde suborbiculata luteo-virescente laevi, scutellis folio concoloribus subtus rugosis. NECK. *Meth. Musc. n. 62.*

Habitat in Europae arboribus.

Uſus. Hic Lichen ad tingendum apprime utilis. Iam per se aqua maceratus colore tingit aurantiaco. In urina vero per aliquot septimanas maceratus et cum calce viva et urina iterum coctus, tingit pulchro ex carneo fulvo colore.

25. *Lichen laciniatus.*

Lichen laciniatus; foliaceus repens sinuato-lobatus glaber, lobis sinuatis, scutellis fulvis. HUDS. *Fl. Angl.*
Ed. 2. 544.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus ele- ganter laciniatis. DILL. *Hift. Musc. p. 197. Tab. 26.*
fig. 99. MICH. *Gen. Tab. 46.*

Habitat in truncis arborum.

Uſus.



Uſus. Hoc Lichene vermes, qui Muscae Sueciae erant larvae (LINN. *Diss. de Taenia p. 10.* *) expulſos fuſſe autumat HALLERUS. Omnino meretur, ut novis experimentis ejus vires illuſtrentur.

26. *Lichen juniperinus.* *Enum. Lich. n. 108. Tab. 22. fig. 1.*
Lichen juniperinus; foliaceus laciniatus crispus fulvus,
peltis lividis. LINN. *syst. veget. Ed. 14. p. 960.*

Habitat in Europae arboribus, praeſertim Juniperis.

Uſus. Colorem eleganter flavum ſuppeditat, qui pulcrior evadit, ſi tingendum alumine ante imbutum in ſero laetiſ coquatur **). Ut ſpecificum in itero celebratur ***).

27. *Lichenoides Islandicum.*

Lichen Islandicus; foliaceus, adſcendens laciniatus,
marginibus elevatis ciliatis. LINN. *syst. veget. Ed. 14.*

Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. DILL.

Hift. Musc. p. 209. Tab. 28. fig. III. OED. Fl. Dan.
Tab. 155.

Habitat in Europae ericetis ac montosis.

Uſus. Certe hic Lichen omnibus palmam praeripit, et multifariam uſui eſſe potest. Odor nullus, ſapor amarus; manducatus nauseam statim, poſtea appetitum movent, et ſaliva ſolvitur in mucilaginem subdulcem. Infuſum aquoſum limpidiſculum, ſapore amaro, vitriolo martis rufefſens. Decoctum aquoſum, maxi- ma ſua parte evaporatum et loco frigido ſepoſitum, gelatinam ſpiſſam rubicundam amaricantem, in ore ſolubilem, praebuit. Deſtillationi ſubjecta, aqua aci- dulo odore, ſapore acriuſculo, cum pauxillo olei empyreumatici, odore volatili fere ut ſpiritus ligno- rum

*) *Amoen. Vol. II.* **) *GUN. Fl. Norv.* *** *Fl. Suec. Ed. 2. n. 1093.*

rum prodiit. Extractum aquosum ex flavo fusco insipidum, paululum acre; resinosum colore fuso, sapore nauseoso, amaricante adstringente leniter, odore rancido. Tinctura affusione spiritus vini et abstractione parata, colore fuit olivaceo. Ex combustione librae unius Lichenis obtinentur: salis alcali fixi Gr. 4. terrae calcareae Gr. 112. Arenae fere Gr. 15. terrae insolubilis siliceae Gr. 34. et exigua portio terrae martialis a magnete attracta. Lichenis pulverisati portio cum carne mixta, firmiter resistebat putredini. Haec analysis chemica amplius in perdocta et ex omni parte absoluta Dissertatione de Lichene Islandico legi potest *). Decoctum hujus Lichenis, cum, vel sine lacte paratum, propinatur non satis laudando effectu in tussi, in haemoptysi, in Phthisi, in obstructionibus internis, in debilitate viscerum. Decoctum praesertim aquosum cum lacte vel melle saporis gratia mixtum nuper commendavit Ill. WENDT **). Proxime ipse de ejus efficacia in vomitu cruento ex arrosione pulmonum, et in haemoptysi ex haemorrhoidibus retrogressis convictus sum; neque minus utilem inveni hunc Lichenem in Diarrhoea habituali, et in acrimonia humorum varios spasmos producente, ubi frustra alia medicamina exhibui. Decoctum delicioribus addito pauxillo chocoletae sapidius redditur. Vel etiam Pasta pergrati quidem saporis ex hoc Lichene, ut ex radice Althaeae,

con-

*) CRAMER. Diff. de Lichene
Islandico. Erlangae 1780.

**) Fünfte Nach. v. dem Kranken-
Institut. Erlangae 1785.

conficitur *). Aqua cum recenti vel juniori Lichenem costa alvum dicit, magis vero verno tempore. At etiam in quibusdam, qui eo non adsueti sunt, vel etiam laxa intestina habent, ut cortex peruvianus, sic etiam exsiccatus Lichen alvum laxiorem reddit. Ad catarrhos compescendos, ad calculum, ad hydrozem, ad obstrunctiones internas resolvendas idem medicamenta vi inclaruit. Amaritie sua roborat, mucilagine vero nutrit. Cl. OLAFSEN adfirmat, illum jam in communem per totam Islandiam et quotidianum victum abiisse, imo vim ejus nutritiam pro operariis ipsis sufficere **). Coquitur cum lacte ad pultis consistentiam, prius vero in aqua maceratur extra-hendae amaritudinis causa. HORREBOW testatur, se ad splendidas magnatum mensas vocatum, hunc Lichenem ut cibum salubrem non solum, sed etiam ut sapidum, saepius et lubenter comedisse, et Islandos eo lubentius, quam farina frumenti uti ***). Colligunt tempestate humida, alias nimis rigidum Lichenem, super ignem exsiccant, comminuant et in dolia immittunt, atque mercem pro parvo pretio vendibilem, vel in proprium usum asservant. Panem etiam ex hoc addita farina coqui posse, docent experientia HIAERNE †) et Cl. Autoris cit. Diss. de Lich. Isl. Ructici Carniolae sues, equos et boves emaciatos brevi hoc pinguefaciunt ‡‡). De tuis veterinariorum solitudo zoologiae confitetur ab aliis.

*) v. cit. Diss.

History of Iceland. p. 36. BERG.

Mat. med. p. 857.

**) OLAFSENS und FOVEL-
SENS Reise durch Island. I. p. 86.

†) Schwedische Abb. I. p. 168.

***) HORREBOW'S Natural- p. 107.

‡‡) SCOP. Ann. Hist. nat. II.

nario interno exemplum exstat in laudata Dissertatione *). Coagulationi lactis diu resistit. Islandi teste OLAVIO l. c. hoc Lichene lanas colore luteo inficiunt. Autore ill. CARTHEUSER etiam ad fuscum vel nigrum tingendum inservire potest **). Sumsi itaque basin Lichenis fere coccineam, assusa urina per quatuor septimanas maceravi, pulmento hoc diluto, addita solutione stanni, pannum incoxi, quam dilute umbrino - cervino colore inficiebat; cum urina et alumine maceratus L. colore ex cinnamomeo cervino, absque vero omni maceratione praegressa, addita solummodo solutione stanni, armeniaco - cervino tingebat. Plura de hoc Lichene collecta legi pos- sunt apud HAGEN ***), KRUNITZ †) et BER- GIUM ‡‡) &c.

*) p. 55.

***) Hist. Lib. p. 82.

**) CARTHEUSER'S Wahrneh-
mungen zum Nutzen verschiedener
Künste &c. 8. 1785.

†) Oec. Enc. T. 14. p. 77.

‡‡) Mat. med. 856.



THESES



THESES

- I. Medicamenta diuretica saepissime nocent in hydrope.
- II. Bilis non est sapo.
- III. Humores in corpore vivo, circulo subacti putrefcere nequeunt.
- IV. Succus gastricus putredini resistit.
- V. Scabies vera oritur ab insecto.
- VI. Seminum verminosum animalibus connatum.
- VII. Aer deglutitus vomitum ciet.
- VIII. Lichenes arboribus non infecti, sed potius utiles.



THESES

W 78

PICA

DE
V A R I O
L E T T E R F U L L
V S V
D I S S E R T A T I O

QVAM
SVMMI NVMINIS AVSPICIIS
ACADEMIAE FRIDERICO-ALEXANDRINAЕ
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO
SERENISSIMO PRINCIPЕ AC DOMINO

D O M I N O

CHRISTIANO FRIDERICO
EXANDRO

BVRGICO BORVSSIAE
GRAVIO NORIMBERGENSI
ATVS REL. REL.

R E T O
RVM ORDINIS
DOCTORIS

CINA HONORIBVS
ITE OBTINENDIS.

DCCLXXXVI.

EXAMINI OFFERT
CVS HOFFMANN
IVS.

I. XII.

GAE
ODTIANO.

