


A. II. 10 Q



DISSERTATIO IN AVGURALIS MEDICA
DE
CARDITIDE SPONTANEA

QVAM
CONSENSV ILLVSTRIS ORDINIS MEDICI
PRO IMPETRANDO LEGITIME DOCTO-
RIS IN MEDICINA GRADV

PRAE S I D E
D. ANDREA NVNN
S. P. CAESAR. COMITE, FACVLT. MEDICAE PROFESSORE ET ADSESSORE
ORDINARIO, VRBIS PHYSICO,

PUBLICAE ERVDITORVM DISQVISITIONI

S V E M I T T I T
AVTOR ET RESPONDENS
IOANNES FRIDERICVS KOEPPEL

SONDERSHVS ANVS

ERFORDIAE DIE XV. SEPTEMBER. MDCCCLXXXVIII.
IN AVDITORIO MEDICO HOR. CONSVET.

LITERIS HENRICI RUDOLPHI NONNII, ACAD. TYPOGRAPH,



22

АДИКА СЛУЖЕНИЯ СТАРЦЕВСКИХ

Б

СИНАЯ СЛОВА СЛУЖЕНИЯ

СЛУЖЕНИЯ ВЪ ПОСЛАНИИ КЪ





PRAEFATIO.

Multa sunt scriptoribus medicis notata cordis inflammati, exulcerati, tæbe confessi, exempla; quæ apud solerissimos Morgagni * & Senac ** collecta legas: ut adeo haud rarum sit, homines cordis virio phlogistico trucidari, morbusque sæpius occurrat, quam constat.

Nihilo fecius diagnosis morbi obscura est, nullisque certis signis ab inflammatione pleuræ, pericardii, pulmonis sinistri lateris dignoscere adhuc datum est.

Animi enim deliquia, palpitationes, pulsusque intermitentes, quæ signa fere omnes inde a Galeno proferunt, partim

* 2

alii

* de sedibus & causis morborum. Libr. II. Epist. XXV.

** Traité de la structure du cœur. Tom. II. p. 380. seqq.

alii morbis communia *, partim haud perpetua sunt. Néque locus doloris ad sternum ** certum morbi indicium praebet: cum s̄p̄ius dolor per consensum & nexus nervorum in alienum profrus, a sedē cause irritantis locum referatur.

Huc accedit, nervos ad cor pertinentes ratione decursus & combinationis varie, ut natura legis impariens solet, ludere. Id quod ex descriptionibus, quas clarissimi anatomici de nervis cardiacis exhibuerunt pater.

Hinc nosologi methodici morbum vel omisserunt, ut Linneus ***, Vogel ****, alii, vel quantum per experientiam licet designaverint: adeo ut vera adhuc sit Senaci † & Cullenii ‡ sententia; quod, si certa inflammationis cordis & pericardii signa data essent; eadem tamen methodo carditidi, qua inflammationi pectoris in genere, mederi, medelæ modo acrius insistere debeat medicus.

Ast in ardua re voluisse sat est. Nec ulteriores difficilis hujus morbi observations superfluas esse, sed ad persistendos morbi absconditi characteres semper aliquid facere ‡† puto. Hinc spero fore, ut Lector æquus observatiunculas, quas Dissertationis inauguralis loco proferam benigno suscipiat animo.

Vir

* vid. Petr. Foresti observationem medicinalium, Libr. XVII.

** Senac. I. c p. 391. Selle pyretal. p. 126.

*** Genera morborum. Amœnit. Acad. Vol. VI. p. 459.

**** in Prælectionibus de cognosc. & curand. c. huc affectibus.

† libe cit. Tom. II. p. 392.

‡† Umsangbarunde der praktischen Arzneywissenschaft. p. 242.

‡‡ Les lumières les plus profondes que nous pouvons acquérir ne nous ont pas découvert des remèdes contre ces maladies; mais les tentatives n'ont pas été entièrement infructueuses; beaucoup des maux auxquels le cœur est sujet trouvent des remèdes, qui donnent du soulagement, qui les pallient, qui en arrêtent les progrès. Senac. de la Struct du Cœur T. II. p. 392.



Ita sc.

Vir 56 annorum habitus macilenti, vita actuosa & diæta spirituosa deditus, ab aliquot annis asthmate subinde tentabatur, cum dolore dorsi alternante.

Anno 1787. die 8^{vo} Augusti denuo asthmate spastico & dolore dorsi corripitur, cum pulsu molli, æquali, 70ies intra minutum primum micante. Huic ex resina Gua- jaci cum solutione gummi arabici subacta, & emplastro ex cantharidibus pectori adplicato, dolor auferebatur, asthma mitigabatur. Sed 13^{to} ad vesperam asthma tanta cum anxietate, extremis & sudore frigidis rediit, ut metus suffocationis esset.

A

San-

Sanguis ex vena extrahitur, clystnata ex antispasmodicis, asa fetida, frictiones extremitatum, frustra tentantur; paroxysmus totam noctem durat. Die 16. tussicula rarior cum sputo pituitae tenacis accedebat; huic emulsione ex drachmis duabus gummi ammoniaci, cum tartari stibiatigranis duobus succurrere visum est. Inde tussis silebat, nec sputum pituitae resoluta, quod expectabatur, succedebat, asthma quidem mitescerat, sed quotidie ante medium noctem, uti solet, modo acrius modo mitius recurrebat, usque ad 28. Augusti

Quo die febris incidit, cum pulsu frequenti (110, qui hucusque nunquam 80 superabat) molli, æquali, asthmatis paroxysmus nocte intenditur, dolor acutus intermittens lumbos rarioribus vicibus pervagatur. Porrigitur pulvis ex radicis Valerianæ & seminis Phellandrios partibus æ qualibus mixtus. Ex quo vapor ex tute pelli cœpit, asthma autem nil levari, quod nocte die 30 cum sudore largo incrudebat.

Sed die insequente dolor fixus cum tumore pedem tenet, urina, quæ hucusque limpida aquosa erat, turbatur, sedimentum rubellum demittit; asthma nunc mitescere incipit, tandem evanescit. Ast paucis diebus elapsis dolor cum tumore pedem relinquunt, se ad pollicem manus figunt, inde evanescunt, & asthma reddit.

Pulvis



Pulvis seminis sinapeos cum fermento panis & aceto
subactus pedi adplicatur, exhibetur luccus Aconiti cum vi-
no antimonato Huxhami & spiritu Mindereri mixtus. Inde
vapor continuus cutis, dolor autem nullus excitatur, urina
limpida excrenitur, asthma per aliquot dies silet, pulsus
molliter undosi inter 80-90 fluctuant.

Die 4^{to} Septembris asthma vespertino tempore reddit,
& cum sudore continuo diebus alternis aegrum angit. Cum-
que nunc alvus haud rite succedere inciperet, & excretio al-
vi tenesmo turbaretur, clysmata injecta sunt & lenibus eva-
cuantibus intestina purgata; in quo id singulare, quamlibet
evacuationem, paroxysmum asthmaticum insequi, observa-
batur.

Purgatis primis viis, & typo intermittente persistente,
observatisque inter populum hinc inde febribus intermit-
tibus frequentioribus, die 12. Septembris, salis ammoniaci
uncia semis extracto amaro excepta, aegro brevi post paro-
xystrum asthmaticum temporis spatio deglutienda exhibe-
tur: usu hujus medicamenti per aliquot dies continuata, re-
spiratio tandem expedita est atque liberata, ut aegrotus ne-
gotis vacare posset usque ad

Anni 1788. diem 19. Februarii: cum ob negotia post
ecnam, perfecte sanus, exiret, in via pectoris repentina
dolore tensivo terebrante corriperetur, ut aegre domum, qua
tendebat, assequi posset, dolor ex regione pectoris, paulo

4

infra & retro papillam mammæ, ad brachium extenditur, cum anxietate vehementi ægrotum excruciat, pulsus molles est parvus & tardus ut vix 60^{rum} intra minutum primum perficeret, ventriculus simul vomitum conatur. Pectus tegitur linteis ex decocto chamomeli tepido expressis, adplicatur clyisma. Clyisma cum multo crepitu exploditur sine levamine doloris, nec ullum ex epithemate solatium.

Inde illa nocte vena secatur, sanguis extractus haud phlogisticus adparet. Exhibitentur antiphlogistica nitrosa cum oxymelle simplici; dolor idem perdurat, anxietas enormis continuat, rucus ex ventriculo vomitidente emergunt sine ullo levamine: inciditur locus dolens, exhaustur sanguis cucurbitulis. Dolor atrox interdum intermittit, pulsus molles, parvi, & intra minutum primum numerantur. Die vigefimo mane vena repetito secatur, continuantur epithemata emollientia adplicatur clyisma. Sanguis extractus nulla inflammationis signa exhibet, dolor remittit, æger libere respirat, pulsus mollis æqualis assurgit ad 80. Continuatur usus nitri soluti cum oxymelle simplici, adplicatur emplastrum cantharidum. Sequenti die (21) dolor pectoris sublatuſ, pulsus 90 molles æquales. Nunc dolor mitis regionem gastricam tenebat, appetitus nullus, inde ex die 22 usque ad diem 25. pulsus idem dolor nullus, debilitas, alvus obſtructa adplicatur clyisma, inde alvus soluta.

Die 25. pulsus 80 molles, æquales, dolor dorsi & regionis gastricæ; exhibetur infusum ex Tamarindorum uncis duabus
&

—

5

& salis mirabilis Glauberi uncia semis aquæ ferventis unciis sex
cujus colaturæ ut omni trihorio cochlæaria duo assumat. In-
de alvus soluta, dolor dorsi & gastricus mitescunt; sed ad
vesperam & in sequentem noctem asthma redit pristinum, ap-
petitus nunc redit, vires hand reficiuntur.

Die 27. Pulsus ~~108~~ molles æquales, dolor ad clavicu-
lam ortus juxta latus colli ad caput tendens, dolor capitis
lancinans; nucha applicatur epispasticum, potio salina tem-
perans exhibetur; inde dolor ante dictus filet.

Primo Martii die pulsus ad naturalem statum rediit
mollis parvus æqualis, vix ictus 7; intra minutum primum
perficiens; de dolore nulla nunc quæcda; sed asthmatis
paroxysmi vespertini nocturni ægrum angehant, quos pul-
vere Digitalis purpureæ granis duobus bis de die exhibitis
mitigare tentabatur.

Ex quo asthma quidem quodammodo cohhibitum, pul-
sus vero frequentia accelerata est, quaæ alias iude minui solet,
ut quarto Martii die & quinto pulsus ~~110~~ intra minutum pri-
mum perficerentur cum mollitie tamen & æqualitate; ne-
que urinæ excretio inde largior redita est.

Tussicula nunc oritur, vires depressæ sunt, nullus in
quadam corporis parte dolor, sudor vero profluit, & urina
matutina limpida, vespertina turbida colliquativa, sedimen-
tum mucosum album tubinde rubellum demittens, redditur.

A 3

Pul.

Pulveri Digitalis purpureæ substituitur octavo Martii decoctum Lichenis Islandici, & succi amari cum liquore tartari solubilis mixti.

Ex decimo Martii dolor varias per partes variis in sequentibus diebus oberrat, caput, humorum tentat, pharangem spastice tenet, ut deglutitio impedita quodammodo esset, cum sensu boli deglutiti supra cardiam spastice retentus, deinde ex cardia protinus in ventriculum irruens; dolor subinde dorsum, regionem gastricam, anum infestat, ut clystina ob dolorem nullum adficari, & excretio alvi non sine molestia absolviri posset; cum insequente notabilis debilitate; cui dolori adficatis hirudinibus medebatur.

Præterea asthmatis paroxysmi ad vesperam ad mediam plerumque noctem usque, & subinde acerbe angebant, ut corpus & extrema sudore frigido perfusa essent.

Pulsus in omni decursu morbi usque ad finem mensis Martii inter 90 & 100, semper æqualis.

Sub siem Martij, dolor pectoris asthmatis reliquisque symptomatibus accedit, cum tussicula & sputo rarissimo puriformi.

Initio Aprilis excretio alvina larga pultacea, assumta superans, cum insequente anxietate, asthmatisque exacerbatione &

& debilitate, numerum malorum auget, ut vita cum summa molestia, nullo, ex tanta farragine, medicamine mitiganda, protraheretur usque ad 25. Aprilis, quo, corpore summe extenuato, vires naturæ & artis morti succubuere.

S E C T I O .

Sectio cadaveris die 26^o hora post meridiem quarta instituebatur.

Habitus corporis totius emaciatus.

Abdominis cavum laticem luteolum librae unius circiter pondore continebat. Intestina tenuia multo aere turbida supra colon transversum sublata deprehendebantur, & omentum tabidum, retro intestina tenuia revoluta in glo- merem coarctatum erat, (qui situs ex inclinatione corporis, tum ex lecto portaretur cadaver, forsitan subortus).

Intestinum colon a cæco, usque ad dimidiam partem tractus transversi, scyphala minuta continebat, inde usque ad finem recti inane, adeoque coarctatum erat, ut vix digitum admitteret. Venæ mesaraicae & epiploicæ sanguine erant turgidulae.

Reliqua

Reliqua infimi ventris viscera nil a sana integritate re-
cedebant.

Thoracis cavum, præsertim sinistrum, sero lutescente
perfusum inveniebatur, illi, quod in infimo ventre hæ-
bat, simillimum, etiam pondere æquale.

Pulmo dexter pleuræ connatus, sinister undique li-
ber, nisi ad basin, ubi pericardio incumbit, ibi cum eodem
arcte coaluerat, ut cultro difficile separari posset; uterque
pulmo sanus, nullumque vestigium vitii, quod culpam asth-
matis ferret, inveniri poterat.

Pericardium cultro a pulmone separatum & disse-
ctum, cum cordis ventriculi posterioris superficie superiore
convexa & margine obtuso adeo concretum & confusum
erat, ut fines pericardii & cordis discerni, cultrove extricari
nullo modo poterant, ibique multum deprehendebatur in-
crassatum. Pars vero, quæ ventriculum anteriorem invol-
vit, ope massæ tremulæ gelatinosæ, & fibrarum massæ tremu-
læ intertextarum, cum corde cohæbat.

Ventriculus cordis posterior amplius quam solet di-
latatus atque superne & margine obtuso multum incrassatus,
fibra muscularis in pulpam inorganicam, lamellatim
sponte secedentem, resoluta erat, adeo ut totius fere ventri-
culi posterioris pars superior & margo obtusus sphæculo
destructus deprehenderetur.

Puer

Puer novem annorum, ex morbillis convalescens, post
refrigerium pectoris dolore repento, ex medio fere costæ
septimæ sinistri lateris ad brachitum tendente, affigitur, cum
dyspnœa, tussi acri molesta, pulsu frequenti (130), molli,
parvo.

Vena secatur, loco deinde dolenti emplastrum epi-
spasticum imponitur, sine ullo levamine; variis deinde in-
cassum tentatis antiphlogisticis, lenibus diapnoicis; dolor
persistit modo mitior, modo acrior non solum in pectore &
brachio, sed totum corpus rheumatici instar pervagatur;
manus saepe spastico contrahuntur, excretio alvi tenesime
turbatur.

Deinde febris phthisica, excretionibus sudoris urinæ
alvi auctis, colliquata eliminantibus, intra viginti & octo
dierum spatium corpus paulatim consumit, dolore, tussi
continuo afflignantibus usque ad mortem, quæ in termino in-
dicato miserum a cruciatu absolvebat,

In omni decursu morbi, pulsus mollis & parvus inter
110 & 130 numerum fluctuans observabatur, sibi semper
constans, regularis, nulla unquam deprehendebatur inter-
missione, nulla animi deliquia interveniebant.

B

SECTIO.

S E C T I O.

Cadaver 24 horas post mortem secabatur

Abdominis in cavo, præter glandulas mesentericas tumidulas, subduræ, & in hepatis lobi sinistri superficie superiori, prope marginem anteriorem acutum, tuberculum pisi magnitudine, nihil a naturali constitutione alienum deprehendebatur.

Thoracis in cavo pulmones illæsi conspiciebantur, sinner pleuræ per fibram laxam adhærebat.

Pericardium basi totum inflammatum atque ultra digitum latum erat incrassatum, cumque cordis apice concretum. Liquor pericardii lutescens cochlearia duo implebat, pus saniesve nulla.

Cer undique a basi ad apicem fibris laxis exasperatum, fibrarum interiorum compages & constitutio integræ inveniebatur.

THESES.



THESES.

I. **D**olor est affectio nervorum.

II. Ex dolore vis nervorum turbatur ad suppressionem usque.

III. Hæc debilitas nervorum ex arthritide pro ratione frequentia ad paralysin accedit: ut Weickardi theoria apoplexiæ & paralyseos raris exceptionibus limitari videatur.

IV. Ex debilitate nervorum fibra mobilis frequentissime spasmodice crispatur, ut hypochondriaca, & hysterica passio docet.

V. Idem spasmus organorum respirationis ex debilitate nervi phrenici in casu ante dicto ortus est, quod ex integritate pulmonum, & plenaria absentia impedimentorum respiratoris in infimo ventre, demonstratur.

VI. Ex eadem nervi phrenici debilitate inflammationem pericardii & cordis in casu ante enarrato evenisse, & directio doloris in statu inflammationis, in sequentisque corruptionis gangrenosæ docuit, & sectio cadaveris confirmavit.

VII.

- VII. Inflammatio enim ex affectione nervorum oritur & spasmo arteriarum perficitur. Hinc tota methodus antiphlogistica in relaxatione spasmī consistit.
- VIII. Sanguis vasorum mox inspissatur, mox attenuatur brevibus temporis intervallis pro ratione actionis vasorum, ut experimenta Hewsoni demonstrant.
- IX. Hinc sanguinis tenuitas phlogistica, lymphæ coagulum & pyogenia inflammationis effectus quidem, neutram vero causa sunt.
- X. Adeoque cum nervus phrenicus debilis inflammatione illico destructus esset, citâ necrosis illius partis pericardii & cordis, quas nervus adit, evenit.
- XI. Et delecto nervo, vasorumque ibidem regnantium actione sublata, nulla suppurationis vestigia ibidem inveneri poterant.
- XII. Neque minus ex eadem nervi phrenici destructione post inflammationis stadium asthma redit, nullo omnino medicamento domandum.

PICA 1018



73
DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
CARDITIDE SPONTANEA

Q V A M
CONSENSV ILLVSTRIS ORDINIS MEDICI

PRO IMPETRANDO LEGITIME DOCTO-
RIS IN MEDICINA

P R A E S I D U U M
D. ANDREA
S. P. CAESAR. COMITE, FACULT. MEDICAE
ORDINARIO, VRBIS PH

P VBLICAE ERVDITORVM

S VBBMITIT

AVTOR ET RESPO-
IOANNES FRIDERICVS
SONDERSHVSAW

ERFORDIAE DIE XV. SEPTEMB
IN AVDITORIO MEDICO HO

LITERIS HENRICI RVDOLPHI NONN

