

Kem 241
(1-27)

(10)

DISSERTATIO IN AVGVRALIS
CHIRVRGICO-MEDICA
SISTENS CASVM
**SPINAE VENTOSAE FELI-
CITER CVRATAE,**

Q V A M

CONSENTIENTE GRATIOSA FACVLTATE MEDICA,
PRO LEGITIME OBTINENDO DOCTORIS IN
MEDICINA GRADV,

P R A E S I D E

IO. MELCHIORE LVTHER,

PHIL. ET MED. DR. VTRIVSQVE FACVLT. PROFESS. PVBL. ET
ADSESSORE ORDINARIO.

PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI SVBMITTIT

AVTOR ET RESPONDENS,
IOAN. FRIDERICVS HAEBERLEIN,

NORIMBERGENSIS,

DIE VII. OCTOBR. ANN. MDCCCLXXXII.

IN AVDITORIO MEDICO HORA X-XII.

ERFORDIAE, LITTERIS NONNIANIS.



ERROREM, MATER NOSTRA

DIC AY OCTOBR VNC MEDOCXXII

IN AVENTORIS MEDICO HOSPITALI

NOTINAE PEGASIS

AUTOR ET RESPONDENS
JOAN LINDHICAS HALLERIEN

TAFFES, ULAPOLYAN EXAMINI ZABRILLIT

DISCERNERE QDINUM.

IO. MEICHOE FATHER
TULV ET TEL. DR. LITVZEA MACT. MDT. 1781 ET
DISCERNERE QDINUM.

PRAEVIDA

10. MEICHOE FATHER

DOCTRIINE OUTLINE OF DOCTORS IN
MEDICINE GRADED

DISCUSSIONS OF THESE DOCTORS IN
MEDICINE GRADED

CHIRURGICO-MEDICA
DISCUSSIONS OF THESE DOCTORS IN
MEDICINE GRADED

SIMILAE HINCOSAE HET
CHIRURGICAE

GRADU



I. N. D.

HISTORIA
SPINAE VENTOSAE OSSIS HUMERI IN EXTREM-
TATE INFERIORE, EX METASTASI MIASMATIS
SCABIOSI ORTAE, PER NOVEM ANNOS DVRATAE,
ET TANDEM FELICITER CYRATAE.

Honesta mercatoris uxor, annorum triginta
quinque, trium liberorum mater, statu-
rae mediocris, ob systema nervosum val-
de irritabile in animi commotiones maxime prona, tem-



peramenti cholericо-sanguinei, in civitate aliquot milia-
ria abhinc distante commorans, per novem annos spina
ventosa in extremitate inferiore ossis humeri sinistri, ex-
ostosi, atque hinc antibrachii anchylosi, nec non fistulis
in ipsam articulationem penetrantibus sociata, labo-
raverat.

A primis jam annis ardore quodam in superficie cutis
vexabatur, nec non lippitudine quasi chronica affligebatur.
Anno decimo quarto fluxus menstruus jam apparebat,
qui vero non ordinatam, sed mox copiosius, mox par-
cius, aut omnino non fluendo, periodum absol-
vebat.

Annum ætatis duodecimum habenti, in tota fere corpo-
ris superficie comparebant pustulæ suppurantes, quæ ex
descriptione mihi facta, veram scabiem humidam fuisse
detegebant; quam ex pudore sine ullo interno medica-
minum usu, pro more malo his in casibus solito, un-
guento ex sulphure composito repulit, & ad speciem
fanavit. Et licet post longum temporis spatium præ-
sen-

feotiae suæ signa salutariter iterum daret, continuo tamen sine ulla evacuatione facta, unguento mox memorato repellebatur. In hoc rerum statu matrimonium inibat.

Sanitatis conditio in primo puerperio erat mediocris, & nihil adversi memoratu digni experiebatur, præter id, quod peracto puerperio menses redeentes inordinate iterum comparerent, & lippitudo ingravesceret, dolorque punctorius in articulatione ossis humeri cum cubito persentiretur. Anno tandem millesimo septingentesimo septimo primo in condylo externo ossis humeri dolores osteocopi ægrotam excruciant, exuriente simul tumore, nucis juglandis magnitudine, qui mox augebatur, mox imminuebatur, ejusque color ruber mox in pallidum & vicissim pallidus in rubrum mutabatur.

Hæc rerum conditio trium annorum spatium emeticbatur; donec ex improviso tumor sponte aperiretur, & ichorem valde dilutum, sine ulla tamen dolorum

remissione effunderet. Chirurgus loci ea de causa vocatus, ulcus unguento digestivo & imposito emplastro discutiente deligabat; suppuratione exin facta auctiori, & dolores simul augebantur. Dilatationes a chirurgo aliquot septimanis post forcipe instituta, similem effectum adversum relinquebant. Anno dimidio elapso, tumore & anchyloſi auctis, ægrotia chirurgum dimittebat, ultiusque variis unguentis & emplaſtris ex axungiiſ factis, & vel ab empiricis vel anibus specifica domestica possidere ſomniantibus, impetratis, ipsa deligabat. Has inter personas principem locum tenebat ejus loci carnifex, ex præjudicio vulgi, illum, qui ad cadavera deglubenda, vel maleficum trucidandum necio quo caſu destinatus, virtutem innatam morbos graviores abigendi possidere. Ex unguenti ac pulveriſ inspersi uſu hujus hominis, ulcus quidem exſiccabatur, rumor autem auctis simul doloribus, in maius ſpatium extendebatur. Hoc in rerum ſtatū tertiae graviditatis ſigna apparebant, qua durante primus chirurgus ulcus iterum deligare curavit. Ultimo ante partum mense, dolores ita ingravescebant, ac miseram ita macie conficiebant, ut ſceleti vivi faciem re-

præ-

¶ * ¶

presentaret; qua de causa celebris Professor vicinæ
Universitatis consulebatur.

Hic factis chirurgi male contentus, remedia
ad vulneris deligationem adhibita, mutabat; ulte-
riora vero adhibenda post puerperium usque progra-
stinabat.

In festo paschatis Anni millesimi septingentesi-
mi Septuagesimi Septimi partu sat felici edebat si-
liolum adhuc vivum, sed eadem acrimonia, qua ma-
ter in juventute laboraverat, affectum.

Ad ulceris deligationem suscipiendam alias loci
chirurgus posthaec eligebatur; morbus spina vento-
sa definiebatur, huicque tam externis, quam inter-
nis methodice succurrebat.

Verum enim vero, cum & ex hac methodo nulla
convalescentia spes affulgebat, cura ultimo chirurgo ite-
rum committebatur, qui illam solus ordinabat, sed
fru-



frustra etiam per trium annorum spatum instituebat.

Durante hoc tempore canales orti quidem incisionibus saepius dilatabantur, & ulteriori genesi carnis luxuriantis cathæreticis resistebatur, verum hæmorrhagiæ exin excitatae, novam semper virium debitatem inducebant; qua de causa chirurgus loci fistulam ex toto resecare etiam timebat, sed alium in arte peritum chirurgum Norimbergensem convocari jubebat.

Hic incisionem instituebat triangularem eo usque, donec tota ossis cariosi pars visu pataret; linteum carpum ad deligationem adhibendum spiritu acidulo minerali, Liq. anod. min. Hoff. imbibebatur, & præter evacuationes leniores usum seri lactis suadebat. Nulla horum habita ratione ichor magis acerius effluebat, & dolores magis durabant, nec non emplastra adplícata, postea ablata colore magis nigrum contraxerant, atque hoc chirurgo Norim-

rimbergensi consulto, salivationem procurandi, an-
sam dabat. Verum & hic turpis conatus erat fru-
straneus; ulcus quidem ex parte exsiccabatur, sed
novi supra olecranum conspiciebantur sinus, & ne-
cessa erat, ut prima apertura Turundis aperta con-
servaretur.

Chirurgus Norimbergensis valedicebat, & e-
jus loci chirurgus per aliquot adhuc tempus Mi-
seræ curam gerebat, & suasu chirurgi Norimbergen-
sis in sinus aquam vegeto-mineralern injiciebat, &
carnem luxuriantem extracto Saturni, quoad exper-
tus sum, illiniebat. Posthæc legionis chirurgus
vicini propugnaculi in auxilium vocabatur. Hic
una cum corrigentium internorum usu, externe ole-
um caryophillorum cum linteo carpto ossi imponebat,
& ulceris aperturam emplastro diasulphuris Rul. ob-
tegebat.

Verum cum & hæc methodus frustranea
erat, ulceris deligatio chirurgo ejus loci solum ite-
rum committebatur.

Ab illo tempore ægrota ex doloribus brachii continuantibus, nec non cephalalgicis accedentibus, viribus ita privabatur, ut omnis convalescentiæ spes evanesceret, & mors omnium cruciatum & dolorum finis ac tutissimum remedium expectaretur. Rumor curæ viri cuiusdam in vicinia, dysuria per tres annos afflicti, & multa frustra tentati, tandem & mihi morbum hunc inquirendi occasionem præbebat.

Narrabatur mihi descripta hactenus historia, & præsens loci chirurgus mitellam, in qua brachium suspensum erat, & vincloram loci læsi removebat.

Exostosis hic circa cubitum in parte illius superiore tres ulnae quadrantes in peripheria exæquantem, & superficiem hujus partis maxime inflammatam animadvertebam. Musculi brachii erant tabidi; Cutis vero circa locum ulceris livida erat & tumida ac tactu mollis.

Remotis



Remotis linteis carptis & emplastris, quæ valde graveolentia erant, apertura ulceris in margine externo cavitatis sigmoideæ sub capitulo radii detegebatur, quæ horizontaliter sub radio partim in cavitatem articularem ipsam, partim oblique sursum in condylum externum extremitatis inferioris ossis humeri terminabatur. Sub hac viarum disquisitione, ossa quoque cariosa esse, instrumento exploratorio observabatur.

In superficie posteriori ossis humeri, quam musculus anconeus & supinator longus operiunt, tres simum callosorum aperturæ erant conspicuæ ; quorum duo interni oblique extrorsum, externus vero perpendiculariter deorsum circa angulum externum terminabantur in aperturam communem, quæ singulo sinu injectæ materiæ communem exitum concedebat.

Exostosis hæc, cum qua continuus synoviæ effluxus conjunctus erat, tantam anchylosin causaverat, ut omnium quoque digitorum motus & tactus imminuti essent. Sub appressione vero condyli interni & mu-



sculi radiae interni, pulsans & pungens dolor per totum antibrachium oriebatur.

Prognosis, quam mihi formabam, erat sequens: si possibile sit, ut tota humorum massa corrigi & emendari possit, etiam possibile esse, ut a deposita aeri materia erosa ossa, consanari quoque possint; sine qua emendatione Amputatio cubiti ipsa frustranea foret.

Cum jam ægrota tentamini huic obsequi promiserat; jubebam ejus loci chirurgo, ut deligationem ulceris bis indies ita expediret: ossi scilicet carioso linteum captum purum ut imponearet, reliquum vero linteum linimento quodam, cuius basis erat cera tum saturni & aqua genuina Thedii, Arquebusade dicta, illiniret.

In aperturas sinuum injiciebatur liquor abstergens, qui ex vitello ovi & melle rosarum ad invicem intime mixtorum & balsamo copaivæ in spiritu frumenti soluto componebatur.

Tegmi-

Tegminis loco eligebam tantum emplastrum dia-chylon simplex.

Lateribus articulationis cubiti tenuina splenia ap-
plicabantur, & circum brachium a digitis usque ad hu-
merum fascia, dolabra ascendens dicta, ducebatur.

Ad nimiam irritabilitatem, ex febre a sanie re-
sorpta ortam, imminuendam, emulsiones papaverinas,
& ad invertendam ac mitigandam acrimoniam, deco-
ctum ex partibus anaticis Rd. bardan. Liquirit. & sum-
mit. Millefol. ordinabam;

Methodum hanc brevi tempore dolorum & febris
remissio, ichoris effluxus imminutus, & illius ad pu-
ris similitudinem mutatio, inflammationis externæ dis-
cussio, & ulceris primarii, ac sinuum superiorum ma-
jor apertura sequebantur; præcipue autem somnus &
sudoribus nocturnis virium debilitatem inducentibus non
amplius interturbabatur.

Ad ciborum nauseam continuatam, multisque ructibus comitatam sublevandam, nec non ad primas vias expurgandas, mane pulvis digestivus ex sale mirabili Glaub. Rhabarb. & Lapid. Cancr. commixtus, porrigebatur. Post meridiem vero Elixirium quoddam viscerale, ex Extr. Cichor. Rhei, Gent. rubr. in aquis carminativis solutis, addito Liq. Terræ foliat. tartar. compostum exhibebatur; Sæpius etiam Tinct. Rhab. aquos, cum tertia parte Elix. visceral. balsam. Hoffm. ordinatur; ex quorum usu chylificatio æque ac sanguificatio reficiebantur ita, ut diu retentus fluxus menstruus rediret, animique hilaritatem majorem ægrotam sentiret.

Necessariæ adhuc' ulceris ac sinuum dilatationes ope linimenti antiputridi, ex Myrrh. rubr. Mastich. sale ammoniac. Nitr. & paululum Camph. in spiritu frumenti solut. compositi, quo linteum carpunt illiniebatur, obtinebantur; ægrotam enim omnem jam abhorrescebat incisionem.

Ex

Ex hujus usu condylus externus ac capitatus ita denudabantur, ut illum satis commode perforare & Essentia Euphorbii illinire possem. Ad hæc condylus externus non solum, sed & simul dimidia pars externa marginis articularis capituli radii simul arrosi exfoliabantur.

Exfoliatio successive contingebat, præcipue si supra memoratus liquor in sinus injectus per inferiorem aperturam primariam iterum effueret. Maximam vero condyli externi partem, nigram & mobilem, & ex qua oleosus & acris liquor exstillabat, perforando simul atque semel extraxi; dum inferius in margine majori eminentiæ trochlearis terebram adplicabam & oblique sursum substantiam penetrabam, ita ut instrumentum circa fossam posteriorem supra capitulum superius radii iterum exiret.

Loca jam ossis perforata spiritu Mastichis, carnosæ vero partes liimiento antiputrido denuo deligebantur, quorum usu caro spongiosa evanescet, pus magis

magis coctum adparebat, & duo sinus posteriores in articulationem penetrantes consanabant. Externus vero sinus tamdiu apertus manebat, quamdiu nullæ amplius parvæ particulæ exfoliatæ sub injectione exibant.

Posthæc ossis portio tam, quam caro nova succrescebant, & mobilitas antibrachii semper liberior peragabatur; quæ vero plenarie restituebatur, quam primum exostosis condyli interni resoluta erat. Hanc resolutionem promovebat sapo saturninus sale volatili proportione circumstantiarum imprægnatus & inunctus.

Interne durante exfoliatione, ad vires restituendas & acrimoniam relictam evacuandam, bis quotidie cortex peruvianus cum cremore tartari porrigebatur, & loco potus per aliquot dies species supra memoratae præscribebantur.

Harum specierum loco Lychen islandicus substituebatur, ad tentandum, an hoc simplex remedium, muci-

mucilagine sua amara, compositionem superiorem datum effectu superaret. Usus vero statim nauseosus erat, & ideo intermittebatur.


Durante hoc tempore sanationis ægrota iterum ingravidabatur, & in fine Anni millesimi septingentesimi octuagesimi primi feliciter filiolum iterum peperit, & sub continua ac durabili sanitate in puerperio cubavit.

Ex hucusque dictis patet, uti ego quidem puto, in morbis quoque ossium gravioribus licet, amputacionem raro tentandam esse, cum levioribus chirurgicis sæpenumero cedant operationibus, quod sententia viorum in chirurgia clarissimorum consentaneum est. Quin imo interna pariter medicamenta heroica toties decantata non semper requiri, sed ordinariis ac vulgaris remediis ejusmodi mala cedere historia morbi a me pertractati edocet.



C

THESES



THESES EX MEDICINA MISCELLANAEAE.

I.

Medicamenta simplicia, compositis, nostraria, plesisque exoticis praeferenda.

II.

Varia purgantium genera indiscriminatim adhibere Medici prudentis non est.

III.

Animi affectus non omnibus & semper nocent.

IV.

Hominem sanum, functionum omnium integritas facit; in unius etiam defectu, morbus.

V.

Omnia, quæ fluidum nerveum dissipant vel absument aut enervant, stomachum laedunt.

yt

VI.

Maxima sed rudis Medicorum scarlatanaria ludi-
tur in inspectione urinæ.

VII.

Crisium in morbis acutis diversitas, & regularis
statisque diebus successus a distincta materiae morbificæ
qualitate & discrepante simul naturæ robore atque vi-
vacitate dependet.

VIII.

Notabile discrimen vulnera absolute lethalia & vul-
nera per se lethalia intercedit.

IX.

Potulentorum abusus, humores non fluidiores red-
dit, sed spissiores.

X.

Venælectio & debilitat & roboret.

XI.

Aer & destructor rerum est & conservator.

C 2

XII.



XII.

Optimum est omnibus infantibus lac matris, modo nullo morbo sit corruptum.

XIII.

In febribus cum graviditate connexis Practicum rationalem abstinere oportet ab usu emeticorum.

XIV.

Nulla datur irritabilitas sine nervo,

XV.

Cortex peruvianus & febrim tollit, & incendit

XVI.

Nervi in cor exercent imperium.

XVII.

Catarrhus modo causa, modo effectus est febris catarrhalis.

XVIII.

Omnis critica morborum solutio provenit a febre acuta, Medicus ergo in dirigendis crisibus occupatus, febrem acutam attendere debet.

XIX.

XIX.

Si febris supprimatur, supprimitur crisis; si rite dirigatur, rite etiam dirigitur crisis.

XX.

Ad sanguinis laudabilis copiam confert multum carni recentium & juscotorum inde extractorum elus.

XXI.

Melancholici ad morbos chronicos maxime propendunt.

XXII.

Ex causis prægressis, quæ viscidum generare possunt, & ex effectibus præsentibus, quorum causa est visciditas, optime ac certissime concluditur humorum visciditas.

XXIII.

Omnis nutritio fit mediantibus fluidis subtilissimis.

XXIV.

Omne hecticorum delirium periculo non caret, sed malo potius omine oritur.

C 3

XXV.

XXV.

Non tamen semper ex ortu eorundem, ad citissimum interitum concludi debet.

XXVI.

Electricitas in siccitate & humiditate glutinis Teste celeberr. Tissot quam optime se serit.

XXVII.

In degeneratione musculi incassum adhibebitur.

XXVIII.

In paralyssi a venere nimia nocet.



KO 18

PICA





(10)

DISSE^TAT^O IN AVG^RALIS
CHIRVRGICO-MEDICA
SISTENS CASVM
SPINAE VENTOSAE FELI-
CITER CVRATAE;

Q V A M
CONSENTIENTE GRATIOSA F
PRO LEGITIME OBTINEN
MEDICINA G
P R A E S
IO. MELCHIOR
PHIL. ET MED. DR. VTRIVSQUE FA
ADSESSORE ORD
PVBLICO ERV^DITORVM EX
AVTOR ET RES
IOAN. FRIDERICVS
NORIMBERGE
DIE VII. OCTOBR. AN
IN AVDITORIO MEDICO

ERFORDIAE, LITTER

