

N
Contin.

PéL

charid

Wér

t. Erf.

M

7

67.

Thema Jahr Autor Präfes
1.) Fächer-Schule 1731 F. J. Hahn —

1729 in Berlin

- 2.) Caudinarien 1767 — L. F. E. Kämpel Erfurt
- 3.) Passion-Hymnen. 1721 A. G. Richter F. J. Hahn "
- 4.) Käuflich 1739 F. G. J. Boeck Richter "
- 5.) Nov. Celsii 1741 O. G. Albrecht "
- 6.) Käufch. Teber- 1742 S. A. Gehr. "
- 7.) Wachstucht 1743 F. J. H. Höpfl. "
- 8.) Tonus Capitii 1743 F. J. Kämpf. "



Kem 487 (1-8)



64

D.6

II

7

(2)

DE
CANTHARIDIBVS

EARVMQUE
TAM INTERNO, QVAM EXTERNO
IN MEDICINA VSV
DISSERIT

AC

AD AVDIENDAS PRAELECTIONES
MEDICAS

NOBILISSIMOS DOMINOS COMMILITONES
OFFICIOSE INVITAT

LVDOV. FRIDER. EVSEB. RVMPPEL

MED. DOCT. ET PROF. PVBL. EXTRAORD. ACADEM. CAESAREAE NAT.


CYRIOS. SOCIVS AC BIBLIOTHECAE CVSTOS, VT ET ELECT.

MOGVNT. SCIENT. VTIL. SODALIS.



* * * * *
ERFORDIAE, LITERIS HENR. RVD, NONNII, ACAD. TYPOGR. 1767.







Magnum natura progenerat earum rerum numerum,
quæ corporis humani vires conseruant, augent,
vel eas labefactatas restituunt. Magna autem ea-
rum etiam rerum copia in hoc vniuerso reperitur,
quæ admirandam corporis humani machinam vel lente vel subito
dissoluunt ac destruunt. Media denique quarundam rerum est ad
corpus humanum ratio, quæ nempe sub quibusdam conditionibus
valetudinem ac vitam, in aliis morbum ac mortem producunt. In
hisce rebus, quarum anceps est ad corpus humanum relatio, meri-
to numerandæ sunt, quas paucis iam iam dispiciemus, *Cantha-*
rides.

§. I.

DESCRIPTIO CANTHARIDVM.

Cantharis est insectum *Coleoptero-macropteron*, cuius tarsi pedum

A 2

prio-



priorum articulis quinque, posteriorum quatuor sunt instructi, *antennæ* setaceæ, thorace longiores, *caput* inflexum, *os* maxillosum, palposum, *thorax* inæqualis, scaber, non marginatus, planiusculus, *abdomen*, lateribus plicato-papillosis, *elytra* flexilia, s. mollia, *corpus* oblongum, fere cylindraceum 1). Nomen horum animalculorum latinum est *cantharis* ex græco κανθάρης desumtum, quod Galli per *mouche cantharide* exprimunt, nos eas *spanische Fliegen* hispanicas adpellamus, quo nomine & Anglis veniunt *spanish Fly*. Exterior earum superficies per microscopium obseruata, tam in alis superioribus quam in capite, thorace ac ventre æneum colorem refert, qui præsertim, cum lux per alas transmittitur, est conspicuus, superficie harum partium infixæ sunt plumulae tenuissimæ viridissimi coloris, quæ animali nudo oculo conspecto viridem colorem impertiunt, ad latera vero longiores plumæ æneo colore tinctæ prominent. Fætidum odorem spargunt hæc animalcula & rosis, sambuco, ligastro, inglante, segetibus aliisque plantis, quas erodunt, pascuntur; in climatibus fervidioribus magna; in Germania minor earum copia occurrit.

§. II.

ANALYSIS EARVM CHEMICA.

BORRICHIVS 2) ope vitræ retortæ ex vncia cantharidum cir-
citer dimidiæ drachmam salis volatilis, totam drachmam olei
crassi, coloris subflavæ, odoris fœtidi, & continuato labore nonni-
hil aquæ flauæ & salis fixi elicuit, nihil autem acidi in iis detexit.
BAGLIVIVS 3) per digestionem acrem, resolventem atque eroden-
tem a cantharidibus separauit tincturam. Vedit oculatissimus

LEEV-

1) Schäffer Elementa Entomologica Ratisb. 1766. in 4. mai. Tab. XXXIII.
Cantharis, Pflaster Käfer, Linnaei syst. nat. p. 403. n. 27. 28.

2) In actis Hafniensibus Vol. IV. P. I. Obs. 80.

3) Opera, edit. Antwerp, 1715. 4. Diss. de ysu & abusu vesicantium c. I. ex-
per. I. & II. p. 647.



5

LEEVWENHOEK 1) in contusis his animalculis, quibus aquam infuderat, eamque aëri expositam iterum in auras abegerat, multas salinas partes concretas, vt & in cantharidum oleo & spiritu adspersa aqua dilutis iterumque exsiccati, nec non in capite mortuo illarum elixiuato. COCKBVRN 2) octo vncias cantharidum ex retorta leni arenæ igne destillavit & cum sale volatili spiritum atque oleum obtinuit, relicto capite mortuo vnciarum duarum & quinque drachmarum. Separato deinde oleo ope pulueris laterum spiritum habuit, qui quidem cum sale absynthii, cum spiritu C. C. & salis ammoniaci aliisque alcalinis non efferuescebat, spiritui autem vitrioli affusus multoque magis spiritui nitri maiorem ac modo dicta alcalina iisdem spiritibus acidis affusa, stridorem edebat. Cæterum quamuis nullum sit dubium, canthrides adhuc recentes maiori vi esse instructas, quam quarum successu temporis sal volatile, magnam partem, in auras euolauit 3) tamen cum acidis fossilibus diu efferuescunt, imo post annum spatium concusso liquido, cui innatant, denuo efferuescunt 4). Fœtor cantharidum sulphuris impuri, acrimumque & penetrantium salium copiam annunciat, sapor acerrimus eumque sequens sitis ac dolor penetrantem salium acrimoniam prodit. Celeberrimus CARTHEVSER 5) in cantharidibus partes resinosas, plures gelatinosas & plurimas terreas detexit, quas partes etiam iis tribuit celeberrimus GERHARD 6), & salis ammoniaci particulam, quæ omnibus ineft animalibus, addit. Excell. SPIELMANN 7) ex cantharidum libra vna spiritus alcalini vncias tres cum dimidia, olei rufi drachmas sex, salis volatilis vncias duas per destillationem obtinuit.

A 3

§. III.

- 1) In epist. LXX. p. 236. 2) Rieger Introduc. in histor. rer. natural. & artefact. Hag. Comit. 1743. 4 Tom. II. voc. Cantharis p. 481. 3) De sale volatili cantharid. vid Charas Pharmacop. reg. Genev. 1683. in 4. P. 2. p. 190. 4) Cranz mat. med. Tom. III. Clas. VIII. pag. 92. edit. 1762. 5) Mat. med. P. I. sect. VII. §. 2. 6) Mat. med. Abschn. IX. Cap. XI. §. 326. 7) Instit. ehem. §. 72. experim. 64. p. 205.



§. III.

ACTIO CANTHARIDVM IN CORPVS HUMANVM.


Cantharidum vires ex earum partibus, quas chemica detexit resolutio, intelligi queunt, quid autem in corpore animali efficiant magna cum solertia experti sunt medici. Duplex omnino est cantharidum in corpus animale actio, alia in partes illius fluidas, alia in solidas. Vtramque experimentis institutis nos docuit BAGLIVVS ¹⁾: Sanguini humano e vena missò immiscuit scrupulum vnum cantharidum, quo facto sanguis breuiori tempore coagulatus est, quam si sibi esset relictus, tum colore plumbeo & subnigro tinctus, ac subtili pellicula subnigra inductus fuit, demum in serum nigrum ac subfluidum dissolutus. Canis iugulari dextræ incicit vncias duas tincturæ cantharidum; Vulnere confuso ac fascia obdueto, canis vomuit, humi procubuit quasi exanimis, tum paulum arrectus nihil comedit, vehementissime sitiir, pota aqua copiosissimam vrinam flauam misit & quarto die inter maximos v lulatus exspiravit. Cadavere aperto collum ea parte, qua vulnus incisum, sphacelatum omnino erat & foetidum; dexter cordis ventriculus sanguine nigerrimo parum coagulato, in cuius superficie guttulæ quædam velut olei natabant, repletus, in sinistro ventriculo sanguis nigerrimus ac dissolutus, pulmo ac reliqua viscera sana; in vesica autem vrinaria nulla muci, qui alias adesse solet, vestigia, bilis in vesica fellea aliqua nigritie infecta. Ex his adparet, canthrides humores corporis animalis corrumpere & ad corruptionem disponere, totumque vasorum neruorumque systema irritare, exulcerare atque erodere, quod ex sequentibus clarius patebit. Quanam autem in parte cantharidum hæc vis resideat, interscrutatores naturæ maxime ambigitur. Non morantur eos, qui cum BORRICHIO in spiculis, quibus cantharidum corpus obseptum est,

miri-

1) Oper. omn. edit. Antwerp. 1734. 4. Diff. de usu & abusu vesicantium Experim. 1. 2. 3. 4. p. 648. 649.

mirificam hanc vim inuenisse, sibi visi sunt. Alii ad rectiora dela-
ti hanc vim in sale volatili acerrimo & sulphuris penetrantioris co-
pia ponunt, quam sententiam tuentur STENTZELIVS 1) HVX-
HAM 2) aliique plurimi, quum alia quoque salia alcalina volati-
lia eandem vim exserant & dissolutionem sanguinisque putredinem
promoueant. Contrarium autem statuit, quod in se ipso est expertus
PROBST 3); & BORRICHIVS quoque 4) narrat, se ut virium can-
tharidum sedem experiretur, famuli sui manum alia parte oleo can-
tharidum crasso, alia vero sale volatili earundem leuiter soluto per-
fricuisse, famulumque nil inde mali, vesicularum dolorisue sensisse.
Hinc in resinosa potius parte alii hanc vim querunt 5). Alii ef-
fectum cantharidum compositum non ex unica earum parte, sed ex
omnibus simul summis deducunt, recte enim iudicante Galeno alia
est remediorum viribus unitis agentium, alia corum in diuersas par-
tes distinctorum operatio, ac proinde quid quaelibet pars ad totum
effectum conferat, curiosius inquirere supercedent. FREIN-
DIVS 6) limites humani ingenii agnoscens, qua vi quoque demum
modo cantharides humores attingant, neminem satis adhuc expli-
casce, ingenue confitetur; interim tamen vesicas a catharidibus ex-
citatas comparat cum iis, quas ignis elicuit, vbi diuulsa, qua vasorum
ora defendi debebant, curicula, sero via aperitur. Hanc au-
tem cantharidum vim tam in se, quam ratione rerum ad quas ad-
plicatur augeri minuiue posse, sana ratio ac experientia docet. In
se determinatur eius quantitas tam extensiue numero partium, qua-
simul agunt, quam intensiue conditione partium ac libertate, qua
agunt. Quo plures, quo ponderosiores, quo recentiores adhiben-
tur

1) Diss. de Cantharidibus prosperae aduersaque auctoribus valetudinis Vi-
temb. 2740. 2) Opera physico medica edit. Reichel Lips. 1764. in 8.
Tom. II. cap. 8. p. 115. 3) Diss. de sale volatili cantharidum, Argento-
rat. 1759. 4) Act. Hafn. Vol. X. observ. 89. p. 216. 5) Gerhard
Mat. med Abschn. IX. cap. XI. §. 326. 6) Opera omnia medica Paris
1735. 4. Comment. IX. p. 60. 61.



tur cantharides, eo maiora suarum virium specimina edunt, quo magis earum partes actiuae resolutae & ab impedimentis liberatae, quod fit, si fuerint vino vel spiritu vini soluta, eo fortiores erunt. Quo minor autem earum adhibeatur quantitas, vel quo magis earum conatus fuerint impediti, inuoluti ac restinoti, quod pinguedine, iusculo pingui, lacte, camphora &c. fieri solet, eo erant remissiores ac debiliores. Ratione corporis quoque, cui accommodantur plus minusue erit ab earum minis metuendum, quo magis illud earum actionem excipiat partesque præbeat, in quibus illæ vim suam exercere queant, quoque validiora iis repagula opponat.

§. IV.

CANTHARIDES VENENIS AD NUMERATAE.

Quum tanta sit cantharidum acrimonia, vt in ratione ad massam corporis humani parua cantharidum quantitas maximos in corpore humano tumultus concitare imo mortem ipsam inferre valeat, hinc a veteribus cantharides in venenorum numerum sunt relatæ. Sic apud CICERONEM 1) Caius Carbo accusante L. Crasso cantharides sumfisse dicitur, & apud eundem 2) Theodorus Lysimachus mortem minitanti; *magnum vero, inquit, effecisti, si cantharidis vim consecutus es,* & OVIDIUS inuidum deuouens ait, 3)

Cantharidum succos dante parente bibas.

DIOSCORIDES 4) vim earum describit δύο εργασίες δέ αὐτῶν καὶ τηλικῆς ἐλαχίστης θεραπευτικῆς. Vis ipsarum communis septica, exulceratoria & calefactoria, & libr VI. de Alexipharmacis, in quo venena enumerat, primo statim cantharides ponit & cum commentatore MATTHIOLO omnium partium erosionem mixtumque cruentum illis adscribit. GALENVS 5) cantharides venena nominat & varia, quæ iis op-

1) Epistol. ad familiar. IX. 21. 2) Tuscul. Quæst. V. 40. p. 463. edit. Ernesti 3) In Ibin, v. 188. 4) De Mat. med. libr. II. cap. 66. p. 105. edit. Wechel. 5) Libr. I. de remed. compos. cap. I.


opponi possunt, remedia commendat 1). PLINIVS cantharides potas venenis adnumerat 2) cum erodente in ac exulcerantem iis vim inesse exemplo Cossini Equitis Romani demonstrat, qui Lichene laborans imprudenti cantharidum potu præmatura violentaque abruptus fuit morte. AVICENNA, qui pleraque ex Dioscoride & Galeno hausit, eorum etiam de cantharidibus fecutus est sententiam 3). Horum auctoritate suffulti multi recentiores medici cantharides venenis adnumerarunt; PARACELSVS, HELMONTIVS, TRINCAVELLV, MERCVRIALIS, MOVFETVS, HOLLERIVS, CHARAS, 4); SCHROEDER 5) eos audaculos nominat, qui diureticis cantharides, cum tamen inter venena recenseantur, admiscent; cui adstipulatur illius interpres HOFFMANNVS 6). Noxios cantharidum effectus referunt HILDANVS 7), FORESTVS 8), BACCIVS 9) CABROLIVS 10), BONETVS 11), WEPFER 12), FRICCIVS 13), eleganti carmine hanc vim cantharidum & remedia contra eas paranda describit NICANDER 14), cuius interpres IOH. GORRAEVIS ait:

vis dira veneni

Praualet & miseros præter spem pascitur artus.

Cantharides etiam damnant VALISNERIVS, TOVRNEFOR
B TIVS,

1) Libr. II. de Antidot. cap. X. 2) Histor. natur. libr. XXIX cap. IV. Tom. II. p. 509. edit. Harduin. & cap. VI. p. 611. libr. XXVIII. cap. X. p. 470. & cap. IX. p. 465. 3) Opera edit. Venet. 1555. fol. lib. VI. cap. I. 4) Stentz. Diss. cit. §. 3. it. Excell. Vogel Diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica, in primisque cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia Resp. Wichmann. Goetting. 1762 §. V. 5) Pharmacop. med. chym. libr. V. class. IV. n. 98. p. 340. Vlm. 1649-4. 6) Clav. Pharm. Schroed. lib. V. sect. IV. §. 76. 7) Cent. VI. obs. 98. 99. 8) Observ. med. lib. XXX. obs. 6. 9) De venen. p. 10. 10) Obs. 17. 11) Sepulchret. anat. lib. III. sect. 24. 12) Histor. cicut. aquat. p. 306. 13) De virtute venen. med. cap. V. p. 161. 14) Nicandri Colophonii Alexipharmacæ Io. Gorraeo interprete Paris 1549. in 8.



TIVS, LEMERY, POMETVS, adeo ut in Gallia pharmacopolæ in cantharidibus æque ac aliis venenis vendendis circumspeti esse & cantharides non nisi vesicarum mouendarum caussa vendere iubentur 1). GEORG. WOLFFG. WEDEL 2) HERMAN-NVS 3) BAGLIVIVS 4) easdem valde suspectas reddunt. Ferales casus multi medici referunt: BRASAVOLA 5) perhibet rhabarbarum in eo mortario contusum, in quo antea cantharides communatae & quarum forsitan quedam reliquæ rhabarbaro admixtae fuerant, partium ab ore ad anum usque erosionem produxisse. Italum quendam robustum succique plenum sumto puluere ex satyriis, pipere longo & cantharidibus composito, magnis ventris torminibus & vomitu continuo exagitatum, auctis demum ventriculi vniuersitate abdominis doloribus, tribus interiectis diebus periisse, SCHENCKIVS auctor est 6). BONETVS 7) secto cadauere, quod cantharidum virus peremerat, ventriculum cum vesica vrinaria exulceratum inuenit. SALMVTHVS 8) aliquem cantharidum puluere ad ciendam venerem abusum, altero statim die paraplegia extinctum fuisse, refert. LANGIVS 9) atrocissima damna recenset ex cantharidibus. STENTZEL 10), a male seriatis hominibus ex cantharidibus in puluerem redactis & cum melle coniunctis conficit trochiscos vel electuaria, quæ dicantur venenum extemporaneum, quo frequenter exhibito multa mala, demum mors ipsa sequuntur. RIEGER 11) etiam cantharidibus nomen veneporum imponit ea ex ratione: *Quum omne illud, quod exili mole cor-*

pus

- 1) Pomet Hist. gen. des drogues P. II. p. 154.
- 2) Amœn. mat. med. lib. II. sect. II. cap. VI. p. 342.
- 3) Cynosur. mat. med. P. II. p. 53.
- 4) Lib. cit. cap. 2. p. 651.
- 5) Comment. in aphorism. Hippocr. lib. II. aphorism. 17.
- 6) Observ. med. rario. Lugd. 1644. fol. lib. VII. observ. XXXV p. 846.
- 7) Anatom. pract. Genev. 1679. in fol. Tom. II. libr. III. sect. 24. §. 3.
- 8) Observat. Brunsv. 1648. in 4. Cent. III. obs. 23.
- 9) Epistol. med. lib. I. epist. 47.
- 10) Toxicologia s. de Venenis Wittemb. 1732. in 4. lib. I. p. 28.
- 11) Introduct. ad notit. rer. natural. & artefact. Tom. II. p. 476.

pus subiens, neruofas maxime partes subito & vehementer, tam interne quam externe adoritur, ac tenui penetranti suo principio breui tempore magnas mutationes easque perniciofas inducit, venenum audire soleat, ita quoque nomine merito insigniuntur cantharides nostri corporis respectu. ALLEN 1) tristes cantharidum intro sumtarum effe-
ctus ab antiquis & recentioribus annotatos complectitur: omnes partes ab ore ad anum vsque internas arrodunt, inflammant, in primis partibus vrinæ dicatis infensa, in quibus ardorem inflammatorium, excoriationem, penis erectionem, stranguriam & ischuri-
am excitant, quam vasorum vrinariorum gangræna & ipsa mors sequuntur. Celeb. CRANTZ 2) cantharides venenorum, hetero-
clitorum autem, classi inserit, idem facere videretur GERHARD 3)
qui propter nimiam harum vim irritantem, iis interne uti plane
vetat. His igitur animalculis adeo noxiis vel ex corpore plane eli-
minandis, vel earum rabiei infringendæ varia medici adhibuerunt
remedia. DIOSCORIDES 4) vomitum commendat, propinato
oleo eliciendum, quo secuto halice aut oryzæ, tragi vel ptisanæ
cremores aut decoctum malvæ, vel semenis vel fœni græci, vel ra-
dicum altheæ, quam latini hibiscum adpellant, clystere infundi iu-
bet, dari deinde vinum aut passum, in quo pinei nuclei & cucu-
meris semina contrita fuerint, aut ex laete, mulsa, vel anseri-
num adipem in passo liquatum; inflammatis autem partibus hor-
dei farinam cum mulsa decocta. IDEM 5) ab aliis pro antidoto
traditas cantharidum alas & pedes, refert, quæ opinio, nescio quo
fundamento nixa, etiam GALENO, PLINIO, AETIO & Diosco-
ridis commentatori IANO ANTONIO SARACENO 6) placuit.
Recentiores omnino in usum vocant vomitoria, diluentia aquosa,

B 2

emol-

- 1) Synops. vniuers. med. pract. Francof. 1753. in 8. cap. XVI. de veanen.
animal. art. 60. 61. 2) Mat. med. Tom. III. Class. VIII. p. 91. 3)
Mat. med. Abschn. IX. cap. XI p. 345. 4) Alexipharm. cap. I p. 402.
edit. Wechel. 5) Mat. med. lib. II. c. LXVI. p. 103. 6) Schol. in
Dioscoridis I. c. p. 32.



emollientia oleosa & putrefactioni resistentia acida. Remedia a DIOSCORIDE proposita sausto cum successu applicuit FORETUS 1); infusum cantharidum & succoladæ pro stimulanda vene-
re sumtum, quod maximam dysuriam, ardorem doloremque com-
mouerat, solo laetis recentis paulo largiori potu fuit profligatum
teste WEDELIO 2); profuerunt quoque anodynæ, syrapi refrige-
rantes & confortantes, emulsiones 3); puluis ex semine ammeos,
ex lapide prunellæ, cum emulsionibus, aqua spermatis ranarum,
emulsiones ex seminibus sceniculi, malue & amygdalis dulcibus;
potio terebinthinata cum diacodio & syrupo de althæa 4); contra cantharidas epotas, ortumque exinde priapisimum efficacia sunt
falia acida epota & externe acetum vini calidum, faex vini genero-
fioris, interne oxymel simplex 5) & teste GREENFIELD cam-
phora.


§. V.

CANTHARIDES INTERNE SALVATORES.

Sed quemadmodum res in se saluberrimæ vel in nimia quantita-
te corpori ingestæ, vel aliis simul adsumtis, vel statui cuidam cor-
poris præternaturali contrariae maximas calamitates ipsamque mor-
tem adducere possunt: ita violentissima remedia, si exiguum eo-
rum portionem, eamque aliis adiunctis temperatam ac refrenatam
corpori committamus, non modo nihil damni inferent, nec vires
vitales superabunt ac defruent, sed etiam fugatis morbis optimam
valetudinem vitæque robur restituent. Quis nescit in mercurio
sublimato corrosivo truculentissimas contineri vires, quas tamen ars
medica ita domat, ut corpori salutem pæne desperatam reddere
cogantur? Quid ergo vetat similibus cantharidum acrimoniam co-
ercere legibus? fortia mala fortioribus pelluntur remediis.

Sic

1) Observ. med. I. XXX. obs. 6. 2) De Medicam. compos. p. 63. 3)
Bartholin. Act. Hafn. Cent. III. hist. 16. 4) Ephem. Nat. Curios Dec.
I. An. II. p. 105, & Dec. II. An. X. p. 59. 5) Lindestolp, de Venen.
p. 892,



Sic Tigres subiere iugum victoris Iacchi.

GREENFIELD 1) totus in eo est, vt vsum cantharidum tam a veteribus, HIPPOCRATE, DIOSCORIDE, GALENO, quam a recentioribus CAPIVACCIO, LISTERO, FABRICIO AB AQVAPENDENTE, THOM. BARTHOLINO, HOFFMANNO aliisque commendatum demonstret & omne ab iis datum damnum in abusuum ac imperitiae medicorum rationes referat. Idem egerunt HEVRNIVS 2) & CHARAS 3). Cantharides, vt plerisque antiquis visum, nimiam seri copiam e corpore humano pellunt, serum viscidum dissoluunt & sic obstrunctiones tollunt, calculum comminutum eliminant ac vniuersi corporis fordes per renes & vesicam vrinariam exonerant, & hinc quidem corporibus tabe exsiccatis, vel renibus inflammatis aut ulceratis, aut si sanguinis acribus referti salibus motus vehementior corpus perturbet, sunt pestiferæ, at in diuturnis infirmitatibus, a ferosarum impuritatum copia ortis, quæ neruos ac reliqua vasa relaxant, premunt, eorumque actiones impediunt, ac vbi a solidorum flacciditate ac languore maxima imminent pericula, cautus cantharidum usus opem feret admirabilem. Præcipua cantharidum vis in vesicam vrinariam dirigitur, salia quippe massæ sanguineæ commixta, ac per renes ad dictum lotii receptaculum delata magis soluuntur, maioremque contrahunt acrimoniam, ac maiorem agendi libertatem atque conatum, qui se in vesicæ parietibus, vbi minorem quam in aliis partibus inuenit resistentiam, præcipue exserit; minori enim liquoris gelatinosi quantitate, quam alia vasa interior vesicæ vrinariae substantia oblinitur ac defenditur, vt adeo soluta atque exasperata cantharidum particulæ neruosam & fere nudam vesicæ partem quam maxime irritare queant 4). Eam ob rationem in uniuersum

B 3

uersum

1) Treatise of the safe, internal Use of Cantharides Lond. 1708, in 8.

2) Method. ad prax. lib. II. 3) Pharmacop. reg. Tom. II. lib. II. p. 3.

c. 14. 4) Stentzel l. c. §. 12. p. 35.



uersum veteres ut DIOSCORIDES, AETIUS, ARETAEVS, AEGINETA, TRALLIANVS fere totam coleopterorum familiam ac in primis cantharides in morbis vesica & renum tanquam specifica diureseos mouendae vi instructas in usum vocarunt 1). In ipsis vesicae vrinariae morbis cum successu adhibentur. Ad tollendam vrinæ suppressionem FABRICIVS AB AQVAPENDENTE forma mulsi eas exhibuit. CAPIVACCIVS, THOM. BARTHOLINVS per infusum vinorum cantharidum eundem morbum curarunt 2). Illustr. b. WERLHOF a. 1733. etiam in vrinæ suppressione, quam comitabantur deliria, tendinum subsultus, pulsusque inæqualis cantharidas cum emulsione fauste exhibuit, easdem camphoræ nuptas ad auerendum, qui imminebat, vrinæ ardorem propinavit 3) HVXHAM de cantharidum in ischuria usu timide sentit: et si, inquiens 4) in ischuriis sperato cum effectu datas persperxi, attamen si illa non cito expectationi respondeant, timeo, ne simul acribus cum salibus agant, & ægroti mortem accelerent, excitando deliria & conuulsiones, quod in primis exemplo feminæ pinguis renal ischuria laborantis confirmat, que a morbi initio usque ad mortem, die suppressionis undecimo securam, ne guttulam quidem vrinæ emisit, et si cantharides in substantia earumque tintura ac alia medicamenta largis dosibus, & fortasse nimiis, fuerint porrecta. Renibus inflammatis cantharidas maxime obesse supra diximus; hanc rem insigne apud MONRO exemplum probat 5), quo homini eidam suppressione vrinæ pertinacissima laboranti, ex consilio medicorum, bis quoquis die 6 grana cantharidum cum 3 granis camphoræ & 10 granis sacchari mortario contrita frustra sunt data; nulla quidem stranguria aliud incommode secutum, imo paullo liberius vrinam mittere videbatur æger, sed mox reuertens

malum

1) Excell. Vogel l. c. §. VII. p. 28. 2) Rieger l. c. p. 488. 3) Vogel l. c. §. VIII. p. 37. 4) Oper. Tom. II. p. 124. ed. Reichel. 5) Beschreibung der Krankheiten in den britischen Feldlazaretten Altenb. 1766. in 8. p. 185.

malum mortem secum adduxit, sectio deinde instituta renes inflammatos, inque eorum substantia tubercula purulenta & inferiorem partem renis sinistri sphacelatam, duabusque vel tribus vnciis nigri ac fœtidi liquoris oppletam demonstrauit. IDEM adcuratus obseruator 1) bolos ex camphora & sale volatili C. C. & singulis vesperis dosin tinturæ cantharidum per 14 dies sumtam contra ischuriam & renum dolores nihil valuisse perhibet; at idem notat, malum hoc inexpugnabile quodammodo hæreditarium in illo casu fuisse. Ad mouendam diuresin ETTMÜLLERVS tinturam sequenti modo parari iubet: Rec. Cantharidum vnciam vnam dimidiā, salis tartari drachmas sex, irrorentur cum sufficiēte quantitate aquæ, & in forma pulvis dilutioris seponantur in loco tepido, identidem irrotationem continuando; si igitur per dies noctesque octo vel decem stererint, adsfundatur pulueri spiritus vni tar tarisatus & eliciatur tinctura, quæ propter coloris gratiam puluerre vermium cochinillæ, qui similiter species cantharidum, vel potius coleopterorum, sunt & egregie diuretici, tingi potest. FVL LERVS autem in *Pharm.* eam sequenti modo parat: Rec. Puluer. cantharidum semiunciam, spiritus nitri optimi vnciam vnam, digeras horis 24. addantur spiritus vni camphorati vnciæ tres, fiat digestio per aliquot dies, deinde filtratio 2). Cæterum vsui medico optime conuenire censemur illæ canthrides, quæ in frumento inuenta fuerunt; illos vero NEVMANNVS 3) ridet, qui canthrides aceti acerrimi feruentis vapore interemtas melioris esse usus, putant. Ad extrahendam tinturam WEDELIVS simplici spiritui vini plus utilitatis tribuit, quam rectificato. Magnam quoque opem præstant canthrides illis, qui difficultate vrinae laborant. RIEDLINVS in hoc morbo ex errore porrexit cantharidum drachmam dimidiā, quæ dosis nimia largis olei amygdalarum dulcium hausti-

1) l. c. p. 191. 2) Rieger l. c. p. 494. 3) Chym. med. dogmat. experim. Tom. III. P. I. C. I. §. 6. p. 4. edit. Kessel.



haustibus emendata, sanitatem reduxit. In calculo compacto & maiori quidem cantharidum usus noxious erit, si vero fabulum tantum & calculus iam comminutus ex vesica extrudi debeant id cantharidum vi perfici posse adserit STENTZEL 1). Lithontripticum ex cantharidibus preparauit TVLPIVS 2), quarum in locum HORATIVS AVGENIUS & GVIL. LAVREMBERGIVS millepedibus usi sunt 3). MARTINVS LISTER communi consilio cum collega D. BARWIKIO homini, qui aliquoties calculos a renibus excruecerat & ultimo paroxysmo dysuriam cum magna corporis iactatione atque anxietate per triduum passus fuerat, cum pene de illius salute desperatum esset, ita prescripsit: Rec. Cantharid. probe tostarum, tantum non crematarum serupulum semis, aquae spermatis ranarum libram unam, misce fiat haustus. Paucis horis elapsis vrinam ad quatuor minimum libras reddidit ægrotus, & una plurimos calculos & conualuit 4). IDEM inter medicamenta calculo maxime accommodata cantharidum cinerem refert 5). Gonorrhœæ virulentæ opposuerunt canthrides IAC. A MEEKREN, THOM. BARTHOLINV 6), FRID. HOFFMANN 7), qui earum adhibuit infusum vinosum, HERMANNVS 8), qui eas in substantia dedit, incipiens a dimidio grano, quam methodum & alii celebres medici non sine fruge fecuti sunt. MARTIN. LISTER 9) tintura, quam etiam ingrediebantur canthrides, go-

nor-

1) Diss. cit. p. 40. ut & in Diss. de cantharidum & similium medicamentorum calculis compactis atterendis minus parium virtute Vitemb. 1741. p. 36. seqq. 2) vid. Neumann l. c. p. 15. 3) Schulze Diss. dari medicamenta, quæ calculum in vesica immuinuant. 4) Dissertat. medicinal. de calculo humano Londin. 1696. in 4. ægrotus VIII. p. 28. 5) Diss. alleg. p. 40. 6) Histor. anatom. Cent. V. observ. 82. Stentzel Diss. alleg. de cantharid. calcul. compact. &c. §. XI. XII. 7) Pharmac. medic. chym lib. V. sect. 4. §. 70. 8) Cynosur. mat. med. P. II. titul. canthrides. 9) Exercit. medic. p. 83.

norrhœam sanavit, quod etiam perfecit GEORG. HANNÆVS 1). RICHARDVS MEAD sequentem tinteturam contra gonorrhœam habitualem confecit: Rec. Rhabarb. drachmas tres, gummi guaiaci sesquidrachmam, lacce drachmam vnam, cantharidum contusarum drachmas duas, coccinellæ semidrachmam, infunde spiritus vini rectificati sesquilibram & cola. Huius tinteturæ guttas 30-50 mane & ante decubitum propinavit, & eam efficacissimam semper expertus est 2). In collectaneis chymicis Leydensibus 3) nephriticum & lithontripticum exhibetur remedium, quod simul gonorrhœæ, podagræ, arthritidi vagæ & ictero medetur: Rec. Cantharidum vnicam vnam, adfunde spiritus nitri fortissimi vncias duas, digerantur simul per horas 24, tum superfunde spiritus viñi vncias sex, digerantur, quo diutius, eo melius, postea filtratus liquor ad vsum reseruetur. Illustris b. WERLHOF ad exstirpandam gonorrhœam pertinacem cantharidas feliciter in auxilium vocauit 4) ASTRVC vero vel minimam cantharidum sive in substantia sive in insufo interne adhibitarum dosin non tam infidum, quam aperte perniciosum pronuntiat remedium 5). A cantharidibus miserum exspectabunt solatum, qui vixerunt puellis nuper idonei, quorum vero vires sunt iam exhaustæ ac prostratae; Tristes enim sunt cantharidum veneris irritandæ caussa sumtarnm effectus 6). Si morsulis Papenheimianis adduntur cantharides, membra conulsionem mihiunque cruentum producent 7). Interim si corpori non efferto, sed ob seri & viscidæ pituitæ aut gelatinæ abundantiam languenti cantharides caute offerantur, præmissis iis, quibus primæ viae purgandæ sunt

C

1) Ephem. Nat. Cur. Dec. II. An. V. obs. 172. p. 349. 2) Monita & præcepta medica Lond. 1751. 8. p. 143. 3) p. 119. 4) Commerc. liter. noric. 1733. p. 347. 5) de morb. vener. p. 201. 6) Ephem. Nat. Cur. Dec. II. A. IX. Obs. 148. & X. append. p. 59. 7) Amman. in Irenico p. 134.



sunt medicamentis euacuantibus, e re venerea omnino erunt 1). DIOSCORIDES 2) morbos complures enumerat, quibus cantharides medentur: *vis ipsarum*, inquit *communis septica, exulceratoria, calefactoria, qua de causa medicamentis admiscantur, quibus carcinomat. lepre & impetigines feræ curantur; menses quoque carent pessimis emollientibus additæ.* Porro nonnulli cantharides antidotis admixtæ etiam hydropicis auxiliari prodiderunt; quippe quæ vrinas moueant. Alii ipſorum alas ac pedes iis, qui illas haſſerint pro antidoto esse tradidérunt. HIPPOCRATES feminis ad excitandum fluxum menstruum etiam commendauit quatuor cantharidas vino bibendas, & quidem capite pedibus alisque reiectis, quibus addidit pœonia grana nigra quinque, ſepia oua & Seminis apii parum 3). Rationem, cur HIPPOCRATES extremitates cantharidum, quas tamen DIOSCORIDES aliique pro antidoto habent, semper reiici iuſſerit, STENZELIVS 4) in eo sitam existimat, quod haec partes duriores & solidiores difficultius foluantur, & ſic haufſtæ, ſuaasperitate multa creare queant mala. In contumaci obſtructione lochiorum ac mensium, in partu difficulti & retentione ſecundinarum, boli ex tribus cantharidibus præparatis, trochiscorum e myrrha ſcrupulo dimidio, Seminis ammeos granis ſex & rob cynosbati q. f. compoſiti proſpero adiumento recentiori tempore fuerunt 5). PHIL. HOECHSTETTERVS 6) vterinam præfocationem cum menstruorum ſuppreſſione propinatis cantharidibus in potionē ex ſucco mercurialis cum eſſentia cinnamomi & elæosaccharo cardamomi cu- rauit.

1) Stenzel Diff. de Cantharidibus & ſimilibus, quæ aphrodiſiaca vocantur, medicamentis, veneri inimicis amicisque Vitemb. 1747. §. XI. p. 37. Eiusd. Diff. cit. de cantharid. calculi. compacti. atterend. minus parium virtutis §. X. p. 23. seqq. 2) Mat. med. lib. II c. LXV. p. 102. 3) De natura mulierum I II. p. m. 65. edit. Foesii Genev. 1657. in fol. 4) De cantharid. proſperæ aduersaque auctoribus valetudinis §. IX. p. 28. 5) Transact. Philosoph. abbr. Tom. V. P. I. p. 405. 6) Vid. Velſch. Hecat. II. obs. 72.

rauit. HIPPOCRATES in classe medicamentorum fœtui mortuo expellendo aptorum cantharidas etiam locauit 1). Idem in aqua inter cutem ex vasis effusa & stagnante euocanda vsus est cantharidibus 2), vbi nimirum nimia seri copia vasa relaxauit ac flaccida reddidit, & vbi viscera adhuc sunt integra, nulloque ulcere aut scirrho obfessa. GALENVS quidem duos commemorat casus, in quibus hydropis cura per cantharides, imprudenter nimirum adhibitas, infeliciter fuit tentata 3): at CAPIVACCIVS fœculo XVI. celebris, earum usum suusat 4), modo parua dosis, eaque aliis medicamentis temperata, exhibeat, præscripsit igitur unam cantharidem integrum cum scrupulo uno vel pulueris rutæ, vel spissæ, & aliquod pingue, ut iuris pinguis vncias quatuor vel sex, bibi simul iussit. KOENIGIVS in hydrope laudat puluerem ex cantharidum granis sex, oculorum cancerorum præparatorum, tartari vitriolati & salis ononis ana scrupulo uno compositum, cuius tercia pars dosis constitutæ; alii in eodem morbo decoctarum radicum diureticarum vncias quatuor, quibus admixta fuerunt semi-nisi lini drachmæ tres & due cantharides simul decoctæ & simul percolatae, propinquant 5). Nostro aeuo illuſtris b. WERLHOFIVS non modo alias morbos sed etiam hydropen cantharidum ope expulit 6). In ictero etiam cantharidum tritarum puluerem, albo vino dilutum & melle addito correctum adhibuit HIPPOCRATES in eo potissimum casu, si potus abusu longo nerui debiliores & succis rite subigentis impares redditi, maxime si icterus hyeme ingruat ac frigida humidaque aeris temperies partes corporis humani solidas relaxet, fluidasque viscidiores reddat. Vbi

C 2

obstru-

1) Oper. Tom. I. Sect. V. lib. I. de morbis mulierum p. 625. ed. Fœsi.

2) Oper. Sect. IV. de ratione victus in morb. acut. p. 406. 3) In com-

mentar. ad Hippocrat. librum de rat. viest. in morb. acut. Part. V. p.

116. 4) Pract. p. 688. 5) Wieri obſerv. med. p. 80. 6) Commere-

noric. an. 1733. p. 357.



obstrūctio vel humorum stagnantium congestio hepar eiusque in primis gibbosam partem occupauit, diuretica, ad quæ pertinent cantharides, sunt adhibenda 1). HIPPOCRATES 2) cantharidibus in puluerem redactis melle temperatis virtutem epilepsia ex temulentia & rigore hyemali ortæ curandæ adscribit. MERCVRIALIS iis addit radicem Pœoniæ ac viscum quernum, iisque cum cardamomo & melle in bolum redactis contra morbum comitialem utitur 3). Veteribus iam viscum quernum cum radice Pœoniæ specificum contra Epilepsiam remedium est visum, idque nouis etiam IOH. CALBATHII Angli & LOESEKII experimentis comprobatum. COLBATH peculiari tractatu qui Altenburgi in germanicum idioma translatus 1748. in 8. prodiit, hoc argumentum est prosecutus, & iubet viscum mense Decembri collectum furno leniter exsiccari & in vasis vitreis ad usum seruari. Singulis VI. horis visci in puluerem redacti semidrachmam cum syrupo pœoniæ exhibet, nec non potum ex vnciis LX. aquæ feruentis infusæ vnciis IV. contusi visci & manipulo uno florum pœoniæ compositum. LOESEKE singulis tribus horis pulueris huius visci semidrachmam & portum descriptum adhibuit die ac nocte, & epilepsiam in duabus hominibus adultis feliciter sanauit 4). Aegyptii teste ALPINO 5) cantharidibus tanquam antidoto pestiferum venenum restringunt per sudorem copiosissimum vel per vrinam, sumtis quatuor cantharidum capitibus & alis in puluerem redactis cum tribus vnciis aquæ endiuia. Egregius usus est cantharidum in morbo animalium rabidorum. CELSVS 6) ea quæ vrinam mouent, serpentum morsum sanare tradit. AVICENNA 7) cantharidas

cum

1) Fuchs. instit. med. lib. II. sect. V. cap. 26. 2) De intern. affect. p. 557.
Oper. 3) Vid Exc. Vogel in laud. Diff. §. VII. p. 29. 4) Vid. Lœcke Abhandlung der auserlesensten Arznei-Mittel p. 420. 5) De Med. Aegypt. lib. IV. cap. vlt. p. 321. 6) De Med. lib. V. cap. XXVII. n. 3. p. 310. edit. Almeloueen, in 12. 7) Lib. IV, sen. VI. Tract. IV, oper. pag. 501.

cum aliis ingredientibus trochiscorum forma datas in morsu canum rabidorum esse perutiles, testatur. Idem statuunt MATTHIOLVS 1), CARDANVS 2) & ZACVTVS LVSITANVS 3). Tarantulae ictum tribus quatuorue cantharidibus in potu datis sanari, ait EPIPHAN, FERDINANDVS 4). Refert SPIELENBERGIVS 5) in superiori Hungaria vltra fluuum Tibiscum Hungaros nouo laborare morbo, subiro ipsis intumescere collum, ingentem succedere calorem in capite, eundemque tandem totum corpus peruadere; eos, qui non statim opponant remedia, quarto die exstingui, morbum ipsum ad speciem hydrophobiae accedere, curam ita institui, ut sumantur pro vna vice decem cantharides in puluerem redacta, quo facta vel largum sudorem vel copiosum vrinæ fluxum excitari absque ullo dolore. Addit hic medicus Hungarus, Germanis aliisque nationibus hoc remedium, in tanta dosi vix esse imitandum, Hungaros vero earum regionum, quæ vltra Tibiscum sunt sitæ, durissima & solidæ esse naturæ, eosdemque, quod putent pedes cantharidum esse antidotum integras sine noxa deglutire 6). Laudatur etiam puluis cantharidum tanquam specificum morsus canis rabidi & hydrophobiae remedium; DEGNERVS scarabæis maialibus melle suffocatis & conditis eandem virtutem tribuit 7). WERLHOFIVS cantharidum vires salutiferas in morsu animalium rabidorum expertus est 8), qui vero cantharidibus solidis non fidit, sed mercurium ipsis admiscet, vulnus quoque, postquam cauterio actuali adustum vel saltum scarificatum fuit, inun-

C 3

git

- 1) In Praefat. ad libr. VI. Dioscoridis.
- 2) Oper. edit. Lugd. 1663. fol. Tom. VII cap. X. de venenis p. 336.
- 3) Lib. V. hist. II. quæst. 2.
- 4) Hist. LXXXI cap. II. quæst. 88.
- 5) Ephem Nat. Curios. Dec. I. ann. I. obser. 133. & schol. Sachsii ad hanc obseruationem p. 296, 297. in quo cantharidas, hydropi, ischariae, gonorrhœæ curandæ bene adhibitas, variis exemplis docetur.
- 6) Ephem. Nat. Cur. Dec. I. An. IX. & X. obs. 148. p. 323.
- 7) Act. Nat. Curios. Vol. VI. obs. XCII. p. 325.
- 8) Commerc. litt. phys. techn. A. 1733. p. 357.



git vnguento mercuriali, nempe vulgari Neapolitano, quod vero ea quantitate vulneri vicinisque partibus illinendum suadet, ut ptyalismus non excitetur, quotidie circiter mercurii scrupulum dimidium ad grana usque quindecim, interdum quarto quoouis die tantum mercurii drachmam vnam inungendam curat. Omni vesperi autem exhiberi iubet pilulas compositas ex pulueris cantharidum gr. I. mercurii dulcis gr. vno & dimidio (vel turpeth. mineral. gr. dimidio) camphor. scrupulo dimidio, mucilag. tragac. q. s. harumque usum per sex hebdomadas continuari. In hac formula camphoræ dosis arbitriam esse dicit, quum vel exigua cantharidum aerimoniam obtundat. Neminem eorum, qui post morsum rabidi animalis his usi fuerint remediis, in hydrophobiam incidisse adseuerat, imo & in vera hydrophobia forsitan a cantharidibus maiori dosi propinatis sperandum aliquid esse statuit. 1)

§. VI.

VSVS CANTHARIDVM EXTERNVS.

Cantharides non modo interne adhibentur sed etiam externe; imo longe frequentior & fere tutior earum externus est usus. In puluerem tritæ, fermento panis, terebinthinae ceræue, aut aliis rebus mixtæ & emplastræ forma cuticulæ impositæ vaporis & caloris animalis vim facile experiuntur, quo liberatae earum vires in vasa cutis capillaria reagunt, quæ irritatae constringuntur, inde fit largior humorum confluxus, tubuli quidam lymphatici rumpuntur, lympha effunditur, & hac ratione vesica eleuatur, qua incisa multum seri e corpore remouetur. Non autem hæc unica est cantharidum æstio, vt serum euacuent; altius enim corpus perudunt, ac ipsum sanguinem, æque ac intro sumtæ, imo totum nervorum & vasorum sistema 2) adficiunt. Veteribus incognita vel saltim non usurpata fuerunt vesicatoria. HIPPOCRATES nusquam

1) Excel. Vogel in Diss. supra laudata §. VIII, p. 30, seqq. 2) Huxham oper. Tom. II. p. 115.

quam eorum meminit. Primus ea adhibuit ARETAEVS, GALENO fere aequalis, ut & ARCHIGENES, ARETAEO secta atque aetate coniunctus. GALENVS etiam emplastra ex cantharidibus confecta utilitatem praeflare dixit, earum vim autem, tanquam periculo plenam, raro tentauit; eadem sententiam amplexi sunt sequentes Graeci & Arabes. Apud latinos CELSVS 1) earum purgatarum usum in papulis curandis commendat, & PLINIVS 2) iis lepras, lichenas curari, telaque extrahi posse scripsit. Post renatas litteras adhuc raro ac timide ab hoc medicamento auxilium petierunt FERNELIVS & HOLLERIVS; imo ea aetate circa a. 1560. florens ADOLPHVS OCCO cantharidas in pera gestari vertuit, hac lepida inductus ratione, quod quidam eas forte portans mihi eruentum expertus fuerit. Subsequenti saeculo XVII. hic timor cantharidum adhuc multos infedit, BANZERVVM, ETTMVL-
LERVM, SENNERTVM aliasque. Apud Italos autem peste a. 1575. & 76. Patauii ac Venetiis grassante HIERONYMVS MER-
CVRIALIS maximis in hac calamitate expellenda laudibus vesicantia extulit, breui post autem a. 1590 peste Pisauri furente ac Vribinarium Duce Patauinios medicos de remediiis huie malo opponendis consulente, magna inter Doctores Patauinios ea de re contentiones sunt ortae HERCVLE SAXONIA cantharidum usum strenue propugnante, ALEXANDRO MASSARIA 3) qui cum Galeno maluit errare, quam cum iunioribus vera sentire, vehementer vesicantium usum damnante. SAXONIA autem tribus libris suam sententiam tam copiose tamque dilucide stabiliiuit, ut facile omnes, qui sunt infecuti, in suas partes pertraxerit 4)

§. VII.

- 1) Lib. V. c. XXVIII. n. XIIIX. p. 340. 2) L. supra cit. 3) Alex. Massarias de abusu vesicantium & Theriaca in febribus pestilentibus. Patav. 1591.
 4. 4) Freind Opera omnia medica Paris 1735. 4. de Febribus comment. IX. pag. 18. seqq.



§. VII.

DE VESICANTIVM NOXA.

FREIND quidem hanc euacandi viam id præ aliis commodi habere contendit, vt nunquam non tutissime in vsum duci queat 1); sed, vt iam supra monuimus, non omni corpori nec cuius morborum generi conueniunt. Infestæ enim sunt biliosis & hec[tic]is, nec non iis, quibus corpus sit plenius, nisi vena antea secta 2). BAGLIVIVS 3) acriter infestatur HELMONTIVM, quod is vestigiorum naturæ aut oblitus aut contemtor contra vsum vesicantium disputauerit, attamen ipse ab vsu vesicantium caueri iubet, vbi suspicio conuulsionum adeat, in vulneribus capitis, in febribus ardentibus & continuis, in quibus iam sanguis magno impetu agitatur, in constitutione anni calida & sicca, inque similibus temperamentis, in adfe[ct]ibus neruosis cum febre ad ardente[m] inclinante, in adfe[ct]ibus comatosis febrium, quæ accedunt ad ardentes, in morbis pectoris spasmodicis, inflammatoriis & a salina acri constitutione sanguinis productis 4). FABRICIVS AB AQVAPENDENTE vt & HILDANVS casus obseruarunt, quibus vesicatoriorum impositio vrinam suppressit, quum nimia vrinæ secretæ copia vesicam ita distenderet, vt eius vim excreticem simul plane resolueret 5). In fluxionibus oculorum hæmorrhagias produxerunt vesicatoria 6); eorumdem noxias vires in Ophthalmia animadueterunt PLATNER 7) & LAZERME 8). Illuстр. VAN SWIETEN 9) vesicatoriorum in pleuritide lateri dolenti impositorum noxam variis in casibus notauit. HVXHAM 10) iis vt prohibet in febribus ardentibus & inflammatoriis, in febribus putridis malignis petechia-


libus,

- 1) L. c. p. 63*. 2) Freind l. c. p. 62. 3) In præf. diss. VII. de vsu & abusu vesicantium. Oper. p. 645. 4) Diss. cit. §. XI. p. 652. 5) Rieger Introduc[t]. Tom. II. p. 475. 6) Ephem. N. C. Dec. II. A. VII. n. 86. 7) Chirurg. §. 328. 8) Curationes morborum. Monspelii 1750. 12. Tom. I. p. 27. 9) Comment. in Boerhaue aphor. Tom. III. p. 48. 10) Oper. Tom. II. p. 23. & 115.

libus, saltim in earum principio, quum sanguinis motus iamdum incitatus nullo indigeat stimulo, quia potius addito stimulo perniciens euadat, & pertinax peruigilium, delirium, vrinæ suppressionem, tremores, subsultus aliamque malorum cateruam fecum ferat. Celeb. quoque TRALLE^S 1) in variolis, febri accidente putrida cantharidum emplastra reiicit. Illustr. BÜCHNER, *Natura Curiosorum Praeses ac dulce decus, Cuius celebratissimum nomen maximum meritorum in rem medicam, physicam ac litterariam cumulum complectitur, Quem perpetuo cultu, summis beneficiis obstrictissimus veneror, solidis ex rationibus eas enumerat conditiones, in quibus noxios vesicatoria effectus exserunt 2); nempe primo in morbis, qui dicuntur calidi, quibus a sanguinis phlogosi oriundis multum periculi a cantharidibus irritantibus sanguinisque circulum intendentibus imminet, ut in apoplexia sanguinea aliisque morbis sanguineis. Hinc pleuritis vera generatim considerata (aliud enim nonnunquam singulares conditiones suadent) vesicantia parti dolenti adplicanda respuit, quum iis origo mali augeatur, nec minus cephalalgiae, rheumatismo & arthritidi ex eadem, ac inflammatio, caufa profectis vel ab eadem pendentibus officiunt 3). Secundo in hæmorrhagiis aut a mobilitate sanguinis, aut ab eius resolute-
ne, aut ab impetu fortiori productis; vesicatoria quidem deriuant ac reuellunt & sic in hæmorrhagiis non obesse videntur, sed tam-
en simul sanguinem resoluendo ac cor cum vasis irritando hæ-
morrhagiarum cauſas augent, ac proinde grauioribus molimini-
bus hæmorrhagicis semper contraindicantur. Tertio in diathesi
sanguinis inflammatoria, quia noxia tunc sunt, quæcunque circulum
sanguinis intendunt. A virtute cantharidum resoluente heic pa-*

D rum

1) Vid. comment. Lips. de rebus in scient. natur. ac medicin. gestis Vol. X. p. 512. 2) Diss. de vesicatoriorum parti dolenti applicatorum vsu salubri & nocivo Hal. 1766 §. V. Eiusdem fundamenta therap. gene-
ral. fest. II. cap. X. 3) Laud. Diss. §. X. & XV.



rum spei atque solatii superest, quum opium & calor eadem vi
gaudeant & nihilominus diathesin sanguinis inflammatoriam au-
gere soleant, & quum sepius soluendo sanguinem, aquosa humo-
rum materies, cuius parcior in inflammationis grauioribus co-
pia adest, plane uehatur, ac proinde residui humores eo magis
condenserunt & eo facilius inflamentur. Imo stasis inflamma-
toria in vasis arteriosis enata moueri non potest, nisi vasa nimis
constricta relaxentur, quod vero a cantharidibus, quæ plane con-
trarium edunt effectum exspectari minime poterit; cantharides
denique sanguinem resoluunt & eundem ad putredinem dispo-
nunt. *Quarto* in spasmis ab irritabilitate aut sensibilitate nimia,
a sanguinis commotione, stasi sanguinea & stimulo, quem elimina-
re non possunt, enatis; cantharides enim has spasmorum caussas
augent & sic mala ipsa non mitigant, sed longe acerbiora reddunt.

§. VIII.

DE EORUNDREM VSV IN GENERE.

Tum demum tatus ac saluberrimus erit vesicantium usus, au^tore BÜCHNERO *laude nostra maiori* ¹⁾ quum primo vires vitae vere
languentes sunt excitandæ, illæ enim maxime ad sensibilitatem ac
irritabilitatem redeunt, ac proinde vesicatoriis magis acuuntur, quod
præcipue fit in morbis exanthematicis, quum vires in extrudendis
exanthematibus languere incipiunt. *Secundo* ubi lento frigidus
corpus occupauit, qui a vesicatoriis dissoluitur, eorumque stimulo
robur additur vasis, vt nimis tenaces humorum particulas segregare
queant, quod auxiliū genus in casibus desperatis, in pertinacibus
viscerum obstructionibus, cachexia, suppressione mensium diuturna,
a sanguine crasso, coagulato & alicubi impedito, permultum
valer. *Tertio* vesicatoria mira sunt utilitatis in congestionibus fri-
gidis, stasi frigida & mucosa & effectibus inde productis, tum enim
reuellunt, soluunt, discutiunt atque eliminant. *Denique* in spasmis
a caus-

¹⁾ Ibid. §. VI.

a cauſſa frigida, ſero acri & ſtimulo ob languidam vim vitæ reten-
to. Doloribus compelendis vel eorum effectibus mitigandis aut
auertendis commode veficatoria adhiberi poſſunt 1): quum dolor
a coaceruata frigida materia oritur, quumque eadem materia magis
condenſatur, obſtruſionem prodiſit ac partes dolentes replet, vel
quum acris materia partes ea ratione irritat, vt eius tam deriu-
atio, quam eliminatio veficatorii ope obtineri queat. Quum vero
dolor vel a cauſſa calida, vel a fraſtis, luxatis, carioſis oſſibus pro-
ducitur, veficatoriis vel magis irritabitur, vel faltem eorum vim eludet.
Effectus autem dolorum infringent veficatoria, cauſſam doloris & ſic iſum dolorem tollendo, cauſſam noui doloris ex pri-
ore generandi per deriuationem & eliminationem præſcindendo,
labefactatas dolore vires eriendo, ac vifcidam materiam a dolore
non raro contractam ſoluendo & eliminando.

§. IX.

CONSIDERATIO SPECIALIS MORBORVM, QUIBUS CONVENIVNT CANTHARIDES.

In febribus putridis, malignis, petechialibus natura noniunquam
incitamento indiget, quod in earum declinatione fieri ſolet, quum ſoli-
da torpent, circulatio languescit, ſpiritus ſunt effeti, & comate æger
corripitur, tunc quoconque febris tempore talia ingruunt sympto-
mata, veficatoria ſunt applicanda 2), eaque cum ſucceffu adhibuit
*Venerabilis Facultatis noſtre Decanus Excellentissimus D. NVNN, Pa-
tronus maxime colendus*, qui, pro ea, qua in nos viuit humanita-
te, nobis aperuit, ſe veficatoriorum vtilitatem variis in caſibus in
febribus putridis malignis præcipue circa finem earundem, vbi vis
vitalis decreuerat, nec vlla excretio perfici, nec ob defectum viri-
um ad certam partem determinari poterat, expertum eſſe. In fe-
bribus putridis caſtrenſibus, quarum naturam cauſſasque adequa-
te deſcribit acutissimus BALDINGER 3), Fautor atque amicus no-

D 2

ſter

1) ibid. §. VII. VIII. 2) Freind l. c. Huxham Oper. Tom. II. p. 115. 3) Diff.
de millitum morbis. Vitemb. 1763. §. X.



ster astutissimus, vesicatoriorum usus est eximius, testibus laudato BALDINGERO & PRINGLE 1), & in febribus lenti ac neruosis euacuatio humorum cum salute ægroti a vesicatoriis perficitur. His nimis febribus conueniunt temperantia, cardiaca, diaphoretica, bene ordinata nutriendis ac diluens diaeta, in primis iusto tempore applicata & non nimis cito exsiccanda vesicatoria 2). Euacuationem ac deriuationem humorum & miasmatis salubriter per vesicatoria institui in febribus quæ coniunctæ sunt cum variis exanthematibus, morbillis, variolis, petechiis, purpura & efflorescentiis scarlatinis docuit Illustris BÜCHNER 3). In febribus scarlatinis erysipelate, nec non in epidemicis vesicatoria laudat FREIND 4) & MONRO 5) qui ea in hisce febribus ut & in intermitente auctumnali tergo imponit 6). In variolis epispastica metacarpo & pedum condilis paulo ante quam tumoris ipsius ad has partes accessus expellatur, applicari iubet HVXHAM 7), quum in aliis quoque casibus periculosis vesicatoria plantis pedum imponi soleant, quibus etiam delirium, quod variolarum comitatur eruptio nem, insigniter leuatur 8). In variolis epidemicis anomalis nuchæ applicata vesicatoria summos colli dolores & deglutiendo difficultatem leniunt; etiam brachiis cruribusque imposita admodum sunt vtilia, modo variolis laborantes largiter tenue serum lactis, quod in genere cantharidum in adsestibus acutis adhibitarum nimiam coercet acrimoniam, bibant 9). In febribus inflammatoriis vesicatoria noxia esse, supra diximus, & hinc nec in pleuritide nec in peripneumonia sunt adhibenda, nisi instans vitæ periculum ea exigat, ob nimiam copiam materiae gelatinosa & viscidæ, cui eliminandæ vires naturales sufficere non videntur, vel quum vires sunt

pro-


1) Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee p. 230. 307. 308. 297. 299. 2) Huxh. ibid. p. 81. & 91. 3) In Diss. de Vesicatoriorum ad exanthemata a nobilioribus partibus auocanda efficaci usu. Hal. 1758. § XII. XIX. XX. 4) L. c p. 63. 5) Lib. cit. p. 201. & p. 115. 6) p. 143. 7) Op. Tom. II. p. 142. 8) Id. Tom. III. p. 26. 9) id. p. 24, 26.

prostratae a grauitate inflammationis, quæ in peripneumoniam transit, vel a putrido statu, a vasorum inertia, a materia pulmones opplenente, a venæsectione nimis frequenti 1). PRINGLE vesicatoria in pleuride maxime commendat 2), eaque parti dolenti imponi iubet, vt obſtructionem febrimque tollant, quum alio loco imposta stimulare morbumque augere possint, quemadmodum & veteribus in more fuit positum vesicas in parte dolente excitare 3), finapismis nempe, quorum in locum cantharides successere. Maturè autem & statim a prima venæsectione vesicatoria palmi magnitudine lateri imponit laudatus PRINGLE, qui multis in casibus ea re eo celeriorem ægrotis opem attulit, & venæsectionem repetiit, nisi copiosus sudor dolores ita minuat, vt aliis remediis superfedeli commode possit. Peripneumoniæ tardius curantur vesicatoriis quam pleuritides, quum vesicatoria non tam directe in pulmones, quam in pleuram agere queant, interim tamen PRINGLE, etiam heic vesicatoriis post venæsectionem quam maxime fidit, eandemque methodum in phrenitide & hepatitide commendat 4); in febribus autem inflammatoriis in genere duas distinguit periodos, in quarum prima pulsus est durus & venæſectione conuenit, in altera symptomata inflammatoria quidem adhuc adsunt, pulsus vero ad hanc euacuationem non est satis validus, & tunc vesicatoria optimum præstant auxilium 5). Idem confirmat MONRO 6), INTERPRES *anonymous Tiffotii* 7) & MEDICVS 8). In peripneumonia norba vesicatoria non esse negligenda HVXHAM præcipit 9), quia cruribus aut femoribus imposita capiti & pectori leuamen adferant. Quum in febribus malignis & carum summo gradu ad

D 3

finem

1) Illustris Büchner Diff. de vesicat. parti dolenti applicat. §. XII. XIII. 2) Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee p. 162. seqq. 3) Celsus lib. IV. cap. III. 4) L. c. p. 155. 168. 5) p. 150. 6) L. c. p. 93. & 101. 7) in editione Lugdunensi p. 72. vid. Commentar. Lips. Vol. XII. p. 558. 8) Erfahrungen Tom. III. p. 509. 511. 576. 578. 9) Oper. Tom. II. p. 208.



finem vsque, imo nonnunquam diutius surditie accesserit; eidem medentur vesicatoria pone aures vel ceruici imposita 1), nec minus profunt in singultu ab exanthematibus retropulsis suborto, ad materiam acrem a nervis phrenicis ad sua loca reuocandam 2). In aliis quoque inflammationibus opem ferunt cantharides externe adhibite. Sic ventriculi & intestinorum in primis ilei regioni post venæctionem imposta vesicatoria dolores leniunt siue ex inflammatione, siue ex flatibus ortos 3). Nec non in angina maligna 4), quando colli, parotidum, ceterarumque glandularum tumor insignis accedit, ut pene suffocationem minetur 5).

§. X.

VSVS VESICATORIVM IN VARIIS INVETERATIS PRAECIPVE MORBIS.

Eradicandis etiam aliis morbis & vitiis præcipue inueteratis inseruant. Morbis cutaneis in genere, præfertim scabiei, imperiginis vesicatoria opposuit GALENVS, licheni, lepre PLINIVS 6), malo in primis ischiadico HOLLERIVS 7), RIEDLINVS, BOER-HAAVIVS, TRALLES, TISSOT, MEDICVS 8), PRINGLE 9), podagrae HOLLERIVS, FREINDIVS 10) rheumatismo HOFF-MANNVS 11) MONRO 12), arthritidi RIVERIVS 13), nerorum resolutioni ARCHIGENES, hydropi & cœcitati FERNELIVS, hemicrania HOLLERIVS, morsui canis rabidi, FREIND 14). Illustr. NVNN nobis beneuole tradidit, se cum vulnus morsu canis rabidi sub tendine Achillis vtroque latere inflatum sicutum esset & sensu carens; nec suppuratione sequeretur, sed potius pars læsa corrumpi inciperet, duas partes vnguenti mercurialis cum una parte vnguenti

- 1) Monro l. c. p. 33. 2) Hoffmann med. ration. syst. Tom. IV. Part. III. c. IV. §. V. p. 367. edit in 4. 3) Pringle l. c. p. 168. 4) Monro l. c. p. 92. Pringle p. 152. Medicus Tom. III. p. 502. 5) Huxham Tom. III. p. 124. 6) vid. Freind l. c. p. 13. 61. 7) id. p. 59. 8) Illustr. Büchner Diff. cit. §. 12. 9) l. c. p. 177. 10) l. c. p. 59. 63. 11) med. rat. syst. Tom. IV. p. II. Sect. II. cap. VIII. p. 448. 12) l. c. p. 121. 13) Ill. Büchner l. c. §. 11. 14) l. c. p. 61.

guenti ægyptiaci præscripsisse, & optimo euentu statim suppurationem, cumque conuenientibus remediis interuis ipsam febrim aliaque incommoda viciisse. Lumbricis, destillationi, grauedini, neruorum distentioni, pustulis omnis generis FREINDIVS 1), cephalalgia a sero viscidio ortæ HOLLERIVS, WEPFERVS, RIVERIVS, HOFFMANNVS 2), MEDICVS 3) lethargo HOLLERIVS, MEDICVS 4), epilepsia ARETAEV 5), HOFFMANNVS 6) VAN SWIETEN 7) MONRO 8), ophthalmia & epiphora PRINGLE, 9) PLATNER 10), HOFFMANN 11), dysenterie PRINGLE 12) MONRO 13), asthmati, HEISTER 14), asthmati conulsiuo a materia peregrina in corpore remanente HOFFMANN 15), tumori- bus œdematosis tam pedum, quam totius corporis MONRO 16) nec non Experientissimus NVNN qui in tumore œdematoſo vniuersali multis vesicatoriis, variis successiue partibus impositis opem ægrotis attulit. Paralyſi MONRO 17), incontinentia vrinæ & paralyſi extremitatum inferiorum THOMAS DICKSON 18), licet MONRO 19) vesicatoria ossi sacro sine leuamine incontinentiæ vrinæ imposuerit, catarrho suffocatio ex morbillis prodire cessantibus superuenienti HOFFMANN 20), apoplexiæ ex cachexia humorum TISSOT 21). Exclusioni fœtus etiam conducunt 22). Quis igitur cantharidibus caute adhibitis maximum in medicina vſum firmis rationibus & experientiis a tot tantisque auctoribus stabilitum in dubium vocabit?

Progredior nunc ad id, cuius occasione hanc qualemcumque commentationem elucubraui: **EMINENTISSIMVS ACC CELSISSIMVS PRINCEPS**


AC

- 1) l. c. § 8. 61. 63. 2) Med. rat. Tom. IV. P. II Sect. II. cap. I. §. VI p. 198.
- 3) l. c. p. 636. 4) l. c. p. 361. 393. 5) Freind l. c. p. 58. 6) Tom. IV P. III. cap. I. §. 11. p. 22. 7) Comment. Tom. III. p. 448. 8) l. c. p. 195. 9)
- l. c. p. 157. 10) Chirurg. §. 322. 11) Med. rat. Tom IV. P. IV. cap. v. Curat. §. III. p. 137. 12) l. c. p. 264. 13) l. c. p. 78. 14) Pracktisch med. Handbuch cap. XII. §. 8. p. 296. 15) Med. rat. Tom. IV. P. III. Obseru. 1. p. 288. 16) l. c. p. 43. 44. 17) l. c. p. 180. 18) vid. Com. ment. Lips. Vol XII. p. 461. 467. 19) l. p. 185. 20) Tom. IV. P. I. Sect. I. cap. VIII. obseru. VII. epicris. p. 200. 21) Epist. de Variol. Apoplex, & Hydr. p. 125. 22) Freind. l. c. p. 61.



AC DOMINVS. DOMINVS EMMERICVS IOSEPHVS, s. Sedis Moguntina Archiepiscopus, S. Rom. Imp. per Germaniam Archicancellarius & Princeps Elector, Dominus noster longe clementissimus, pro summa qua eos, qui litteras colunt, iisque communem promouere student utilitatem, souet indulgentia, me Professoris Medicinae Publici extraordinarii munere fungi iussit, eoque summo beneficio me ad submississimas gratias habendas, ad pia vota pro salute **TANTI PRINCIPIS** concipienda, atque ad ea, qua muneris demandati partes exigunt, rite ac sedulo curanda obstrinxit. Supplex igitur adoro immortale Numen ac precor, **PATREM PATRIAE CLEMENTISSIMVM** summa quavis felicitate, faustissimo regimine, valetudinis optima inconcusso ac maxime longeuo labore gaudere velit, quo sub **EIVS** indulgentissimo moderamine res publica ac litteraria qua maximum **EVM** statorem, Tutorem ac Benefactorem quotidie experitur ac submississime veneratur, de sua felicitate sibi quam diutissime congratuletur ac floreat latissime. Pias etiam fundo preces pro salute **REVERENDISSIMI AC ILLVSTRISSIMI DOMINI, DOMINI CAROLI JOSEPHI ADAMI,**
S. R. I. LIBERI BARONIS A BREIDBACH IN BÜRRESHEIM, Eccles. Metrop. Mog. & Equestris S. Albani prope Moguntiam, ut & Insignis collegiatæ ad S. Victorem Canonici Capitularis, Eminentissimi ac Celsissimi Archiepiscopi & Principis Electoris Moguntini & Celsissimi Principis Episcopi Würceburgensis consiliarii intimi. Virbis ac Territorii Erfurtensis Proprietatis, Domini ac Mæcenatis nostri indulgentissimi. Quem dono diuino sibi datum merito maximis effert laudibus, summoque cultu prosequitur ciuitas atque Academia Erfurtensis, quum nobile **EIVS** peccus unico teneatur boni publici prouehendi studio, quumque in primis res academicæ **TANTI MAECENATIS** praesidio aucta latior indies efflorescat. HVNC omni honorum genere cumulet Nomen, HVIVS saluberrima instituta fortunato successu bee, HVIVS mentem corpusque tueatur, vitamque omnibus pretiosam ad summum ætatis ac felicitatis fastigium dедакat.

Muneris mei ratio a me postulat, medicas aperire scholas, ac in tradenda hac arte saluberrima indefessam desigere operam, cui officio ut satisfaciām VOBIS, Domini Commititones Doctissimi ac estimatisimi prælectores publicas in celeb. Gerhardi Materiam medicam, que Berol. 1766. in s. in lucem prodidit priuatas vero in Illistr. Halleri primas lineas Physiologiz, alias medicinæ partes offero, horatrum electionem vestro arbitrio relinquens, utque vefra si equentia animum vestris commodis paratissimum significandi mihi præbeat is occasionem etiam atque etiam peto. Dabam Erfordiae d. XV. Nouembris a. MDCCCLXVII.



KONT
PICA

DE
CANTHARIDIBVS

EARVMQVE
TAM INTERNO, QVAM EXTERNO
IN MEDICINA VSV
DISSERIT

AC
AD AVDIENDAS PRAELECTIONES

ME

NOBILISSIMOS DON

OFFICIO

LVDOV. FRIDE

MED. DOCT. ET PROF. PVBL.

CVRIOS. SOCIVS AC BIBL

MOGVNT. SC

ERFORDIAE, LITERIS H

