



M. 169

DR. GVALTH, VAN DOEVEREN,
MEDICIN. IN ACADEM. BATAVA, QVAE
LEIDAE EST, PROFESSORIS,
PRIMAE LINEAE

DE
COGNOSCENDIS MVLIERVVM MORBIS
IN
VSVS ACADEMICOS.

RECVDI CVRAVIT

D. IOANN. CHRISTIAN
TRAVGOTT SCHLEGEL,
MEDICVS APVD LONGOSALISSENSIS:

L I P S I A E,
APVD CAROL. FRIDER. SCHNEIDER,

CLCCLXXXVI.

DE. O. N. T. H. W. A. D. O. V. E. R. T. E. N.

STUDIIUM IN OECUMENICO
SOCIETATE PROFESSORUM

PRIMA LIBRA

DE

CONCORDIA MENTIS

IN

VERBIS REVERENDI

THEOLOGICI

DR. JOHANNES CHRISTIANUS

THEOLOGICUS

RECTOR UNIVERSITATIS

1773

HAERLENI

CHRISTIANUS



VIRO
EXCELLENTISSIMO,
CHRIST. FRIDERICO
DANIEL,
MEDICINAE DOCTORI
CELEBERRIMO,
CONDITORI
SYSTEMATIS AEGRITVDINVM
SAGACISSIMO,
MEDICO FELICISSIMO, AMICO
EXOPTATISSIMO
OBSERVANTIAM atque AMICITIAM
PVBLICE TESTARI VOLVIT
IOANN, CHRIST, TRAVG, SCHLEGEL,

VIRG
EXCEP
CHRIST. FRIDERICO
IN A
REVOCAT
CELESTINO
COMPTON
S
MEDIC
EXCEP
CELESTINO
S
S

LECTORI AEQVO

S. P.

Dr. SCHLEGEL.

Lineas has primas, de cognoscendis mulierum morbis, quas, beatæ atque immortalis memoriae Doctor ille ac Professor Medicinæ Batavus, CELEBERR. VAN DOEVEREN ante decem annos in vsus academicos solertissime accuratissimeque duxit, et publici iuris fecit, praelectionibus de his morbis, in academiis habendis, prae ceteris omnino esse aptissimas, nec vllus, qui hanc doctrinam callet, inficias ivit.

Haud inutilem itaque operam me suscepisse existimo primarum illarum linearum, editione euulgatarum hac nova, a me curata. Anno MDCCLXXV. Lugduni Batauorum typis exscriptum

A 3

opus-

opusculum, etiamsi mole paruum at-
que adspectu leve, attamen materia,
quam hic pertractatam videas, ponde-
rosam, in bibliopolia Germaniae mi-
nus frequens translatum erat, quin a
nostratibus, et praecipue ab artis saluta-
ris studiosis, per saepe frustra deside-
raretur. Iis ergo in gratiam factum
est, ut iam existet libellus in Germania,
et quidem idiomate latino, quo fuerat
conscriptus.

Non est denique, ut opusculum id,
quod hic denuo sub prelo prodiit, su-
peruacaneis meis ornaretur commen-
tationibus. Nostrum vero erit, ut tam
praeclara eruditionis medicae documen-
ta, ab haud paucis perstudiose quaesita,
atque spe non raro falsa desiderata, porro
exquiramus, prelo iterum subiiciamus,
et hoc consilio non frustra commodis
aliorum inservire videamur. Scripsit. Lon-
gofaliffae, d. VI. April, MDCCLXXXV.

AU-

AUDITORIBUS SUIS

S. P. D.

AUCTOR.

Momentosam Doctrinae Medicae partem de Mulierum Morbis cum Vobis in Praelectionibus Academicis exponere statuissem, nullum inveni Librum, cujus normam in docendo commode sequi possem: facile enim videbam, plerosque Medicos vix satis adducere illarum causarum, quas suppeditat Ars obstetricia, genuinus ille et uberrimus cognitionis muliebrium morborum fons; atque Artis obstetriciae Scriptores vix tam apto. & concinno ordine illos morbos exponere, qualis mihi arrideret. Solent praeterea etiam sua cuique prae ceteris placere. Conscripsi itaque, et in Praelectionibus calamo excipiendas recitavi, Primas hasce Lineas, quae docenti atque discentibus melius inserviturae mihi videbantur. Expertus vero, quantum sic temporis

A 4

fiat

SIUS 2 UEROTIQUA

fiat dispendium, prospiciensque errores,
qui transcribendo in huncce textum pos-
sint irrepere, ut evitarem has difficul-
tates, utque eo melius vestris commo-
dis consulerem, in animum induxi, ty-
pis descriptum eum exhibere, elaborati-
us forsitan in posterum in lucem proditu-
rum. Quod ut tanto cum vestrorum
studiorum emolumento, quantum mihi
equidem proposui, fiat, vehementer ex-
opto. Valete! Scribebam Lugduni Bat.
d. 15. Sept. 1775.

IN.

I N D E X

C A P I T U M.

C A P. I. §. I.

De Morbis Mulierum in genere.

C A P. II. §. XV.

De Morbis Virginum.

C A P. III. §. XXV.

De Morbis Mulierum Nuptarum.

C A P. IV. §. XXVII.

De Morbis Gravidarum.

C A P. V. §. XLVII.

De Morbis Parturientium.

C A P. VI. §. LXXXIV.

De Morbis Puerperarum.

C A P. VII. §. CV.

De Morbis Lactantium.

C A P. VIII. §. CXVIII.

De Morbis Effoetarum seu Vetularum.



PRIMAE LINEAE
DE
COGNOSCENDIS MULIERUM MORBIS.

CAPUT PRIMUM.
De Morbis Mulierum in genere.

§. I.

Morbi Mulierum, ut recte intelligantur, dividi debent in duas classes, quarum prima complectitur *Universales*, vel communes, qui, licet etiam in sexu masculino contingant, omnibus tamen Feminis, quovis fere vitae tempore, ex sua natura et corporis habitu, potius quam Viris accidere solent; altera continet *Particulares*, vel proprios, quibus certae Feminarum aetates, et varia vitae stadia, eorumque munia magis obnoxia sunt.

§. II. *Universales* Feminarum morbi plerique tales sunt, ut iidem, vel saltem illis similes, in Viris quoque aliquando occurrant;
non

DE MORBIS MULIERUM. II

non vero, ob corporis eorum constitutionem, tam frequenter hos, quam sexum sequiorem, affligere observentur: quare eatenus quoque inter Mulierum morbos tractandi videntur.

§. III. Quoniam vero horum omnium expositio universae fere Pathologiae et Praeaeos ambitum complecti deberet; breviter tantummodo primarios illorum fontes indicabimus, et Primas hasce Lineas praecipue accommodabimus explicationi Morborum Mulierum, qui Particulares vocantur.

§. IV. Universales itaque Morbi mulieribus derivandi sunt, 1°. Ex totius corporis Feminarum compage minus firma, laxiore, et debiliore, quam Virorum, indeque pendente illarum temperamento phlegmatico, vel ad summum (paucis robustioribus exceptis) sanguineo: unde, ceteris paribus, procliviores sunt in singulos morbos, qui ex pituita nimia, et lymphae aut feri colluvie, vel et sanguinis abundantia, cacochymia motuumque vitiiis, oriuntur; v. g. leucophlegmaticos, chloroticos, hydropicos; obstructiones frigidas, viscidas; congestiones; haemorrhagias; harumque effectus multiplices,

§. V.

§. V. 2°. Ex majore sensibilitate et tene-
ritudine partium solidarum irritabilium et sen-
tientium, id est fibrarum motricium et sy-
stematis nervosi: unde fieri solet, ut corpo-
ris et animi commotionibus, perturbationi-
bus, spasimis, convulsionibus, et inde oriun-
dis effectibus, sint longe magis obnoxiae; v. g. passioni hystericae, epilepsiae, simili-
busque malis: quo forte haud immerito ipse
Cancer revocari potest.

§. VI. 3°. Ex mirabili consensu, quem in
variis vitae stadiis, eorumque muniis, cum
vicinis non tantum, sed et cum remotiori-
bus partibus habet Uterus, inde sexcento-
rum morborum fons apud Hippocratem jam
vocatus.

§. VII. 4°. Ex Animi plerarumque Fe-
minarum sensibilitate nimia: neque enim alie-
num a vero videtur, huc ipsam quoque hu-
jus agilitatem et vivacitatem majorem revo-
cari debere, quae corporeae praedispositio-
ni superaccedens, in quam plurimis frequen-
tiam morborum, ex nimia sensibilitate, irrita-
bilitate, et nervorum affectione pendentium,
summopere auget.

§. VIII. 5°. Ex diverso corporis Femi-
narum mechanismo, ratione imprimis Parti-
um

tim generationi inservientium: quo spectant praecipue sterilitatis variae species; hydrops ovarii et uteri; affectiones nonnullae venereae; atresiae diversae; uteri et vaginae scirrhii, carcinomata, sarcomata, herniae, descensus, prolapsus, aliaque mala.

§. IX. 6°. Ex diverso habitu aliarum nonnullarum partium, quae quidem minus a virilibus differunt, fabrica tamen sua magis minusve diversae sunt: huc pertinent Feminarum alvi frequens durities; herniae crurales, umbilicales et vesicae; mammarum morbi varii; claudicationes etc.

§. X. 7°. Ex multarum Feminarum singulari vitae genere, quo morbos multos contrahunt, quorum plerique (praeunte Ramazzinio) commode ad Artificium morbos possunt revocari: huc v. g. spectant Lotrices; Nutrices; Puerperarum aegrarumque curam habentes; ipsaeque imprimis Obstetricae et omnes, quae vitae sedentariae addictae sunt, veluti Vestales, Sartrices, similesque.

§. XI. 8°. Ex pravis nonnullis consuetudinibus, quae Feminas magis, quam Viros, occupant: quarum aliae in vestimentorum perversa indole atque applicatione, aliae in
aliis

aliis consistunt conditionibus: quo v. g. spectat dilectus plerisque cum vita sedentaria insuforum calidorum potus, frequens illa morborum origo; nec non suppedaneorum foras, cui multae, imprimis nostrates, indulgent Feminae, et quo frequentes sibi humorum derivationes ad inferiora membra, anxietates, lipothymias, passiones hystericas, menses inordinatos nimisque copiosos, profluvia, abortus, fluorem album, aliave uteri mala contrahunt. Forsan et topica crurum femorumque vitia, quibus toties vexantur, ardores, pustulae, excoriations, ulcera, glandularum indurationes, scirrhi, cutis excrecentiae malignae, canerosae, imo et corneae, huic fonti non raro attribui debent.

§. XII. 9°. Ex variis vitae Feminarum stadiis generaliter eae praedisponuntur ad innumeros morbos, quorum quidem nonnullos etiam patiuntur Viri, qui tamen ex causis ista mulierum stadia comitantibus, iisque propriis, frequentissime has afficere solent: horum vero fontes singulares et Morborum particularium explicatione deinceps facile patebunt.

§. XIII. *Particulares* vel Proprii Feminarum Morbi (§. I.), scopum nostrum praeter ceteris ferientes, illi dicuntur, qui Feminis ex natura sui corporis, et singularium partium fabrica,

fabrica, earumque functionum diversitate, contingunt, ideoque ex vario imprimis aetatis earum termino petuntur.

§. XIV. Infantia autem Puellarum quum vix aliis, quam Puerorum aetas, morbis obnoxia deprehendatur, nulla hujus ratio in cognitione Morborum Muliebrum habenda videtur: possunt itaque hi, juxta reliqua vitae muliebris stadia, ad tres ordines revocari, ut sint nempe Morbi

I^o. Virginum;

II^o. Mulierum nuptarum, qui in morbos Gravidarum, Parturientium, Puerperarum, et Lactantium distribuuntur;

III^o. Vetularum seu Effoetarum.

CAPUT SECUNDUM.

De Morbis Virginum.

§. XV.

Vocantur *Morbi Virginum* illae Feminarum affectiones, fanitatem laedentes, quae has a pubertatis annis usque ad matrimonium, vel donec coelibes evadant effoetae, ita affligunt, ut potius ex conditionibus Virginibus propriis, quam ex aliis causis, fluant: quarum tamen multae etiam corripunt Mulieres et Vetulas, similibus saepe conditionibus expositas,

§. XVI.

§. XVI. Fontes primarii, e quibus Morbi Virginei scaturiunt, sunt sequentes: 1°. Mutationes prorsus singulares, quae ex constanti Naturae lege, circa tempus pubertatis, in corporibus Virginum excitantur, imprimis a plethora, multorum saepe malorum causa, priusquam determinato vasorum motu Menses per uterum evacuentur.

§. XVII. 2°. Vitia quaedam partium genitalium organica, quae mensium fluxum eo tempore impedire, vel et Virgines ad concipiendum ineptas, sive steriles, reddere, vel aliis malis ansam praebere possunt; v. g. vaginae, uteri, tubarum, ob varias causas, arcta nimis apertura, vel et earundem partium nimis frequens atresia seu imperforatio; nec non scirrhi, polypi, sarcomatis, similisve mali praesentia in iisdem.

§. XVIII. 3°. Menstruae evacuationis, quae salutari Naturae conamine tempore pubertatis regulariter excitari debet, retardatio, difficultas, suppressio, retentio, vel et immunitio, propter dictas non tantummodo, sed et alias multas causas, frequentissime locum habens, multimodis saepe nocet.

§. XIX. 4°. Mensium fluxus nimius, praecox, vel nimis frequens, licet crebro haud affligat

affligat Virgines, non raro tamen, ex variis causis exortus, sua quoque in his excitat mala.

§. XX. 5°. Mirabilis quoque illas afficit stimulus venereus, in hoc vitae femininae studio primos, principesque, suos effectus exferens: qui, cum justos intra limites continenter, admiranda efficacia naturam earum mutant, foecunditati adaptant, irritant, et ad licitam impellunt voluptatem; aliquando vero tam abnormes fiunt, ut animi corruptionem, vel et corporis varios tum spasticos, tum torpidos et languidos, imo interdum quoque obscenos morbos, qui nostri fori sunt, excitare videantur.

§. XXI. 6°. Neque excludenda videtur major illa (§. V.) corporis irritabilitas et sensibilitas, tam ratione partium contractilium, quam respectu nervosi systematis, in Virgibus maxime conspicua, quae, cum accedente insigni animi agilitate et mobilitate (§. VII.), illas reddit frequentibus spasmodicis, convulsivis, reliquisque nervorum et principii vitalis morbis, obnoxias.

§. XXII. 7°. Multos imprimis morbos pati, prae reliquis femellis, solent Virgines, ubi matres student filias curatura junceas reddere, arctisque vestibus, ligaturis, thoracibus, loricisve

B

cisve

cisve nimis constringunt; aut quando deforme imprudenti, aut perversa, variorum machinamentorum ope corrigere tentant: his enim laesa pectoris et abdominis viscerum naturali actione, facile tota turbatur corporis oeconomia, et pessima saepe excitantur mala.

§. XXIII. 8°. Vitae genus Virgineae aetati proprium, in variis regionibus, et pro variis vitae accidentalibus conditionibus, diversum; multis quoque consuetudinibus, fortunae et morum ludibriis saepe expositum; aut pravorum nonnunquam artificiorum effectibus corruptum; imo etiam severo nimis religionis cultu oppressum, tam frequenter causas morborum producit, ut hic omitti posse haud videatur.

§. XXIV. Ex quibus patet, magnum quidem numerum esse morborum, qui Virginem aetatem possint comitari, quorum omnium plenissima expositio nimis amplum differendi campum nobis praeberet: unde primarios tantummodo hic indicabimus, in Praelectionibus theoretice et practice pertractandos, scilicet (α) Plethoram pubertatis ejusque effectus; (β) Mensium retardationem vel suppressionem; (γ) Mensium fluxum nimium; (δ) Fluorem album; (ε) Chlorosin; (ζ) Passionem hystericam; (η) Furorem uteri-

MULIERUM NUPTARUM. 19

uterinum; his denique (§) Sterilitatem, alibi vix ponendam, adjungemus, quia hujus causae in Virginibus non raro jam adsunt, vel certe saepe oriuntur. — Quibus explicatis, reliqui facile indagari atque explicari, tum ex indicatis fontibus, tum ex generalibus Pathologiae et Praxeos medicae dogmatibus, poterunt.

CAPUT TERTIUM.

De Morbis Mulierum Nuptarum.

§. XXV.

Morbi *Mulierum* strictiore sensu appellantur illi, qui *Feminas* affligunt, quatenus hae *Virorum* commercio indulgentes utero concipiunt: adeoque *Mulieres* foecundas a virginitate laesa usque ad statum effoetum, quo menstrua fluere desinunt, corripere possunt.

§. XXVI. Quum rara satis, et pauca, et ex generali doctrina medica facile deducenda, atque intelligenda, sint mala, quae ex primo coitu et orgasmo venereo, nonnullis *Conjugibus*, aut corruptis *Virginibus*, eveniunt, haecque vitia singularem adeo sibi titulum haud vindicent; nec singularia alia *Mulieres*, si sterilitatem excipias, ante graviditatem infestent; *Morbi Mulierum* stricte dicti solent

dividi in quatuor genera, pro variis, quae foecunditatem comitantur, periodis, adeoque in (a) *Morbos Gravidarum*, (β) *Parturientium*; (γ) *Puerperarum*, et (δ) *Lactantium*: qui singuli ex suis nunc fontibus derivandi sunt.

CAPUT QUARTUM,

De Morbis Gravidarum.

§. XXVII.

Morbi *Gravidarum* Mulierum illi sunt, qui a conceptu fetus usque ad partus initium Mulieres ex variis causis gestationem comitantibus ita afficiunt, ut functionum sanitatis laesionem inducant: quos inter nonnulli Gravidis omnino proprii, haud pauci tamen reliquis etiam Feminis non raro ex aliis causis eveniunt.

§. XXVIII. Praecipui fontes causarum illorum Morborum habentur: 1^o. Seminis masculini ingressus in uterum, ejusque ulterior cum foecundae Mulieris corpore, post factam conceptionem, communicatio: quod singulari suo stimulo, ocius seriusve in plerisque, in nonnullis fere praesentaneos, effectus excitat, ab alia causa vix repetendos (v. Van Swieten Comm, ad Aph, Boerhavii Tom. IV, p. 462.)

§. XXIX.

§. XXIX. 2°. Sensibilitas major corporis, durante toto gestationis tempore Gravidas longe magis, quam reliquas Mulieres, obnoxias reddit partium mobilium et sentientium commotionibus et affectionibus inordinatis, earumque effectibus multiplicibus: quam ideo sedulo attendere solent ipsæ Mulierculæ, nec minus respicere debent Medici prudentes, tum in regimine Gravidarum, tum quidem maxime in remediorum, præcipue stimulantium, præscriptione.

§. XXX. 3°. Mirabilis quoque Mentis dispositio in iis datur ad animi affectus validiores, qui haud raro, insoliti et enormes dum fiunt, in absurda et ridicula abeunt phantasmata, non omni semper tam in ipsis Gravidis, quam in Fetibus, periculo vacua: quamvis non assentiendum putemus iis, qui naevos inde maternos, organica vitia, membrorum mutilationes, quinimo horum destructiones, oriri posse contendunt.

§. XXXI. 4°. Mensium suppressio, post factum conceptum multorum morborum scaturiginem in Gravidis aperit, durante primo gestationis stadio, illis similiam, qui ex eadem causa Feminas aliis temporibus affligunt, nunc vero propter eam pejorum et periculosiorum.

B 3

§. XXXII.

§. XXXII. 5°. Peracto secundo tertiove mente, post priorum malorum inducias, nova nata plethora, indeque inducta Naturae ad expellendum solita molimina, omnibus Practicis sedulo animadvertenda, novis morbis Gravidas subjiciunt; praecipue abnormi humorum circulantium motui, quo aliorsum male directi congestionibus, earumque effectibus multis, ansam praebent: praetereaque systematis nervosi turbis, maxime autem haemorrhagiae uteri et abortui, eas exponunt.

§. XXXIII. 6°. Quoniam Abortus et Partus praematurus, cum comitante haemorrhagia, dolore, spasmo, consensuque, plurimorum morborum causas possunt producere, non dubitamus quoque hunc tamquam singularem Morborum Muliebrium fontem enumerare.

§. XXXIV. 7°. Uteri gravidi incrementum, adscensus e pelvis cavo, et immanis expansio, innumeros excitat Gravidarum morbos: primo quidem arctando Abdomen, et mechanice comprimendo viscera, quae in eo continentur, praecipue hepar, lienem, ventriculum, intestina, nec minus partes iis vicinas, nempe renes, ureteres, aortam, venam cavam, arterias et venas iliacas, nervosque e medulla spinali prodeuntes inferiores: accedit Pectoris coarctatio, similesque effectus

ctus inde excitati in corde, pulmonibus, vasisque majoribus: ex quibus multiplici modo circulatio, digestio, chylificatio, et respiratio laeduntur, inque tota corporis oeconomia, ejusque functionibus, ingentes solent produci turbae, variaque vitia topica excitari, inter quae tensiones, spasmi, dolores, stupores, obturationes, obstructions, inflammationes, congestiones, prae ceteris memorabiles sunt: unde nascitur magna series morborum abdominis, pectoris, ipsiusque capitis; nec non artuum inferiorum torpores, dolores, crampi, oedemata, erysipelata, varices, haemorrhagiae, ulcera; labiorum vulvae inflationes, variaque vitia partium genitalium; et alia multa, pro diversa partium compressarum aut distentarum actione, variis nominibus insignienda.

§. XXXV. 8°. Increscunt illorum effectuum numerus et magnitudo, si uterus distentus, a situ naturali abluens, quamcunque assumserit obliquitatem, partesque vicinas validius comprimat.

§. XXXVI. 9°. Tanto etiam majora ab expansione: et adscensu uteri existunt mala, quando vestium arctarum, thoracum balaenaeorum, similive alia constrictione pristinam ventris tenuitatem formaeque pulchritudinem

servare, male sibi et fetui consulentes, Feminae satagunt; aut graviditatem primam perverlo pudore recens nuptae, meliora nondum edoctae, abscondere tentant; aut et furtivi amoris fructum celare corruptae Virgines omni modo student.

§. XXXVII. 10°. Partium Pelvis vicinia, et consensus, cum utero gravido distento, non minus obnoxias reddit Gravidas affectionibus a vesicae, intestini recti, et nervorum sacro ischiadicorum, aliorumque, connexionione, compressione, vel irritatione: unde vesicae dolores, spasmi, cystitis, dysuria, ingens distensio, ipsaque, nobis visa, crepatura; ischuria vera, vel e contrario incontinentia urinae, aut et frequentior mictus; alvi raritas, durities, tenesmus, haemorrhoides, aliquando diarrhoea; coxarum dolores, artuum inferiorum stupores, ingratae sensationes, immobilitates, similiaque mala ac n. 7. Docuitque observatio, non tantum expansionem totius, sed et corporis uteri delapsum in cavum pelvis, cum quadam subversione et orificii elevatione, similia, eaque nonnumquam lethalia mala, induxisse (v. Specim. Obsf. Academ. Cap. VII. ut et Act. Societ. Flelling. Tom. IV. p. 613.)

§. XXXVIII. 11°. Fetus producit non raro Gravidis molestiam et morbos, imprimis suo motu, calcitratione, fluctuatione, variisque

que gesticulationibus, quibus nauseam, vomitum, anxietatem, lipothymiam, syncopen, impetuofam orificii uterini irri-tationem, dilatationem, uteri spasmos, dolores, tenesmos, haemorrhagiam, mictus vitia, imo et convulsiones, partumque praematurum producit: nec inficiandum est, septimo aut octavo mense saepius istos motus magis manifestos et validiores esse; non tamen ideo admittimus celebratam illam, aequae Veteribus ac Recentioribus, fetus Circumvolutionem, quam, ut capite praevio in partu naturali in lucem edi possit infans, circa illud tempus, aut versus finem gestationis, fieri statuunt: hanc enim naturali solitaeque positioni fetus humani in utero, jam a gestationis initio locum habenti, repugnare, tam ex ipsa ratione et corporum proprietatibus physicis, quam exploratione Gravidarum vivarum, et observationibus anatomicis, nec non abortibus capite praevio prodeuntibus, satis evictum esse, confidimus (v. Spec. Obsf. Acad. C. VII. §. XIV. et seqq.)

§. XXXIX. 12°. Fetus quoque nutritio, incrementum, situs, et pondus; nec non Secundinarum moles, earumque in diversa regione uteri applicatio; imo et Aquae amnios abundans nimis copia, alia mala solent excitare; maxime cum gemellos, pluresve fetus, utero gerunt Gravidae.

§. XL. 13°. Extra uterum in tuba Fallopii, ovario, ipsive abdominis cavo haerens fetus, excludi nescius, sua mora, adhaesione, incremento, pondere, induratione et corruptione, aliisve modis, gravissimos aliquando morbos iisdem parit.

§. XLI. 14°. Mors Fetus haud levis saepe, et singulares, inducit morbos in corporibus Gravidarum.

§. XLII. 15°. Accedit etiam centri gravitatis mutatio in Gravidis: quae facit, ut vacillent et facile labantur, ideoque in ictus, contusiones, luxationes, fracturas, et inde sequentia mala, ob gestationem curatu minus facilia, eatenus sint procliviores,

§. XLIII. 16°. Augetur quam maxime dictorum malorum fons, si memoratis causis praedispositio accedat a deformi pelvis, spinæ, thoracisve configuratione, imprimis, si praegressa rhachitis illam produxerit.

§. XLIV. 17°. Ex pravo regimine Rerum, quas non naturales vocant Medici, quarumque effectus in causarum occasionalium, seu potentiarum nocentium, tractatione Pathologia generalis exponit, plerasque Gravidas prae ceteris feminis morbos pati, quotidiana docet experientia.

§. XLV.

§. XLV. Ex quibus luculenter patet, quam multis magnisque morborum causis expositae sint illae Mulieres, quae crebras, et presso pede se invicem sequutas, praegnationes subeunt, inprimis si juniores, nec plenum incrementi terminum adeptae, sensibiliores, debiliores, cacochymicae, valetudinariae fuerint.

§. XLVI. Propositos harum Institutionum cancellos excederemus, si omnes istos Gravidarum morbos, qui ex memoratis fontibus fluere possunt, exponere vellemus, de quibus prae ceteris summi Boerhavii Aphorismi, eorumque Commentarii, nec non alii Auctores, qui Artem obstetriciam et Morbos Mulierum tractarunt, legantur: sufficet nobis primarios pertractasse, scilicet Gravidarum (α) Fluxum uterinum; (β) Abortum et Partum praematurum; (γ) Dysuriam et Ischuriam; nec non (δ) Mala ex Fetu mortuo oriunda: reliqui enim illarum morbi cogniti et curati sunt faciliores, si generalia Medicinae principia bene cognita sint.

CAPUT QUINTUM,

De Morbis Parturientium.

§. XLVII.

Habentur *Morbi Parturientium* illi, qui a causis Partum concomitantibus, Feminas quam frequentissime affligunt: quarum iterum aliae aliis etiam Mulieribus accidere possunt, aliae Parturientibus omnino ita propriae sunt, ut sine partu locum habere nequeant,

§. XLVIII. Quae causae quum pendere possint a conditionibus ipsi Parturienti propriis, aut aliis, quae ad Fetus sunt referendae, aut et talibus, quae ad Obstetricantis encheireses, vel errores, pertinent; merito earum fontes ad tres species referuntur, quatenus I^o. a Matre, II^o. a Fetu, vel III^o. ab Obstetricante, oriuntur.

§. XLIX. I^o. Ad ipsam Mulierem parturientem, seu *Matrem*, spectant causae sequentes: α) Corporis universalis, vel uteri particularis, tanta debilitas, ut vires ejus ad fetus expellendum haud sufficiant, et dolorum inertia ex torpore fibrarum, aut atonia nervorum, adsit in utero.

§. L.

PARTURIENTIUM. 29

§. L. β) Adest etiam saepe magna fibrarum, vasorum, nervorumque irritabilitas et sensibilitas, quae spasmis, doloribus spuris, vagis, inordinatis, crampis, tenesmis, colicis, vomitui, hysteriae, convulsionibus, epilepsiae, aliisque morbis ansam dant.

§. LI. γ) Animi pathemata in Parturientibus varias ob causas, praecipue metum, facile, frequenter, et vehementer excitata, in corporibus earum valde sensibilibus, sua quoque effecta noxia, tum solita, tum a graviditate pendentia, producere observantur.

§. LII. δ) Congestio humorum ad superiores partes, quam in plerisque decubitus pravus corporis, assumptio variorum stimulantium, et in omnibus fere conatus inutilis et praecoces, uteri et fetus moles atque pondus, dolorum irritatio aliaque efficacia, nixus parturientis, spasmi abdominales, aliaeque conditiones, certo excitant, gravia saepe mala producit: imprimis si ad pectoris vel capitis morbos, ex hacce causa oriundos, praedispositae sint Mulieres, aut hos aliosve jam patiantur.

§. LIII. ε) Febris quoque, eaque haud raro satis valida, corripit Parturientes, ab
irri-

irritatione partus, et consensu uteri cum toto corpore (§. VI.), animi perturbatione, aliisque causis sensibilitatem et sanguinis motum impetuofum incitantibus, enata: quae adeo et variis suis symptomatibus illas reddit obnoxias.

§. LIV. ♀) Partium genitalium externarum et internarum mala conformatio, aut morbi varii, multis et magnis malis Mulieres in partu exponunt, v. g. structura non naturalis; arctitudo; atresia; polypus uteri vel vaginae; procidentia; scirrhus; tumor; siccitas; inflammatio; ulceratio; carcinoma; cicatrix, similiae vitia.

§. LV. ♀) Partium vicinarum mollium vitia, veluti Herniae; Intestini recti infarctio ab accumulatis faecibus, tenesmus, haemorrhoides, et prolapsus; Vesicae urinae difficilis evacuatio, distensio, vel et hernia, aut calculus, indeque orta lotii suppressio, aliive morbi: Perinaei tenacitas in primiparis maxime annosis, aut callositas a praegressa fissura, huc etiam revocandae sunt.

§. LVI. ♀) Maximi, iique periculossimi, morbi Parturientibus imminent a prava conformatione Pelvis osseae, tam ratione capacitatis imminutae, quam nimis auctae.

§. LVII.

PARTURIENTIUM. 31

§. LVII. ι) Nec parvam hic attentionem meretur ligamentorum pelvis, speciatim sacro-ischiadiorum rigiditas, et minor, quam par est, extensilitas, primiparis aetate provectioribus toties nociva.

§. LVIII. κ) Situs uteri recedens ab axi sua et pelvis, quem obliquum vulgo vocant, gravia quoque mala solet excitare, partumque difficillimum, imo saepe lethalem, reddere potest, praeter illos effectus, quos et in gravidis producit (§. XXXV.)

§. LIX. λ) Haemorrhagia uteri a variis causis oriunda, summi momenti est habenda, quum Parietes liquore vitali orbet, vires uteri totiusque corporis frangat, dolorum efficaciam sufflaminet, in lipothymiam, syncopen, imo et convulsiones, conjiciat feminas, adeoque periculosorum morborum uberrimum fontem aperiat.

§. LX. μ) Dantur etiam Parietes, in quibus gibbositas, aliave depravata corporis conformatio, nec non singulares quidam morbi, partum reddunt diuturnum, difficilem, vel et praeternaturalem, ita ut eum morbi varii comitentur, aut sequantur.

§. LXI. ν) Omnis denique lentor, quo
partus

partus ultra solitum tempus protrahitur, diuturnitate effectuum, quos nixus, dolores veri spurii, animi affectus, vigiliae, cerebri oppressio, nervorum sensibilitas, circulatio humorum incitata, febris, aliaeque conditiones, tum inprimis praesentes, producunt, multis pravis symptomatibus ansam praebere solet.

§. LXII. ξ) Neque tamen ab omni culpa liber habendus partus magna nimis celeritate peractus, quoniam et hicce fetum quasi praecipitando, et violenter afficiendo partes ad enixum concurrentes, non raro morborum causa existit, v. g. genitalium inflammationis, rupturae, gangraenae uteri, prolapsus, atoniae, spasmi, aut haemorrhagiae, imo et horrendae, solisque partum enixis propriae, ejusdem inversionis.

§. LXIII. η°. Ad *Fetum* (§. XLVIII.) in utero retentum variae spectant Parientium Mulierum affectionum causae: scilicet 1°. Ejus nimia moles, tam capitis, aliarumve singularium partium, quam totius corporis: quae etiam propria esse potest, vel relativa: similiaque, ac pelvis angustia, inducit mala, praeter illa, quae a pondere et pressione majore dependent.

§. LXIV. θ°. Motus Fetus nimis validi in ipso

PARTURIENTIUM. 33

ipſo partu non tantum dolores ; deliquia, anxietatem, ſed et validas uteri contuſiones, imo aliquando rupturam, excitant.

§. LXV. 3°. Videtur et motuum ejuſdem nimia debilitas ſua mala producere nonnunquam poſſe.

§. LXVI. 4°. Situs Fetus iniquus, quo caput ejus a poſitione naturali deſlectit, aut aliae, quam in partu naturali, partes praeviae ſunt, dyſtociae, morbiſque magnis et multis, Mulieres exponit.

§. LXVII. 5°. Morbi Fetus varii haud levi periculo exponunt aliquando Parturientes, v. g. hydropes abdominis, pectoris, capitis; variarum partium excreſcentiae, aut tumores; imo et convulſiones.

§. LXVIII. 6°. Monſtroſa fabrica prae reliquis hic etiam memorari meretur, uti Fetus bicipites, bicorporci, connati, ſimilesque, probant.

§. LXIX. 7°. Neque omnino excludi poſſe ex hoc cauſarum fonte videntur Partuſ ferotini, quibus ultra maturitatis terminum conſuetum Fetus excluduntur.

C

§. LXX,

§. LXX. 8°. Numerus auctus in Partu gemellorum, trigeminorum, pluriumve fetuum, similiter gignit morborum fontem, tum praecipue ob uteri distensionem nimiam, indeque natam ejus atoniam, tum propter molem, partus diuturnitatem, aliosque effectus.

§. LXXI. 9°. Mors Fetus, cum suis effectibus variis, in hunc censum etiam referenda est.

§. LXXII. 10°. Secundinae, a Natura vel Arte educendae post partum, quatenus potius inter Fetus, quam Matris, partes recenseri merentur, suis quoque vitiis innumera, eaque ingentia, mala Parturientium possunt inducere, v. g. ubi nimis fortiter cum utero cohaeret placenta; ubi intempestive, vel praecociter, extrahitur; ubi in peculiari sacco incarcerata est; ubi pro parte, vel tota, in partu ab utero solvitur; ubi aliam, quam debitam, sedem in utero, imprimis ad orificium hujus, occupat; ubi vitium quoddam singulare, vel corruptionem, contraxit; ubi funis umbilici praevious elaboratur, vel nimis brevis est, aut laquei instar Fetus corpus collumve retinet etc.

§. LXXIII. 11°. Spectat quoque huc effluxus praematurus Aquae amnios, cujus insignis

signis est ad dilatandum orificium uteri, et partum promovendum, utilitas; quamvis diuturna nimis retentione, magnaue copia, et nimia uteri expansione, nocere parturienti eadem etiam possit.

§. LXXIV. III°. Ad *Obstetricantem* denique (§. XLVIII.) etiam referri possunt variae causae morbificae parturientium Mulierum, quarum praecipuae sunt: α) Situs Parturientium incommodus, vel noxius, ad Naturae et Artis regulas non satis recte compositus.

§. LXXV. β) Rudiores contrectationes partium genitalium tam externarum, quam praecipue internarum; quo v. g. frequens exploratio et orificii uterini irritatio; inutilis vaginae dilatatio; violenta ossis coccygis repressio; imprudenter facta enematum injectio; catheterismi minus dextre peracta operatio; tactus frequens per anum; similesque aliae spectant.

§. LXXVI. γ) Applicatio Instrumentorum obstetriciorum incauta, violenta, intempestiva, quae saepe dolores, contusiones, lacerationes, vulnera, aliasque laesiones, producit: nonnunquam inevitabiles, quando illorum usum dira exigat necessitas.

§. LXXVII. δ) Encheirefes Versionum infantum, qui perverſum in utero ſitum habentes partu Agrippino excludendi ſunt, ſaepe dolorofae, difficiles, morboſae.

§ LXXVIII. ε) Extractio Secundinarum difficilis, violenta, praecox, neglecta, aliove modo praeternaturalis.

§. LXXIX. ζ) Intempeſtiva Aquae amnios effuſio, membranarum laceratione vel pertuſione nimis feſtitanter excitata: aut et aliquando ejusdem nimis diuturna, propter dolorum inertiam, vel membranarum ovi tenacitatem, retentio.

§. LXXX. η) Fiſſura Perinaei, ſaepe ad inteſtinum uſque rectum procedens: non ſemper tamen culpae obſtetricantis tribuenda.

§. LXXXI. θ) Uteri deſcenſus, prolapſus, volvulus, inverſio, aliaque ſimilia mala, a feſtinatione maxime metuenda.

§. LXXXII. Cuilibet attendenti facile apparebit, quam multa, quamque gravia, in Partientibus oriri mala poſſint, ſi, uti ſaepe fit, expoſitae diverſarum ſpecierum cauſae in eodem corpore concurrant.

§. LXXXIII.

PARTURIENTIUM. 37

§. LXXXIII. Non finit instituti nostri ratio, omnes pertractare Morbos, qui Parturientibus ex singulis tribus memoratarum causarum fontibus evenire possunt, et revera saepissime contingunt, quippe Artis obstetriciae, ex qua plerique hauriendi sunt, cognitio supponi debet: nonnullos tamen paulo accuratius exponemus, quorum curatio frequenter occurrit Practico clinico, et qui non raro insignem a Medicina accipiunt opem, quam ab Arte obstetricia sola aliquando nec desiderare, neque expectare possumus, v. g. (α) Dolores partus spurios; (β) Partum lentum atque difficilem; (γ) Haemorrhagiam uteri in partu ipso supervenientem; (δ) Convulsiones parturientium; quibus etiam (ε) nonnulla de abnormi sanguinis motu, indeque natis earum Congestionibus tractandis, addi poterunt.

CAPUT SEXTUM.

De Morbis Puerperarum.

§. LXXXIV.

Ordine suo *Puerperatum Morbi* nunc memorandi illi nominantur, qui post partum editum eveniunt Mulieribus ex causis directe e peracta fetus exclusione, ejusve sequelis, pendentibus, aut valde arctum saltem

cum eis commercium habentibus: quae quum multae et variae sint, hinc etiam plurimi, suaeque indole diversi, in Puerperis occurrere solent morbi, partim his solis proprii, partim Mulieres in aliis suae vitae stadiis etiam corripientes.

§. LXXXV. Eorum fontes primarii sequentes haberi possunt: 1^o. Pleraque mala, quibus ex triplici fonte (§. XLIX, LXIII. et LXXIV.) obnoxias esse parturientes vidimus, in Puerperium tantum habent influxum, ut, hoc durante, pergant Mulieres affligere, vel et novorum morborum causae fiant.

§. LXXXVI. 2^o. Speciatim vero recensenda est laesio quaecunque, aut violentia, partibus generationis in partu illata, tam in fetu, quam in secundinarum, exclusione: unde haemorrhagiae earumque sequelae; fluxus lymphae, saniei, puris; dolores, spasmi, distensiones, tormina, inflammatio, suppuratio, ulcus, gangraena uteri, aliarumque partium genitalium; urinae et faecum viae affectiones variae, earumque foeda excretio; haemorrhoides; tenesmi; diarrhoeae; artuum inferiorum dolor tumorque varius, et multa alia mala.

§. LXXXVII. 3^o. Summa sensibilitas, qua
in

in Puerperiis affectae sunt partes corporis mobiles et nervosae, accedensque maxima animi illarum agilitas, quae mirifice inter se communicant, et multis morbis facile obnoxias reddunt Mulieres, quibus in alio stadio non ita facile afficerentur, singularem quoque hic attentionem merentur.

§. LXXXVIII. 4°. Agilitatem istam nimiam, tum corporis, tum mentis, in multis excitant augentque animi frequentes affectiones intensae, ab excessu metus, terrore, moerore, aut et ira, ipsoque nonnunquam nimio gaudio, profectae: ex his, et duplici eo fonte, quem n. 3. exhibet, Puerperae saepe patiuntur spasmos, convulsiones, evacuandorum suppressiones, febres, mentis commotiones, deliria, melancholiam: inde etiam haud raro ipsa phrenitis, vel et mania Puerperarum, praecipue derivanda videtur.

§. LXXXIX. 5°. Accedit dictis saepissime ingens corporis, variarumque partium, speciatim cerebri et reliqui capitis, singularis debilitas, quae frequentia in Puerperis excitat animi deliquia, lipothymias, syncopen, convulsiones, aliosque in mortem non raro tendentes morbos: eademque haec conditio, simul cum n. 3. et 4., imprimis facit, ut Puerperae longe maximum vitae periculum incurrant,

rant, quando corripuntur morbis variis, qui etiam alias quidem, sed minore cum periculo, Feminas afficere solent, v. g. febribus acutis, inflammatoriis, aliisve: unde pleuritides, peripneumoniae, colicae, diarrhoeae, variolae, aliaeque iis adeo sunt perniciosae,

§. XC. 6°. Adest praeterea in plerisque Puerperarum corporibus, ob varias causas, ingens ad putredinem dispositio: quae etiam frequenter, inprimis si calide nimis tractentur a Medicis, aliisve earum curam habentibus, sua excitat effecta; partim illa, quae a primarum viarum sordibus dependent, uti anxietates, febres, vomitus, flatus, tormina, colicas, diarrhoeas; partim ista, quae ingressam in sanguinem corruptam materiem indicant, v. g. varias febres putridae et malignae indolis, purpuram, miliarem, petechialem, earumque sequelas.

§. XCI. 7°. Aliquando etiam epidemica causa Puerperas prae reliquis mulieribus infestat, producitque diarrhoeas, colicas, enteritides, pleuritides, aliasve inflammationes; alias excitat febrem purpuram, aut miliarem, aliamve malignam; aliquando et lactis, vel lochiorum, aberrationes.

§. XCII. 8°. Ex nervorum lumbalium et
ossis

offis sacri tensione, irritatione, compressione, durante partu facta, varii morbi in Puerperis derivari etiam debent, tum universales dolorosi, spasmodici, convulsivi, tum particulares, v. g. dolor coxarius; ischias nervosa; femoris et cruris immanes eruciatus, immobilitas, stupor, tumor, inflammatio, quandoque et paralytis; neque raro variae partium mollium pelvis affectiones.

§. XCIII. 9°. Maxima mutatio, quae post partum absolutum visceribus abdominalibus et pectoralibus contingit (praeter derivationem sanguinis ab aliis partibus, ipsoque imprimis cerebro) in his multas morborum causas potest excitare; v. g. impetuosos humorum influxus, obstructions, inflammationes, colicas, diarrhoeas etc.

§. XCIV. 10°. Injecta abdomini, ex praeco more, cingula seu fascia, irrita non tantum, sed et perniciosa, solet esse Puerperis, nec inmerito a Jo. Gortero multum damnata.

§. XCV. 11°. Si uterus post emissum fetum sufficiente vi contractili non polleat, imprimis, si tum ex illo praecociter, aut imprudenter, extrahatur placenta, periculosissimis morbis, summoque vitae discrimini, exponuntur Puerperae, scilicet prolapsui, aut volu-

vulo, imo inversioni uteri perfectae, vel haemorrhagiae violentae, post solutam ab eo placenta, haud facile compescendae: quos ferre omnes effectus sequuntur convulsiones, et certa mors.

§. XCVI. 12°. Relictae in utero, et a constricto orificio retentae, soluta placenta aut portiones secundinarum; grumosus et coagulatus sanguis ibidem collectus; praesentia molae aliisque corporis heterogenei; vel et aliquando fetus, ejusve capitis, aut membri cujusdam retentio; distensione, mole, pondere, irritatione, putrefactione, aliisque effectibus, excitare possunt tormina, spasmos, haemorrhagias, varios fluxus, inflammationes, febres, resorptiones, cacochymias, metastases, convulsiones etc.

§. XCVII. 13°. Lochiorum fluxus nimius, a varia causa pendens, frequenter in Puerperis praesentium et futurorum morborum fertilis causa est habendus.

§. XCVIII. 14°. Lochiorum imminutio, vel maxime eorumdem suppressio, omnium frequentissimus est affectionum Puerperii fons, ex quo infinita et pessimae indolis symptomata fluunt, prout abnormi motu et congestione in hoc illudve viscus, vel aliud corporis organum,

ganum, eorum ruunt impetus (v. summi Boerhavii Aphor. §. 1329.).

§. XCIX. 15°. Calidum regimen; assumpta alimenta dura, tenacia, in putredinem prona, aromatica; potulenta vinosa, spirituosae; remedia stimulantia, acria, praesertim pellen-
tia, emmenagoga dicta; ut et opiata, larga manu vel imprudenter in partu, aut puerperio, propinata, immaniter Puerperis nocent.

§. C. 16°. Febris lactea, quae tertio ut plurimum die corripere solet Puerperas, cum suis effectibus et sequelis, universi corporis morbis similibus ac in n. 14. non minus, quam topicis malis, ansam dat.

§. CI. 17°. Spectant huc etiam lactis istae aberrationes, quibus illud liquidum in cerebrum, aliasve magis vel minus nobiles partes, errore loci deponitur, et mala creat ob gravitatem et periculum valde notanda, illisque Mulieribus multum metuenda, quae Naturae legi et ordini refractariae proprios infantes lactare respuunt, et ad lactis secretionem impediendam vel abigendam varia artificia imprudenter adhibent; aut iis, quae propter singulare organorum lactiferorum vitium, systematis nervosi sensibilitatem, corporis universi debilitatem, aliamve ob causam, officii hujus impotentiam lugent.

§. CII.

§. CII. 18°. Frequentissime morbis afficiuntur Puerperae a rumore, confabulatione, aliove modo iis noxio adstantium commercio, quo frustrantur necessaria sibi et salutari requie, somnoque illo carente reficiente, quem blande mulcendis et sopiendis praegressi partus, maximeque quassantium dolorum, effectibus Naturae benignus Auctor sapienter adeo destinavit.

§. CIII. 19°. Quarumvis denique Rerum non naturalium vitia commissa solent in genere Puerperis debilibus et sensibilibus promptiora et magis gravia, quam aliis Feminis, ceteris paribus, excitare mala: unde Regimen Puerperarum tam medicum, quam diaeteticum, et domesticum, summa semper cum prudentia debet dirigi.

§. CIV. Ex praemissis Puerperarum Morbis quum haud pauci sint, qui alias quoque Feminas solent invadere, et quorum explicatio ex generali doctrina Medica facile potest peti; non omnes illos exponere debemus morbos muliebres: praecipuos tantum quodammodo amplius in Praelectionibus tractabimus; nempe (*a*) Puerperarum debilitatem et sensibilitatem; (*b*) Tormina post partum; (*γ*) Secundinarum morbosam exclusionem; (*δ*) Fluxum lochiorum imminutum aut suppressum;

sum; (ε) Fluxum eorundem nimium; (ζ) Inflammationem uteri, cum ejus sequelis, abscessu, gangraena etc (η) Febrim lacteam, et Lactis motus abnormes sive errores; (θ) Febrim purpuram; (ι) Puerperarum denique Diarrhoeam. — Ceteri aliunde fatis cognosci poterunt.

CAPUT SEPTIMUM,

De Morbis Lactantium.

§. CV.

Morbi varii *Lactantes* Mulieres tum Matres, tum Nutrices, aggrediuntur ex causis, quae a perversa secretionem vel excretionem Lactis, vel a vitis organicis Mammarum ad lactationem ineptarum, vel a conditionibus proximam cum hisce commercium habentibus, originem suam trahunt: adeoque patet, etiam hos ex fontibus variis derivari posse.

§. CVI. Horum sequentes sunt praecipui:
 1^o. Febris lactea cum variis suis effectibus, non tantum ut febrim symptomatibus solitis, sed eo magis notandis, quod in corpore Puerperae locum habeant, cujus sensibilitas, debilitas, aliaeque ex puerperio fluentes causae, haud raro istos reddunt enormes.

§. CVII.

§. CVII. 2°. Organorum mammalium ab affluentibus humoribus facta distensio, eorumque teneritudo, sensibilitas, dolor, spasmus, obstructio, durities, inflammatio, abscessus recens Lactantes saepe afficiunt, imprimis illas, quae rite, iustoque tempore, infantem uberibus non admovent, multisque irritationibus ea exponunt.

§. CVIII. 3°. Neque in iis plane absunt effecta, quae ex lochiorum imminutione, vel suppressione, febrim lacteam ut plurimum comitante vel sequente, oriri solent, variisque morbis obnoxias reddere Lactantes; quae, et in alias affectiones facile incidunt, quas post se relinquunt lochiorum fluxus nimius, alique puerperarum morbi.

§. CIX. 4°. Repulsio materiae lacteae, aut impedita ejus secretio, et qui inde, aliove modo, nascuntur errores Lactis, seu depositiones lacteae ad varia loca, Lactantibus nonnunquam, aequae ac Puerperis, varios morbos inducunt.

§. CX. 5°. Protractae vigiliae, curae nimiae, et corporis animique defatigationes perpetuae, in lactandis infantibus, variis morbis laborantibus, aut nocturno somno carentibus, solent saepe Matres aut Nutrices morbosas reddere.

§. CXI.

§. CXI. 6°. Nimia nimisque frequens secretio infantis, aut excedens Lactis secretio et evacuatio, subtrahens in muliere (post partum praegressum, aliave mala praeterita, debili) sanguinem, et alios humores, reliquis organis eorumque functionibus, tantis saepe malis Matres et Nutrices afficit, ut ab officio suo desistere cogantur.

§. CXII. 7°. Sensibilitas systematis nervosi, et mobilitas partium irritabilium, nimia, quae cum mammis earumque papillis mirificam habent sympathiam, Lactantes obnoxias reddunt cordis palpitationibus, deliquiis, lipothymiis, spasmis, convulsionibus, febribus, passioni hystericae, epilepsiae, sensuum omnium hebetudini, inprimis visionis variis vitiis, ipsique aliquando etiam caecitati.

§. CXIII. 8°. Animi affectus, maxime ira et moeror, saepe etiam turbant Lactantium corpora, sensibilitate et debilitate ad morbos inde suscipiendos praedisposita; et mala inducunt tum in ipsas, tum praecipue in tenellos infantes, qui corruptam sugunt materiam lacteam, redundantia.

§. CXIV. 9°. Corruptio lactis varia in Lactantibus potest singulares inducere Morbos, tum topicos, tum universales.

§. CXV. 10°. Organica partium Lactationi inservientium, eaque diuturna, mala saepe quoque vexant Lactantes; v. g. Papillae nimis

mis durae, compressae, parvae, et absconditae; earundem dolores, fissurae, separatio, pustulae, excoriatio, inflammatio, ulcera, aliaque vitia; Mammaram excoriations, erysipelata, exanthemata, variaque mala externa, nec non interna, veluti obstructiones, inflammationes, indurationes, scirrhi, carcinomata glandularum discos constituentium, nullibi frequentius, quam in hisce partibus, obvia.

§. CXVI. 11^o. Ablactatio tandem etiam suos morbos in Mulieribus valet excitare, tum a difficultate impediendi secretionem lactis, et mammaram exsiccatione, maxime si haec vulgaribus remediis imprudenter tentetur; tum a lactis repulsione; a mammaram induratione, sensibilitate, dolore, inflammatione; a lactis coagulo, aliove vitio; a nova humorum abundantia in corpore producta; vel a similibus aliis causis, ablactationem comitantibus vel sequentibus, oriundos.

§. CXVII. Ex memoratis Morbis, qui Lactantes Mulieres adgredi solent, haud singulatim exponemus omnes eos, qui etiam in aliis vitae stadiis illis accidunt, vel alio titulo jam explicati sunt; sed tantummodo paucos explicabimus, qui magis proprie ad Lactationis opus spectant: agemus itaque (α) de Lactis defectu et abundantia nimia; (β) de Lactis prava qualitate; (γ) de Papillarum variis vitiis; (δ) de nonnullis Mammaram morbis singularibus,

CA;

CAPUT OCTAVUM.

De Morbis Effoetarum seu Vetularum.

§. CXVIII.

Appellantur *Morbi Vetularum* illi, qui Feminis praecipue circa et per eam contingunt aetatem, qua fiunt effoetae: adeoque ex conditionibus fluunt, quae cessationem Fluxus Menstrui inducunt, simul cum impotentia ad opus generationis; affligunt itaque eas ab anno circiter quadagesimo quinto (ocius has, serius alias) usque ad ultimam vitae metam.

§. CXIX. Multae quidem Vetularum affectiones communes his sunt cum aliis Feminis; multae etiam cum Senum morbis plane conveniunt; nonnullae tamen singulares quasdam, in statu effoeto quaerendas, causas videntur adsciscere; quarum indoles et potentia faciunt, ut merito a reliquis Mulierum morbis distinctae suo titulo tractentur, inque curandi methodo sollicite considerentur.

§. CXX. Praecipuae illarum causarum sunt sequentes: 1^o. Plethora menstrua: quam consueto more etiamnum inducere corpori femino pergunt hujus actiones, dum interim ex constituta Naturae lege in eo, maximeque in pelvi, et uteri substantia, tales jam factae sunt mutationes, quae solitam intercipiunt et impediunt evacuationem, vel saltem illam determinato motu solito non promovent, unde innumera adeo

D

mala,

mala, tam in universo corpore, quam in vicinia uteri, ut et in ipso hocce organo enascuntur, ut multis tempus hocce vitae muliebris clinactericum reputetur. Sic v. g. (α) *In toto Corpore* oriuntur circulationis humorum tarditas, turbæque variae; motus abnormes sanguinis ejusque congestiones; haemorrhagiae per praeternaturales aequae ac naturales corporis aperturas; febres; obstructions; humorum effusiones; inflammationes; secretionum et excretionum turbæ; cacochymiae; cachexia; spasmi; passiones hystericae; convulsiones; dolores quicumque topici, et sexcenta ex dictis generalioribus emergentia symptomata: (β) *In vicinia Uteri* excitantur tensiones; spasmi; dolores; aestus; colicae; tenesmi; stranguriae; ischuriae; diarrhoeae, aut alvi durties; haemorrhoides; obstructions et inflammationes topicae; eorumque omnium varii effectus: (γ) *In ipso utero* distensio; spasmus; dolor; tormina; obstructio; inflammatio; fluxus immodicus ruber vel albus: qualia etiam mala Vagina saepe patitur ex eadem causa; neque ab his immunia semper sunt Ovaria et Tubae.

§. CXXI. 2^o. Stagnatio sanguinis in Vasis uteri et vicinarum partium, maxime vero ejusdem inspissatio et corruptio, accedensque acrimonia, facit, ut dolores, obstructions, inflammationes, tumores, scirrhi, ulcera, fluores, cancri, sarcomata, molae, prolapsus, similiaque,

que, enascantur : quorum malorum varia quoque vaginam, tubas et ovaria adgredi solent.

§. CXXII. 3°. Effunditur non raro ex ruptis vel dilatatis vasis ille sanguis in ipsum uterivarium, ibique stagnans coagulatione, irritatione, distensione, corruptione, aliove modo, non levia mala excitat.

§. CXXIII. 4°. Neque videtur negandum, ratione seri aut lymphae similem accumulationem nonnunquam factam fuisse, atque, occlusa orificii apertura, ansam praebuisse hydrophi et tympanitidi uteri: de quibus certe in ovariiis et tubis nullum dubium datur.

§. CXXIV. 5°. Resistencia, quae ex uteri rigiditate majore, siccitate, et contractione, nascitur, haud absimiles producit effectus, quamvis etiam humores non peccarent; tanto vero frequentiores, quo manifestius n. 2. fons cum hocce concurrat.

§. CXXV. 6°. Nova conamina et molimina, quae in Vetularum aetatis progressu haud raro instituit Natura ad Mensium fluxum renovandum (quibus sat frequenter anno LX aut LXX denuo menstrua erumpunt) suis quoque malis, ex n. 1, 2, et 3, facile intelligendis, Feminas effoetas reddunt obnoxias.

§. CXXVI. 7°. Neque excipienda hic sunt Lactationis organa, in quibus repulsio sanguinis uterini ad mammas, earumque inde nata irritatio atque distensio; harum siccitas et resistencia; obstructio; inflammatio; abscessus; lactis corruptio,

ruptio, stagnatio, et coagulum; induratio, scirrhus, dolor, cancer, similesque morbi, in hac praecipue aetate Effoetas cruciare observantur.

§. CXXVII. 8°. Videtur in Vetulis mirabilis quoque latere dispositio, qua corporibus earum cancriferae indolis inhaerens labes nunc facile evolvitur, inque partes glandulosas saeviens, vel in uterum delabens, dira et tristia mala excitat, ne ipsa quidem partium affectarum resectione, facile semper extirpanda, et impedienda, quominus alias, et praesertim similitudine functionis gaudentes, partes eadem denuo labe inficiat: quae malignitas in nonnullis quoque Feminis per haereditatem a matre in sobolem transfundi quasi videtur.

§. CXXVIII. Omnes istas Vetularum affectiones explicare haud finit scopus noster, earum quippe plurimae cognosci satis possunt ex aliorum vitae stadiorum Muliebribus Morbis: nonnullas itaque tantum notabimus, prae reliquis frequentes aut graves, ideoque sui accuratam cognitionem et curandi methodum exigentes, nempe (α) Graviditatem falsam; (β) Scirrhum uteri et Cancrum; (γ) Hydropem uteri ejusque Tympanitidem; (δ) Hydropem ovariorum; (ε) Molam denique et Excrecentias varias. Praeter haec enim, quae alia satis multa Vetulae patiuntur mala, ex accidentalibus corporis conditionibus derivanda, ex generali senectutis Pathologia facile cognosci possunt.

Ud 510

S

ULB Halle

3

005 355 133




Menda

p. 9. sit leg. sus.
p. 14. n. 32. lin. 3.
p. 31. n. 193. lin.
p. 33. n. 210. lin.
p. 35. n. 230. lin.
p. 36. n. 241. lin. 1.
men, leg.
p. 39. n. 262. lin. 2.

In einigen Ausg

Ⓒ. 51. ist anstatt
Ⓒ. 54. ist anstat
Ⓒ. 57. nach D
Feit 10
anstatt u
nach fals
suche
Ⓒ. 58. geschwöll
ist anstat
men.
anstatt B
Ⓒ. 60. nach Mild
Ⓒ. 61. nach Sch
natsve
anstatt E
Ⓒ. 62. verstopf
lösch.
Ⓒ. 63. ist anstat
bey Wun
te am g
lein W



DR. GVALTH. VAN DOEVEREN,
MEDICIN. IN ACADEM. BATAVA, QVAE
LEIDAE EST, PROFESSORIS,
PRIMAE LINEAE

DE
COGNOSCENDIS MVLIERVVM MORBIS
IN
VSVS ACADEMICOS.

RECVDI CVRAVIT

D. IOANN. CHRISTIAN
TRAVGOTT SCHLEGEL,
MEDICVS APVD LONGOSALISSENSIS:

L I P S I A E,
APVD CAROL. FRIDER. SCHNEIDER,
clōcclxxxvi.