


36

01

A

6631



DISSE^RTAT^IO INAUGURALIS MEDICA

DE

E M E S I A
SISTENS

EJUS DIFFERENTIAS ACCIDENTALES, AEQUE AC ESSENTIALES,
SIVE SPECIFICAS.

26

QUAM

RECTORE UNIVERSITATIS EBERHARDINO-CAROLINÆ
MAGNIFICENTISSIMO

SERENISSIMO DUCE AC DOMINO

DOMINO

C A R O L O

DUCE WIRTEMBERGIAE ET TECCIÆ REGNANTE,
REL. REL.

CONSENSU FACULTATIS MEDICAE

P R A E S I D E

GUILIEL. GODOFR. PLOUCQUET,

PHILOS. AC MEDICINÆ DOCTORE HUJUSQUE PROFESSORE P. O.

PRO GRADU DOCTORIS RITE OBTINENDO

PUBLICO ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

DIE JULII MDCCXL

IOHANNES VALENTINUS BOESCH,

NESSLAVIO - TOGGENBURGENSIS.

T U B I N G A E

T Y P I S S C H R A M M I A N I S.

ALLEGORIAE ET MORALITATIS LIBERIA

A L G M E S I A

DEZIDERIUS ACACIUS MILES DE EZELIUS

ACACIAE LIBERIA

Felix, qui potuit rerum cognoscere cauñas.

C A R O L O

DEZIDERIUS ACACIUS MILES DE EZELIUS

ACACIAE LIBERIA

C U T A C O D O F R P L O N C Q U E T

PRO CIVILI DILECTIONE RIBS ORNAMENTO

LAUREO DILECTIONE RIBS ORNAMENTO

I O H N N E S V A L T U N G S B O R S O

ACACIAE LIBERIA

ACACIAE LIBERIA



§. 1.


Nomen Emesia, sive Vomitus denotat expulsionem violentiam & fastidiosam materierum palpabilium ex ventriculo per œsophagum, & exinde per os, ac sœpe simul per narēs.

§. 2.

Differit itaque à *Ruminatione*, quam ab hominibus quoque peractam legimus ^{a)} eo, quod cum hac nec fastidium, nec violenti

a) Thom. Bartholinus Histor. anat. Cent. V. Hist. 16. De Unicornu cap. 2.
Eph. NC. Dec. I. A. IX. & X. Obs. 140. Fabricius ab Aquap. Opp. anat.
Phyf. P. II. fol. 137. De Haller Elem. Phyf. L. XIX. Seft. IV. §. 15. Hor-
stius Opp. II. p. 162. 167. Ludovici Opp. p. 1101. Morgagni De S. & e.
Morb. Ep. XXIX. art. 4. Peyer Merycologia p. 62. 220. Rhodius Centur. II.
Obs. 59. Salmuth Cent. I. Obs. 100. Sauvages Nofol. meth. T. H. p. 339.
Schurig Chylologia p. 381. Velfshius Epifagmat. 36.

A



lenti motus juncti sunt; Novi & ego aliquem, qui non sine voluptate repetitam manductionem ciborum ante deglutorum per motum spontaneum ex ventriculo revocatorum celebrabat, eosque denuo gustabat.

§. 3.

Differt à ructu, utpote materiem non palpabilem expellente.

§. 4.

Differt a rejectione illa aquæ ex gula, quam tamen El. Rud. *Camerarius*^{b)} Vomitum ex gula appellavit, cum ea non ex ventriculo, sed ex ipso modo œsophago prodire videatur.

§. 5.

Phænomena, ipsum Emesix actum vel antecedentia, vel concomitantia, vel subsequentia pro diversis speciebus morbi, aliisque circumstantiis multum variant: Communia omni fere vomitui observantur: Antecedens nausea, animi turbatio, sœpe usque ad Lipothymiam accedens, vultus mutatio quoad colorem qui jam in pallorem, jam in ruborem vergit, mutatio quoad sic dicta lineamenta, dysphoriam & ideam animæ nauseabundam significantia, caloris mutatio, horrores, gastralgia, quæ omnia tamdiu durant, donec omnes motus, omnia eo collimantia organa in molimen laboris angorisque plenum, ut *Gaubius* ait^{b)}, conspirent.

§. 6.

Ipse vomendi actus perficitur præcipue per ipsius ventriculi contractionem versus cardiam directam, quam sustinent motus spastici

^{a)} Disput. De vomitu aquæ ex gula. Tüb. 1686.

^{b)} Instit. Pathol. §. 797.

❀❀❀

spastici diaphragmatis, muscularum abdominalium, aliorumque, his succurrentium; Concurrunt fauces, & intestina, motum illum antiperistalticum promoventia, & ipsa partem materiarum excretarum suppeditantia. Concomitantur hunc actum, prout magis minusve violenter procedit, angor, vel prout ab evemeto, vel dysmeto perficitur, dyspnoea, clamores, faciei jam rubor & turgor, omniumque vasorum distensio manifesta, jam vero pallor, sudores tam universales, quam in primis frontis, nonnunquam singultus, & dolores abdominales.

§. 7.

Ad phaenomena pertinent in primis ipsa excreta, quorum fons varius est: Etenim & ipsius ventriculi contenta, & quæ ex proximis intestinis non modo, sed & nonnunquam ex renotissimo eorum tractu per motum inversum in eum congeruntur, dein & oesophagi, faecium, oris contenta per motus hosce everuntur; Prout itaque modo naturalia, modo preternaturalia ea contenta fuerant, jam haec, jam illa excreta observare licet.

§. 8.

Prodeunt hoc modo, quæ ante alimentorum nomine ingesta fuerant, liquores inquilini in cava ista effusæ, quandoque autem & plane insolita, heteroclitæ, ^{d)} ut, si his toris consignatis credere fas

^{d)} Marcellus Donatus, de Hist. med. mirab. L. II. cap. 5. Schurig, Chylog.
p. 487^o seq.

f) fas est, abortus, e) acus, f) animalia varia, g) bufones, h) catulus, i)
catus, k) limax, l) millepedes, m) mus, n) lacerta, o) larvæ, p)
insec-

e) Eph. NC. Dec. I. A. L. Obs. 108. quam observationem auctor ejus Maroldus
etiam peculiari Dissertatione \ddagger De abortu per vomitum reje $\ddot{\text{e}}$ to. Altd. 1669. pro-
mulgavit.

f) Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 169.

g) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 294.

h) Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 19. Borellius, Cent. III, Obs. 57.
Bresl. Samml. 1720. II. p. 437. 1721. I. p. 78. & ante. Eph. NC. Dec. I. A. L.
Obs. 103. A. II. Obs. 56. Cent. VIII. Obs. 84.

i) Breslauer Samml. 1721. p. 427. Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 63.

k) Eph. NC. Dec. I. A. L. Obs. 109.


l) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 85. Dec. II. A. X. Obs. 31.

m) Eph. NC. Dec. II. A. L. Obs. 98. Wall in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abb.
V B. p. 18.

n) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 157. Paullini Cent. II. Obs. 7.

o) Act. NC. Vol. I. Obs. 107. (aquatica.) Bartholin. Hist. anat. Cent. V. Hist. 94.
Bresl. Samml. 1722. p. 301. Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 311. Weikard ver-
trichtche Schriften. III B. p. 36. 131. Kleine Schr. p. 82. (aquatica five Triton.)
Observat. medica curios, de excretione vermis &c. Wolfenbütt. 1723.

p) Büchner, Miscell. 1727. p. 368. 1730. p. 1074. Eph. NC. Dec. I. A. IV & V.
Obs. 80. Dec. II. A. IV. Obs. 39. Dec. III. A. II. Obs. 201. Cent. I & II. Obs.
116. Frankische Samml. IV B. p. 64. Lister in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abb.
I B. p. 163. N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 362.



7

insecta, ^{q)} pisciculus vivus, ^{r)} rana, ^{s)} serpens, ^{t)} tulpa, ^{u)} vermes ^{v)} nec non carneae massæ, ^{w)} aliaque concreta, vel ex-
crescentiæ, ^{x)} clysmata ^{y)} & pessi, ^{z)} gypsum, ^{aa)} hydati-
des,

^{q)} Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 23. A. V & VI. Obs. 294. Cent. VII. Obs. 26.
Forestus, L. XVIII. Obs. 19. Jeffop in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abb.
I B. p. 162.

^{r)} Borellus, Cent. I. Obs. 9. Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 52.

^{s)} Bresl. Samml. 1718. p. 695. 1720. II. p. 440. Helwig, Observ. n. 92.

^{t)} Borellus, Cent. III. Obs. 31. Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 39. Dec. III.
A. V & VI. Obs. 159.

^{u)} Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 90.

^{v)} Anctores Plures. Rumlerus Obs. 100. Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 338.
(faccus verminofus.)

^{w)} Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. App. p. 829.

^{x)} Act. NC. Vol. II. Obs. 139. III. Obs. 80. Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 18.
Marcellus Don. L. III. c. 5. p. 247. Tulpius, L. II. c. 23. Zacut. Lusit. Prax.
admir. L. III. Obs. 115.

^{y)} Act. NC. Vol. I. Obs. 30. N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 38. Bartholinus, Hist.
anat. Cent. IV. Hist. 68. Borellus, Cent. I. Obs. 17. Camerarius, Memorab.
Cent. XIX. n. 84. Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 209. A. IX & X. Obs. 94.
Dec. II. A. V. Obs. 195. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 39. Fabricius Hild. Cent
VI. Obs. 70. Forbes in med. Comment. v. Edinb. IX B. I. p. 82. de Graaf, de
Clysteribus p. 195. de Haen, Rat. Med. P. II. p. 69. III. p. 95. VII. c. 4. § 1.
Lentilius, Eteodrom. p. 1021.

^{z)} N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 38. Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 84. de
Graaf, de Clysteribus p. 196. Marcellus Don. L. IV. c. 3. p. 312. ex Mat-
thaco de Gradu. Sennertus, Prax. L. III. P. II. S. II. c. 3. ex Guainerie, & Oethea.

^{aa)} Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 46.

des, ^{bb)} nummi, ^{cc)} pilii, ^{dd)} pus, ^{ee)} stramen, ^{ff)} stercorea ^{gg)} & urina. ^{hh)} Taceo ea, quae per modum fascinationis ingesta, & per vomitum iterum egesta abs credulis dicuntur.

§. 9.

Effectus emesiae pro re nata erunt modo salutares, modo noxi: Etenim per eam non modo evacuantur, quae proxime ventriculo & ex parte intestinis molesta, inimica erant, multorumque morborum fons & materies ita brevissima via ex corpore eliminatur, sed & ex irritatione, in ventriculum agente, sequitur uberior exhalatio & depositio liquoris gastrici, viscera abdominalia, praecipue sistema biliferum quatitur, & sine dubio per consensum irritatur: Thorax pariter vehementer concutitur, mucusque tenax in viis aëriteris & fauicibus haerens movetur, expellitur; Capitis vasa distenduntur, in aliis tamen & ex congesione ad abdomen deplentur; Circuitus universus promovetur, acceleratur, unde, ut & ex consensu, qui inter ventriculum & cutem, universum sistema nevicum, & omnes oeconomiae animalis partes

^{bb)} Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 60. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 167.
(Foccus hydatidosis.)

^{cc)} Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 47.


^{dd)} Act. NC. Vol. IV. Obs. 16. Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 178. Dec. III. A. II. Obs. 71.

^{ee)} Bresl. Samml. 1725. II. p. 99. Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 71. Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 28. Mayer, Diss. de Vomica lienali &c. Francf. 1787.

^{ff)} Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 31.

^{gg)} Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 150. Cent. I & II. Obs. 138.

^{hh)} Fabric. Hildan. Cent. V. Obs. 47.



partes obtinet, omnes fere secreciones & excretiones promoven-
tur: Systema vasorum absorbentium ad functiones suas sollici-
tatur, & circuitus post turbas sedatas fit aequabilior.

§. 10.

Altera ex parte autem etiam corpus per vomitus frequen-
tiores, habituales, chronicos succis nutricis privatur, exauri-
tur, vires labefactantur, uti ex jam recensitis effectibus jam
falus, jam perniciies exspectari debet.

§. 11.

Præter diversas scenas, aliasque varietates emesis, dantur
adhuc aliquæ tanti momenti, ut Nosologi minus cauti, funda-
menta verae morborum divisionis aut non rite perpendiculariter,
aut minus aëstimationes, eas pro differentiis specificis habuerint:
Sic omnino interest, an vomitus sint modo transitorii, an vero
habituelles, chronici, an sint periodici, nec indifferens est, quæ-
nam excreta per eos prodeant, quomodo aegrum afficiant,
quando & quibus in morbis accident, & sic porro: Verumtamen
hæc omnia non sufficiunt ad rite constituendas differentias, essen-
tiales, specificas, utpote quæ non nisi in diversitate sedis &
materiæ ponendæ sunt:

Illa quidem momenta ipsa ad veræ speciei dignitionem, uti
hæc ad formandas indicationes therapeuticas faciunt.


§. 12.

Ad hanc normam in serie specierum primo loco pugnanda
erit Emesia

Pathetica.

B

Res



Res omnibus nota, vomitus sequi posse iram, aliaque pathemata, unde imperium systematis nevrici affecti in ventriculum, omnemque oeconomiam animalem luculenter patet.

§. 13.

Phantastica.

Quem latet, imaginationem naufragis ideis affectam vomiturations, ipsosque vomitus cire & posse & solere? Ita asperitus rei fastidiosæ, invisæ, sordium, hominum vomentium, odores terti, abominabiles, narratio historiae naufragiorum effectum istum, saltem in sensilioribus edunt: Etiam tristes ideas eundem produxisse, legimus. a)

§. 14.

Sequitur Gasteropathica, cum ipse ventriculus immediate affectus, irritatus est. Hæc species plures comprehendit.

Sub species, ut

- 1) Pleroticam, cum quis alimentorum, et si optimorum nimiam copiam ingessit, vel & eam nimis avide, vel justo velocius devoravit; Cauffa irritans hic erit ipsa moles.
- 2) Acatartam, dyspepticam. Ingesta viribus digestiblibus, relative debilioribus non auscultantia, & assimilari recusantia, ut peregrina heteroclitia corpora irritabunt, eo magis, cum ista in sui generis corruptionem declinant, & tum ut naufragia, acria agunt.
- 3) Cacotrophicam. Inter ea, quæ ab hac illave gente, vel a quibusdam forte hominibus in materiam alimentariam recepta sunt,

a) Henr. ab Heer Obs. med. n. 26.

sunt, plura sunt, quæ non omnibus profundunt, & hoc respectu inter prava alimenta, quæ forte non nisi dura necessitas imperavit, numeranda sunt; hæc digestioni non parere, & quandoque ex innata acrimonia ut emetica agere, non est, quod mireris.

4) Phlegmatica.

Nimia muci copia ex vasis secernentibus ventriculi in ejusdem cavum deposita, quæ ipsa depositio statum illius præternaturale innuit, nauseam & vomitum ciere valet.

5) Biliofa.

Etsi non omnes humores, colore biliofo tincti, naturæ vere biliose sint, sed potius sæpen numero non nisi sanguinis resoluti, sub & in apparatu secretorio multum mutati soboles & producta sint, tamen vera bilis, sive naturaliter, sive præternaturaliter constituta facile in ventriculum per motum antiperistalticum agitur, & caussa vomitus evadere potest.

6) Atrabilaria.

Obscuriori hoc nomine recensenda est emesia, quæ ex stagnumtibus ante in systemate hepatico humoribus, jam vero resolutis, & una cum bile in ventriculum revolutis exoritur.

7) Putrida.


Materies putrida qualiscunque sive ingesta, sive inquillina, excitatis ideis naufeosis & ceu stimulus plane inimicus vim ventriculi reagentem excitare, & ad sui fugam compellere potest.

8) Pyica.

Pus, quoconque ex fonte haustum, & in ventriculum delatum, stimuli vices subire, emesiamque producere valet, v. §. 8.

B 2

9) Oxo-



9) Oxodes.

Acidum, sive purum, sive pituitæ inviscanti permistum, maxime id, quod intus generatur, saepius, præcipue in infantibus, vomitus ciet.

10) Zoica.

Animantia viva, quaunque via intravere, motu suo aliisque actionibus ventriculum laceſſere & non modo gasteralgiam, sed & vomitus ſalutares cauſari poſſunt. v. §. 8.

11) Toxicæ & Pharmatætica.

Pharmacæ, ambiguo nomine à Veteribus insignita, corpora, tam in perniciem, quam in ſalutem tendentia, plurima ita comparata ſunt, ut in ventriculum recepta vomitus cieant, quandoque non compescendos, adeoque hypercathartin, quin & ipſam mortem cauſantes: Sunt, quæ extero corpori applicata eundem effectum edunt, ut nicotiana b).

12) Exotica, Allotria.

Corpora plane peregrina, à natura humana aliena, qualia §. 8. recensuimus, ſtimulis ſuis mechanicis aliisque ventriculum ad emesiam convellere apta ſunt.

13) Miasmatæca & Pyretica.

Miasmata aliæque materiæ febriles pariter in ſtimulum cedunt, quotidiana experientia teste.

14) Dialytica.

Læſiones ventriculi ipsius, varizæ, ſolutio continua, parietes sive penetrans sive non, sive ab exteriori, sive ab interiori latere

^{a)} Eph. NC. Dec. II. A. II. Obf 188. Riedlin Lin. med. 1695. p. 100.

latere procedens, sive à mechanica vi fauiente, sive ab erosione, suppuratione &c. orta ventriculum adeo irritabit, ut crebri vomitus inde nascantur. Ventriculi lœsi, erosi, perforati, rupti, exempla plura allegare hujus non est loci.

15) Plegmasistica.

Inflammatio ventriculi præter alios effectus & hunc habet, ut sensiliter affectus ventriculus in vomitus ruat ^{c)}.

16) Gangrenosa.

Gangrena, sive subito, sive prævia manifesta inflammatione exorta, sive ex eadem enata, pariter vomitus quandoque comites habet ^{d)}.

17) Darsifica.

Excoriatio ventriculi, quibuscumque ex causis producta tam ventriculo impertitur sensibilitatem, ut ingesta quævis acriter sentiat, doleat, & sepissime per reactionem validam rejiciat.

18) Helcotica ^{e)}.

Pari modo ulcerosum statum, quacunque in parte ventriculi locum habeat, eundem effectum producere necesse est.

19) Carcinomatosa ^{f)}.

20) Arte-

^{c)} Morgagni De S. & c. Morb. Ep. XXX. art. 4.

^{d)} ibid. art. 16. Marcellus Donatus L. IV. c. 3. p. 310.

^{e)} N. Samml. med. Wahrnehm. II B- p. 203. (pylori)

^{f)} Morgagni De S. & c. M. Epist. XXX. art. 2.



20) Arterievrysmatica & Phlebevrysmatica.

Memorabilis omnino est hæc species, quæ ex vasis sanguiferis ventriculi præternaturaliter dilatatis oritur, siboles plerumque congestionum sanguinarum alias sic dictarum hemorrhoidum erronearum, vel & violentiarum, eo magis momentosa, quod symptomata eam comitantia in errorem diagnoseos ducere possunt, ac si ventriculus materiis evacuandis oppletus esset, quæ tamen indicatio hic tantum abest, ut locum habeat, ut potius valde nocivos effectus exinde resultare necesse sit.

21) Cum proxime præcedenti multum convenit Symphoretica:

Adfuit hic vasa oppleta, expansa, quandoque infarcta; & subdividitur hæc species in

- a) Haemischeticam, ut ex suppressis menstruis ^{g)},
- b) Arthriticam, cum podagra, aliæve arthritidis eruptions per congestionem introsum versam ventriculum affligunt ^{h)}.
- c) Metastaticam. Sive pus ⁱ⁾, sive aliæ materiae morbiæ fuerint, huc determinatae, ipse ventriculi membranae iis affecte stimulum emeticum experiuntur.
- d) Helcoxeroticam. Etiam hæc cum priori præcedenti multum convenit ^{k)}.

e) Ischu-

g) Horstius Opp. II. p. 292.

h) Default sur la goutte p. 213. Stoll Rat. Med. P. V. p. 461.

i) Dachs in Harlem. Abhandl. v. Auserl. Abhandl. für praktische Aerzte. I B. III St. p. 69.

k) Riedlin Lin. Med. 1695. p. 295.

e) Ichuricam. Ita vomitum urinosum allegat *Sauvages*¹⁾.

- 22) Alius naturæ est Stenochorica, sive
a) Cœliaca.

Ventriculus quoad cavitatem suam angustatus^{m)}, contenta vel potius continenda per justum digestio[n]is tempus retinere non poterit, eaque brevi rejicit.

Sive b) Pylorica, cum pylorus modo angustatus estⁿ⁾: Obſtaculum, quod contenta, transitum per eum molientia experiuntur, regurgitare ea faciet, & motus antiperistalticus, ab irritato obſtaculi punc̄to inchoans in vomitus erumpet.

- 23) Opposita huic est Evrysmatica^{o)}.

Nimia hujus visceris expansio, & status evrysmaticus per ſe quidem emefiae favere non videtur: Testimonium autem Observatorum rem extra dubitationis aleam ponit: Dilatati ejusmodi ventriculi ſimul extenuati in membranis suis ſunt, & ſic facile majorem ſenſilitatis & irritabilitatis gradum acquirunt.

- 24) Thliptica.

Omne obſtaculum, justam ventriculi expansionem prohibens, eique, ſive perpetuo, ſive tantum a cibis diſtento ſeſe oppo[n]ens, adeoque thliptin efficiens, irritabit tunicas, & vomitum dabit. Hujus census ſunt:


a) He-

1) Nofolog. Meth. P. II. p. 344.

m) Act. N. C. Vol. IV. Obf. 101. Foreftus L. XVIII. Obf. 34. Rhodius Cent. II.
Obf. 63. Sauvages Nof. Meth. P. II. p. 340.

n) v. infra ad Speciem: 27.

o) Anderson in Med. Comment. v. Edinb. II B. p. 302.



- a) Hepatica & Cystica. p)
- b) Splenica. q)
- c) Pancreatica. r)
- d) Epiploica. s)

Non negamus, etiam consensum hic potenter operari posse,
verumtamen thlipsis majorem culpæ partem habebit.

- e) Angievrysmatica. t)
- f) Oncodes.
- g) Steatomatica. u)
- h) Inter thlipticas numero quoque Celicam, quæ ab ipso ventriculo in herniam capto procedit. Gastrocelicum vomitum appellat *Sauvages*. v)
- i) Chondrica, sive ea, quæ à cartilagine xiphoidæ luxata, vel introfusum versa oritur.

25) Pa-

p) Default sur les malad. vénériennes p. 237. Eph. NC. Cent. III. & IV. App. p. 147. Eyerel Syloge Obs. IV. p. 42. Portal mémoire sur quelques maladies de foie. v. Med. Comment. v. Edinb. X. B. II. p. 77. Selle N. Beiträge III B. p. 115. (à cholelithis.)

q) Selle, N. Beitr. II B. p. 41.

r) Bader, Observat. n. 23. Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 13 L. Cent. VIII. Obs. 20. de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 20. Morgagni, De s. & c. Morb. Ep. XXX. Art. 7. 10. 12.

s) Huxham in Philos. Trans. v. Leske Augerl. Abhandl. II E. p. 73. Opp. III. p. 8. (steatomatosum.)

t) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 75.

u) Bader, Observat. n. 42. (thlipsis pylori ex co.) Eph. NC. Cent. VI. Obs. 16. (melesterii.)

v) L. c. p. 342. species 18.

25) Paratopica, cum ventriculus sede sua depulsus est. w)

26) Sequuntur eae, quae abs Exallaxi, seu mutatione membranarum ventriculi nascuntur, quorundam pertinent:

Leptohymenica. x)

27) Chondrogenes. y)

28) Scirrhosa, Tylotica. z)

Principue in censem venit vitium hocce quoad pylorum; qui per id angustatus contentorum exitum in duodenum præpedit, vel plane recusat.


29) Ge-

w) Bader, Observat. n. 23.

x) Aet. NC. Vol. IX. Obs. 106.

y) Hochstetter in med. Wochenblatt 1783. p. 123. Stell, Rat. Med. P. III. p. 356. 385. 401. Sayon in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhand. III B. p. 54.

z) Aet. NC. Vol. IV. Obs. 107. (durities scirrhosa circa pylorum.) VI. Obs. 151. (tumor scirrhosus pylori.) Bader, Obs. 47. (pylorus scirrhosus.) Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 47. (callus pylori.) von Berger in Aet. Soc. Med. Havn. Vol. I. (pylorus.) Cloppius, Obs. miscell. n. 11. (scirrus ventriculi.) Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 101. (pylori scirrhus.) Obs. 131. (scirrus pylori & pancreatis.) A. VIII. Obs. 133. (pylori scirrhus.) Cent. VIII. Obs. 20. Cent. X. Obs. 10. de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 13. (pylorus.) Harder, Apiai. Obs. 62. (pylorus.) Marcellus Don. L. IV. c. 3. p. 314. (pylorus.) Morgagni, de s. & c. M. Ep. XXX. Art. 14. (pylorus.) LXV. Art. 3. (pylorus.) Oosterdyk, v. Auserl. Abh. für pr. A. VIII B. p. 613. Pezold, vom verhärteten Magenmund. Richter, Caput pylori callosi. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 131. p. 418. V. B. p. 468. (pylorus.) N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 131. (pylorus.)



29) Gerontica. a)

Etiam hæc, saltem ex parte, à mutatione substantiæ pendere videtur.

30) Spastica.

Objici posset, omnes emesias esse spasticas, id quod omnino negari nequit: Verumtamen sunt, quæ à meris spasmis ventriculo ipso cæteroquin non affecto procedunt, ideoque etiam pathetica atque phantasticæ hic locus fuisset, nisi, cum psychicæ sint, primum iis locum assignare potius placueret.

Ad spasticas referendæ erunt:

a) Hyperæsthetica, b) sive ab hyperæsthesia universali producta: Sensorium internum, quatenus per universum hominem regnat, levissimis sepe ex occasionibus in hyperæstheticis, quos alias hypochondriacos, hystericas vocant, graviter afficitur, & in turbas ruit vix compescendas, inter quas etiam vomitus occurunt.


b) Sympathica, & quidem

a) Encephalica.

Sin-

a) Lentini, Memorabil. &c. p. 126.

b) Sauvages, Nosol. Meth. l. c. spec. 9. Vomitus hypochondriacus. Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 182. Craufius, Diff. de vomitu hypochondriaco. Jen. 1692. Lentilius, Iatromnem. p. 61. 220.




Singularem casum refert *Platerus*, ^{c)} de homine, cui post caput amputatum, ex oesophago resciſſo vomitus procedebant. Ipsa encephalica species iterum subdividi potest in

- Stomachorum* (d).
- 1) Anafisticam.
 - 2) Travmaticam.
 - Veritas harum specierum Lippis & tonsoribus nota est.
 - 3) Dinoden.
- Vertigo, quacunque ex cauſa inducta, ut ex navigatione, ^{d)} fæpissime emesiam efficit.
- 4) Isthmicam & Pharyngeam, & quidem
 - a) Gargalicam.

Quicquid fauces vel pharyngem levius irritat, titillat, experientia teste vomititiones ciet, vomitus ipsos promovet, & provocat, five sint corpora peregrina,

e) Obs. L. III. p. 803.

d) Eph. NC. Dec. III. A. V. & VI. App. p. 111. Ludwig, Diff. de vomitu navigantium. Lips. 1738. Schorler, medic. Peregrinant. p. 135. Thieffen, Diff. de morbo marino. Regiom. 1721. Vater, Diff. de morbis claffiariorum & navigantium. Witeb. 1715.



grina, sive phlegma partibus istis adhærens, incautis quandoque erroneam indicationem emeſeos offerens.

b) Stenochoricam?

Sauvages vomitus ab oesophago obſtruēto exempla & testimonia plura affert, e) quaē autem potius ad Dyscatabroſin ſpectant: Adeoque dubitanter modo hanc ſpeciem propono.

f) Diaphragmaticam.

Muſculus hicce, diaphragma, magnas in vomitu excitando partes habet, ejusque ergo irritatio, etiam conſensualis, eum provocare valet.

6) Splanchnicam.

Viscera, cavo abdominali contenta, multifariam affecta etiam hoc reſpectu ad morbum noſtrum concurrunt.

7) Nephricam & Cyſticam. f)

Præcipue renes & vesica urinaria vario modo patientes eo faciunt,

8) Or-

e) L. c. Spec. 21.

f) Morgagni, l. c. Ep. XXX. Art. 22. Ep. XXXVI. Art. 20. Selle N. Beitr. III B. p. 114.

8) Orchicam.

Sensibiles valdopere testes, morboſe affecti, vel & accidentaliter laſi eodem modo id efficiunt, de quo ſermo eſt.

9) Aphrodiſiacam.

Observatio *Hertodii*, ^{g)} foeminam prodiuit, cui coitus ſemper vomitus excitabat, ſive vacuo, ſive pleno ventriculo exerceretur.

10) Cyeticam. ^{h)}

Gravidarum vomitus maxima ex parte confensu tribuendos eſſe, facile patet.

11) Odonticam, Dysodontiacam.

Dentium vitia irritantia, præcipue gravis eruptio dentium tantas ſæpe turbas confensuales cident, ut & vomitus inter eas numeres: Concurrit quidem in infantibus acris, quam deglutiunt, ſaliva, pharmaci stimulantiſt instar agens.

12) Perial-

g) Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 4.

h) Camerarius, Diff. de vomitu gravidarum. Tub. 1682.



12) Perialgicam.

Dolor partis cuiuscunque gravior, in sensilioribus faltem
idem efficiet; sic vomitus ex manus distorsione legimus. ⁱ⁾

13) Cineticam. ^{k)}

§. 15.

Alium Subspecierum manipulum comprehendit

Enteropathica.

Ordo naturae vult, ut contenta ventriculi in & per intestina
transeant, ita, ut absorptis in via utilioribus & fluidioribus,
craffiora ad locum ejectionis perveniant; Quicquid ergo hoc iter
praepedit, motus antiperistalticos, & eo ipso vomitus ciebit.

Erunt autem hæ:

1) Emphractica.

Materiz sive solidiores, sive aliæ, canalem intestinalem vel
in uno modo loco infarcientes, ibi obstaculum figent, & ex
hoc irritationis punto retrogradi spastici motus inchoabunt.

2) Ste.

i) Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 69.

k) de Büchner, Diff. de nausea & vomitu eorum qui curru vehuntur. Hal. 1751.

2) Stenochorica.¹⁾

Etiam imperfectæ stenochorix effectum hunc in irritabilioribus edent.

3) Thliptica.

Prefatio mechanica, extus in parietes intestinalorum operans, diametrumque canalis alicubi sive delens, sive imminuens hunc effectum producit. Thlipticæ subspecies erunt:

- α) Phylconica, ex visceribus abdominalibus tumidis, aliquisque tumoribus in hoc cavo enascentibus. ²⁾
- β) Celica, ex herniis intestinalibus, ubicunque locorum fint.
- γ) Parafactica, sive ex intussusceptione.
- δ) Chordapsica, sive ex volvulo.

4) Symphytica;

Coalitus intestinalorum vel in exiguo loco, parietes uniens vel in saccum cæcum ea terminans ³⁾, insuperabilem resistentiam motui peristaltico opponet.

5) Spastica:

Multiplici ex fonte orientes spasmi, intestina afficientes, ea non modo occludere, sed & simpliciter antiperistalticum motum cire possunt.

§. 16.

(1) Morgagni, de s. & c. M. Ep. XXX. Art. 12. XXXIX. Art. 21-29. Stalpart van der Wiel Cent. I. Obs. 56.

(2) Eph. N. C. Cent. VI. Obs. 16. (steatoma mesenterii, ventriculum premens).

(3) Finek Gallenkrankheiten p. 280.



§. 16.

Denique, cum musculi abdominales cum diaphragmate, & præcipue posterius tam per se, quam per consensum ita in ventriculum operari valeant, ut hic inde prematur, irritetur, & ceteris paribus in vomitum agatur, dabitur quoque species

Myopathica & Diaphragmatica, & quidem

- 1) Thliptica, quæ præcipue ad diaphragma spectat.
- 2) Phlegmistica, ex inflammatione, & ultimo loco
- 3) Spastica.

T A N T U M!

01 A 6631

ULB Halle
002 934 922

3



5b



26

DISSE^TAT^O IN^AUG^UR^ALIS MEDICA
DE
E M E S I A
SISTENS
EJUS DIFFERENTIAS ACCIDENTALES, AEQUE AC ESSENTIALES,
SIVE SPECIFICAS.

QUAM
RECTORE UNIVERSITATIS EBERHARDINO-CAROLINÆ
MAGNIFICENTISSIMO
SERENISSIMO DUCE AC DOMINO
DOMINO
C A R O L O
DUCE WIRTEMBERGIAE ET TECCIÆ REGNANTE,
REL. REL.

CONSENSU FACULTATIS MEDICAE
PRAESIDE
GUILIEL. GODOFR. PLOUCQUET,
PHILOS. AC MEDICINÆ DOCTORE HUJUSQUE PROFESSORE P. O.
PRO GRADU DOCTORIS RITE OBTINENDO
PUBLICO ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT
DIE JULII MDCCXCI.
IOHANNES VALENTINUS BOESCH,
NESSLAVIO - TOGGENBURGENSIS.

T U B I N G A E
T Y P I S S C H R A M M I A N I S.