

50 R.

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICO-CHIRVRGICA
 QVA
 CASVS OPPIDO RARVS
SARCOMATIS
 E PVDENDO MVLIEBRI SECTIONE SVBLATI
HISTORIAM
 CONTINENS
 PRAESIDE
ABRAHAMO VATERO
 PHIL. ET MED. DOCT. ET PROF. PVBL.
 ANAT. ET BOTAN. SVBSTITVT. VT ET SOCIET.
 IMPER. NAT. CVR. ET REG. BRITANN.
 SODALI
PRO GRADV DOCTORIS
 MORE MAIORVM OBTINENDO
 D. MART. M DCC XXVIII.
 H. L. Q. G.
 AD DISCEPTANDVM EXPOSITVR

IOH. DANIELE BEHRENSIO
 TORGAVIENSI
 MEDIC. PRACT.




Apud VIDVAM GERDESIAM.

EXPLICATIO FIGVRAE

*Repraesentatur hac Figura Sarcoma insigne, ex
uagina uteri, praemissa ligatura, resectum.*

- A. Totum Sarcoma, a parte postica uisum.
- B. Collum tenuius, duorum digitorum transuersorum crassum, ubi resectio facta.
- C. Corpus rotundum musculosum, e tumore promiens, uterini inuersi, ut fundus inferius, collum superius situm uideatur, figuram quodammodo referens.
- D. Sectio per medium eius facta, ut interior substantia, quae tota ex fibris carnosis orbicularibus, cum intermixtis copiosis vasorum sanguiferorum dissectorum orificiis, componitur, oculis exponatur.
- E. Pars reliqua Sarcomatis mollior, ac quasi lobosa, uaginæ uterinae substantiam referens, corpus musculosum sustinens.
- F. Situs inter corpus musculosum et reliquam Sarcomatis partem.
- G. Sulcus in corpore musculofo obuius.



PERILLVSTRI
EXCELLENTISSIMOQVE DOMINO
DOMINO
GOTTLOB
HIERONYMO
DE LEIPZIGER
DYNASTAE IN HEYDE ET
KNATEWITZ
POTENTISSIMI POLON. REGIS
ET ELECTORIS SAXONIAE
MINISTRO STATVS INTIMO
SVMMI PROVOCATIONVM SENATVS
PRAESIDI EMINENTISSIMO
DOMINO ET MAECENATI
MEO GRATIOSISSIMO
SALVTEM, ET PERPETVAM FELICITATEM!

PERIFFA STRI
EXCELENTISSIMA DODOM
DOMINO
GOTTOB
HIERONYMO
DE LIPSIER
TINYASTAE IN HEYDE ET
KINATWITZ
POLONIAE REGIS
ET ELECTORIS SAXONIE
MINISTRA STATU INITIO
SUMMA PROVOCATIONIS DEUTSCHAS
PRAESIDI EMINENTISSIMO
DODOMO ET MAGDEBVRG
MODO GRATIOSISSIMO

PERILLVSTRIS ATQVE EXCELLENTISSIME DOMINE

Quo maiora atque luculentiora, DOMINE PERILLVSTRIS, MAECENAS GRATIOSISSIME, gratiae TVAE ac munificentiae in me meaque studia fuerunt documenta; eo maiori animi ueneratione PERILLVSTRE NOMEN TVVM non solum semper prosecutus sum, sed eo etiam enixius in eo mihi elaborandum esse duxi, ne magno TVO patrocinio me indignum praestem, aut ingrati animi crimen incurram. Ut igitur pium gratumque animum publice testatum faciam, nullus dubitaui, quin PERILLVSTRI NOMINI TVO hoc qualecunque academicum specimen offerrem atque inscriberem. Spero non solum, sed et confido, fore ut, hanc meam audaciam, ad quam singularis TVA, PERILLVSTRIS DOMINE, gratia, nec

non admiranda humanitas me prouocarunt,
non in malam partem sis interpretaturus.
Hoc est, quod abs TE, PERILLVSTRIS DOMI-
NE, omni, qua decet, animi summissione pe-
to atque contendo, ut et in posterum TVO
patrocinio me dignari uelis. Ad me quod at-
tinet, summum, quod dirigit omnia, NVMEN,
indefessis defatigabo precibus, ut TE, cum
tota TVA PERILLVSTRI FAMILIA ad
feros usque posteros saluum atque incolumem
seruet, quo tota, quam late patet, Saxonia de
saluberrimis TVIS consiliis, diu multumque
sibi gratulari possit.

PERILLVSTRIS EXCELLENTISSIMI QVE NOMINIS TVI

Vitembergae X. Cal. April.
cicccc xxix.

HVMILLIMVS CVLTOR
JOHANN DANIEL BEHRENS.



Q. D. B. V.

Nterus foeminius, uti tum ob
structuae elegantiam, tum
ob officii praestantiam, si-
quidem officinam genera-
tionis ac formationis foetus
constituit, merito inter
praecipua sexus sequioris organa refertur: ita si
myriades morborum ex ipso oriundorum, ac
miserrimas foeminas immaniter excruciantium
consideramus, non iniurius in ipsum quis erit, si
fentinam corporis perniciosissimam ac lernam
innumerabilium malorum eundem dixerit.
Hunc equidem in passionibus ita dictis hysteri-
cis, modo ascendere, modo descendere, nunc
intra fauces irruere, nunc iterum in abdomen
deuolui, aut per uniuersum corpus discurrere
et oberrare, cum mulierculis, sensu globi ex
abdomine uersus fauces ascendentis, deceptis,

A 3

mini-

minime credendum est. Consensus enim cum omnibus uisceribus internis, ac cum toto corpore omnium istorum symptomatum atque innumerarum praeterea aegritudinum hinc inde superuenientium causa est, adeo, ut, censente *Casp. a Reies in Camp. Elys. iuc. Qu. XLVI.* nullus fere sit morbus, qui a conspurcatissimo uteri fonte, uti idem loquitur, dimanare non possit, idemque propterea minera malorum merito sit appellandus. Dudum iam e foro Medico profligata est fabula, qua ueteres sensum, appetitum motumque animalem utero tribuerunt, ut idem odoriferis gratis, naribus applicatis, uersus fauces allici, a graueolentibus uero et foetidis repelliri, in fugam uerti, et ad pristinum locum occupandum cogi posset. Sat abstone propterea a *Roderico a Castro de Morbis Mulierum L. II. Cap. XVI. p. 266.* ad uterum prolapsum repellendum commendatur, ut cauterium actuale ignitum manu ostendat Medicus aut obstetrix, ac simulet partem se tangere uelle, uel si mulier timidiuscula sit, uiui mures filo ligati cruribus repente submittantur, ita enim naturam retrahi, et cum ea uterum, aut quamcunque aliam partem prolapsam. Quamuis uero uterus proprio nisu nullatenus se mouere, aut e loco suo discedere queat, idem tamen a uariis

uariis iniuriis e sede sua turbari ac ad inferiora propelli aut trahi potest, ita, ut non raro una cum uagina sua euersa sinum pudoris ingrediatur. Sed non omnem tumorem e uagina prodeuntem, ad uteri prolapsum referendum esse, e sequentibus paginis palam fiet, quibus casum rarissimum, et ob plurimas circumstantias curiosissimum, Sarcomatis insignis, prolapsum uteri mentientis, sectione sublati historiam continentem, in praesenti Lectori exponimus.

CASVS.

Foemina XLVIII. annorum, septem liberorum mater, ac ante septem annos ultimum perpera, a tribus annis, haemorrhagia uteri laborare coepit. Illa sumptibus necessariis destituta, malo huic nihil, praeter remedia domestica, opposuit, ac praeterea laboribus durioribus gestationibusque ponderum, unde haud dubie affectum hunc primum contraxerat, indulxit. Factum ita est, ut fluxus hic molestus frequentius rediret, indiesque augeretur, et quandoque aliquot librae sanguinis fluidi et grumosi unica uice confertim effunderentur. Elapsis, inter copiosas sanguinis profusiones, duobus circiter annis, illa tumorem intra uaginam percepit, qui sensim auctus totum sinum pudoris reple-

repleuit, tandemque e pudendo protuberauit, et premendo uesicae collum et intestinum restringit, obstructionem alui, urinaeque difficultatem, cum grauissimis lumborum doloribus excitatuit, nec tamen ulla ratione ab illa repellit potuit. Quid fit? Foemina sibi consulere nesciens, nemine ob pudicitiam intempestiuam in consilium uocato, pro ea, qua pollet, animi fortitudine, ne dicam audacia, cultrum arripit, partemque tumoris prominentem pugni magnitudine refecat, mira opportunitate, quia ob corruptionem, nulla inde secuta haemorrhagia. Hoc autem facto, pressio dolorosa non remittit, uti sperauerat, potius augetur, et accendentibus conatus, parturientium similibus, postridie inter excretionem aluinam, subito prorumpit massa, capitis magnitudinem excedens, insigni foetore, quia semiputrida fuit, et pondere tractione ad inferiora, molesta. Vrgebat praeterea urinae suppressio, quam, non nisi digitis sub pube intrusis, reddere potuit, ab hac etiam super tumorem desflente ardor insignis excitabatur, et inflammatio in tumore augebatur, adeo, ut totum pudendum sub eodem crescente absconderetur. In tantis angustiis constituta nostra, necessitate cogente, demum a Chirurgo auxilium petit. Hic statim epithematisbus inflamm-

inflammationi et putredini resistentibus curam
agreditur, quibus per aliquot dies usurpatis
rem eo redigit, ut tumor quodammodo detu-
mesceret, ac sinus pudoris, antea sub eodem
latens, conspici posset. Nunc etiam patuit,
totam illam massam a collo tenuiori, coloris al-
bicantis, duorum digitorum crasso, e uagina
suspendi. Sinus autem pudoris adeo arctus ac
intus repletus fuit, ut digitis circa ceruicem tu-
moris ductis ac intrusis, nullus intra uaginam
daretur aditus, nemoque aliter existimare pos-
set, quam uterum una cum uagina inuersa elas-
psum esse. Cum ergo nulla repositionis spes
superstes esset, nihil suit reliquum, quam ut tu-
mor semiputridus ac gangraenae proximus, tra-
ctione ac foetore insigni molestus, sectione tolle-
retur, quam tamen Chirurgus, grauitatem ne-
gotii pensans, proprio ausu suscipere noluit,
meque propterea in consilium adhibuit. Po-
stequam omnes circumstantias mecum repu-
tasse, tumoris magnitudinem, aegraeque sta-
tum, quae, praeter praegressam sanguinis iagu-
ram, in praesenti a calore praeternaturali, in-
quietudine ac uigiliis uiribus penitus exhausta
uidebatur, ob metum haemorrhagiae timen-
dae, sectionem primum disuasi, ne forte fini-
ster rei euentus, ac obitus foeminae, morti, uti
apparebat, alias proximae, curae tribueretur.

B

Nihilo

Nihilo tamen secius, tumore ad sphacelationem properante, ob quam femoribus contactu maculas nigras impresserat, aegrae, liberationem anxie efflagitanti, ac nisi cito auxilium feratur, resectionem propriis manibus peragendam minanti, morem gessimus, quia in casu ancipiti, anceps potius, quam nullum remedium adhibendum fuit. Quamobrem, foemina ad omnem euentum praeparata, sine temporis iactura ad sectionem accessimus, et traiecta per ceruicem acu, filo incerato instructa, ligamentum inieci-
mus, posteaque sub ligatura tumorem abscedi-
mus. Euentus uoto respondit, et operatio ex animi sententia peracta fuit, nulla inde haemor-
rhagia uel alio symptomate insequente. Foemi-
nam postea in lecto quiete repositam, medica-
mentis internis cordialibus, exterius epithemati-
bus, inflammationi et putredini oppositis mu-
nivimus. Vagina uteri, antea ad exteriora tra-
cta, cum ligamento applicato paulatim in lo-
cum pristinum recessit, ut nunc digitos sine ne-
gotio intra pudendum immittere, nec tamen fi-
nem attingere liceret, manifesto indicio, tumo-
rem e supraea uaginae regione descendisse.
Praeterlapsa ita una alterae septimana, aegra
sensim ad se rediit, uiresque amissas recupera-
uit, lentoque gradu incedere coepit. Remansit
nihilo-

nihilosecius intus dolor pressorius, tumorque pedum oedematosus, antehac iam praesens, indies incrementa sumpsit, nec adhibitis remediis anticacheeticis cessit, accidente insuper per interualla haemorrhagia copiosa, hydrops perfectus imminere uisus est. At quid fit? elapsa fere dimidio anno, foemina in uagina quicquam pressione molestum percipit, quod digitis intruis extractum, uinculum applicatum, maturatione paulatim liberatum, esse cognouit, nobisque exhibuit. Ab illo tempore tota rerum facies mutata est, foemina nunc optime ualet, in praesenti obstetricis munus Coswici suscepit, de nullo accidente amplius conqueritur, saltem quod pallor faciei de morbi superati magnitudine testetur. Notatu dignissimum autem in primis est, illam, aetate satis prouectam, post tot tamque largas sanguinis profusiones, fluxum mensium regularem modicumque nunc experiri.

THES. I.

Habes ita, Lector beneuole, historiam Sar-
comatis e pudendo muliebri feliciter ex-
secii. Accedo nunc ad descriptionem ipsius
tumoris, ut patescat, ad quodnam genus idem
referri debeat. Eo consilio totam molem no-
biscum abstulimus, ut eam domi accurate per-

B 2

lustrare

*Surcomatis
abscissi de-
lineatio.*

Iustrare possemus. In latere anteriori, quod oculis ante refectionem patebat, ob corruptionem nihil distincti uidere licuit, referebat enim rudem atque deformem massam. Sed tumore inuerso, ut facies posterior, antea uisum fugiens, luci exponeretur, in admirationem coniecti sumus, cum uideremus, e medio ipsius promovere corpus oblonge rotundum, substantiae a reliquo tumore diuersae ac musculofae, uteri inuerso ordine elapsi figuram haud obscure exhibens, ut ex icone in fronte huius dissertationis posita patet. Inferius enim rotunditate cum fundo uteri conuenit, superius uero attenuatur, ac in collum angustius, substantiae albicantis ac tendineae terminatur, unde suspensa fuit tota moles, et quo loco resecta fuit, quod collum uteri quodammodo repraesentat. Admiratio nostra non parum aucta fuit, ubi, sectione in corpus illud musculosum iuxta longitudinem facta, interiora eius lustrauimus. Constat quippe idem ex fibris carnosis orbicularibus, ac, quod praeprimis attentionem meretur, per totam substantiam hiant orificia vasorum sanguiferorum dissectorum copiosissima, qualis est uteri transverse secti facies. Adhibita tamen omni diligentia, nihil ouariis aut Tubis Fallopianis simile detegere potuimus, imo sectione repetita, eandem

dem ubiuis texturam internam, nullam uero intus cavitatem inuenimus. Reperitur autem a latere corporis musculosi insignis cavitas seu sinus oblongus et profundus, istud a reliqua tumoris parte seiungens. Residua Sarcomatis substantia, corpus musculosum ambiens et sustinens, ab hoc plane diuersa, consistentiae laxioris, mollioris, ac lobos et rugas monstrans, ut aliter iudicari non possit, quam eandem esse uaginae rugosae portionem. Pondus totius molis, expurgatis omnibus impuritatibus, est duarum librarum. Tandem etiam sciendum, Sarcoma, multo minori, quam naturali, magnitudine in figura exhiberi.

THES. II.

Antequam ad indagationem naturae atque originis sarcomatis huius, ac ad considerationem singularium in casu praefente concurrentium circumstantiarum nos accingamus, monendum est, admodum magnam esse uarietatem tumorum, e pudendo muliebri enatorum, tum ratione loci, ubi excrescunt, tum ratione consistentiae, magnitudinis, cauarum, aliarumque conditionum. Ita pudendum externum, in primis labia intumescunt ab inflammatione, oedemate, uel etiam abscessu, aut ubi in hernia inguinali intestina per processum uaginalem

*Tumorum e
pudendo
muliebri
enatorum
uarietas.*

*In pudendo
externo la-
biis, clito-
ride, et
Nymphis
orti.*

B 3

perito-

peritonei intra eadem elabuntur. Praeterea ex cute labiorum aequae ac montis ueneris, eadem superius coniungentis, nascuntur tumores, exiguo principio, sub forma uerrucarum, in enormem quandoque molem excrescentes. *Adnascitur interdum inquit Seuerinus Med. Effig. p. 119.* alis pudendi muliebris tuberculum, principio pulsuum, deinde magnis incrementis auge scens, molle, concolor, contredatu modisque ferme omnibus indolens. Scorto propendebat in labio pudendi minoris pineae magnitudine tuberculum, basi minore, quam altero extre mo pendulum, quod uno iam anno sic ex paruo intumuerat. Constrictum vinculo die uno ac tantum non stupefactum, postridie resecui, cute circumplexum crassissima, plus media digiti latitudine. Tuber scirrhosum excidit *Marchettis*, cucurbitae magnitudine, quod superius ossi pubis adhaerens, utrumque pudendi latus, rimamque ipsam uelabat, pustulis scatens malignis, ad radicem exulceratum, uti testatur *Bonet.* *Mercur. Compital. L. XVIII. p. 737.* Enormis istiusmodi tumor pondere XII. libras superans e labio dextro mulieris resectus, describitur in dissertatione, sub Praef. Parentis An. MDCXCIII. habita, qua Historia et Cura Sarcomatis monstrosi et cancrosi exhibetur. Praeter hos tumores ex labiis protuberantes, ex ipso pudo-

pudoris sinu externo, Clitoris atque Nymphae intumescentes et elongatae exteriora uersus propendent, adeo, ut interdum Sectione remoueri debeant. Omnes tamen haetenus enumerati tumores cum nostro Sarcomate nihil commune habent, utpote quod non e pudendo externo sed ex ipsa uagina in lucem prodiit.

T H E S. III.

E uaginae uteri cauitate egressi tumores tam non unius eiusdemque generis sunt, E uaginae propullantes. sed admodum diuersi, quamuis ueteribus nomine prolapsus uteri ueniant. Vagina ipsa uteri, Vaginae ipsius inuersio- uti est canalis oblongus, a sinu pudoris ad orificium uteri internum usque, intestini tenuis instar, expansus, ita illa aequa, ac intestinum retum, inuersione duplicata pudendum non raro egreditur, et tumores insignes exterius propendentes efformat. Firmiter quidem illa constitutur anterius collo uesicae urinariae, posterius intestino resto ac superius orificio uteri interno, ut ista uix loco moueri posse uideatur; nihilo tamen secius, ut longitudo eius naturalis non excedat sex uel septem digitos transuersos sine distractione, fibrae tamen illius relaxatae adeo elongari possunt, ut illa prolapsa quandoque ad genua usque propendeat. Facit huc praepritis substantia ipsius membranosa et musculosa,

ac

ac inferius rugosa, ob quam tantae distensionis,
tum in latitudine, pro transmittendo foetu in
partu, tum in longitudine, in prolapsu, apta est.
Sed nunc oritur quaestio, utrum uterus, uaginae
iuxta orificium firmissime connexus, semper et
necessario simul extrahatur, an uero prolapsus
uaginae fieri queat, utero in loco suo naturali
permanente? De prolapsu uteri ipsius, tanto-
pere controuerso, in sequenti Thesi dispicie-
mus, nunc saltem quaeritur: utrum semper una
cum uagina excidente e corpore extrahatur?
Monendum autem ante omnia, distingui debere
prolapsum uerum uaginae a tumoribus praeter-
naturalibus, in uagina e tunica interiori uel ru-
gis ipsis intumescentibus enatis, qui non raro
inspicientibus imposuerunt, ut illos prolapsum
uaginae uel uteri ipsius crediderint, de quibus
in subsequentibus pluribus agemus. Praeterea
non semper tota uagina inuertitur ac prolabitur,
sed tantum portio eiusdem siue inferior, siue
etiam in uno tantum latere, quo casu non abso-
lute necessarium esse iudico, ut uterus simul
exeat. Vbi uero tota uagina inuertitur et ad
exteriora elabitur, fieri certe non potest, quam
ut collum uteri, huic firmissime alligatum ad in-
feriora rapiatur, fundus uero libere in pelvi
fluettuans, tanquam pars magis mobilis, sequa-
tur.

tur. Neque tamen semper uterum simul extra pudendum egredi, nisi prolapsus nimis enormis sit, sed, uagina licet prolapsa, intra pubem subsistere, suadet non tantum ratio, sed et exemplum foeminae a Pechlino L. I. Obs. XX. adductum, quae uehementi et uasta uaginae procidentia laborans, remedium optimum in grauiditate inuenit, cum qua ipsa lente tumor retractus fuit, mox iterum ad partum redditurus. Idque tanto magis contingit, quando obstaculum quoddam egressum uteri impedit, uti testatur casus *in dissertat. de Grauiditate apparente a me expositus*, ubi tumor ouarii enormis impedimento fuit, quo minus uterus a uagina prolapsa intra pubem protractus, longius egredi posset, uti sufficienter testabatur orificii interni intumescentia collique elongatio, tractione uaginae ac resistentia tumoris ouarii inducta. Observatur quidem in apice tumoris uaginae prolapsae hiatus, qui tamen non semper est orificio uteri internum, sed sinus ab ipsa uagina inuersa, duplicato egrediente, efformatus. Nec longitudo tumoris euincit, uterum necessario simul elapsum esse, quia uaginae substantia fibrosa et rugosa, tensione ac ab humoribus intus stagnantibus relaxata, insigniter extendi potest, uti apparet ex intestini recti prolapsu, quod, testantibus obseruationibus Auctorum, aliquot spi-

C

tha-

thamarum, ad ulnae longitudinem egreditur, cum tamen tantam longitudinem non habeat in corpore, multo minus ubi istud in egressu duplicatur.

THES. IV.

*Vetus ipse
an eo usque
prolabi pos-
sit, ut pu-
dendum e-
grediatur?*

Quamuis itaque absolute necessitatis non sit, ut uterus una cum uagina elapsa extra abdomen semper excidat, ac praeterea inficendum non sit, ipsam uaginam inuersam et tumidam, aut tumores praeter naturales in eadem natos, uti inferius uidebimus, quandoque foemini, obstetricibus, imo Medicis ipsis imposuisse, ut uterus ipsum elapsum esse crediderint, neutquam tamen propterea statuendum, uterus plane non posse prolabi, uti fecerunt *Kerckringius, Roonhusius, Meckeranus*, aliique, qui singularibus quibusdam obseruationibus adducti, prolapsum uteri uerum dari, negant, omnesque rident, qui uterus unquam extra corpus prolapsum esse sibi persuadeant. Hoc quidem uerosimile est, non omnes uteri procidentias, ab antiquis atque recentioribus Medicis obseruatas, tales fuisse. Fabulis etiam merito annumerandum esse iudicat *a Meckeren in Obseru. Anat. Med.* quae de uteri exstirpatione agentes, *Auensoar L. 2. C. 2. Anton. Beniuuen. de Abdit. Morbor. Caus. C. II. VVierius, Zacut. Lusitan. Felix Plater.* aliique retulerunt, mulieres nempe,

pe, quibus uterus corruptus abscissus, non solum superstites mansisse, sed et liberos procreasse. At si quis ideo cum praedictis Auctori- bus omnem proptosin uteri, a scriptoribus fide dignis annotatam, falsam, fictitiam et imagina- riam dicere uellet, iniurius certe in hos foret. Instructus omnino est uterus ligamentis sat ua- lidis, duplicis generis, nimirum teretibus atque latis, quibus idem sustentatur ac firmatur, ut tanto oneri, grauiditatis tempore gestando, suffi- cere queat. Praestant id in primis ligamenta lata, quae inter pelvis latera atque uterum ua- ginamque interiecta, a reliqua parte, tubam in- ter atque testem intercedente, ob similitudinem alae uestertilionum uocata, probe distinguen- da esse, accurate monet *Clariss. Morgagni. Ad- uers. Anat. IV. Animad. XVII. p. 49.* utpote quae pelvis lateribus firmiter commissa, ligamen- ti uteri lati et officium et nomen seruare debent, cum alae uestertilionum tubae potius ligamenta appellandae sint. Sed quis propter- ea cum Kerckringio uterus semper immobiliter loco suo consistentem pronunciare uellet? Recte igitur Pechlin. l. c. Iam si quis retinentium ligamen- torum uim impedit credat, quo minus uterus pro- labi possit, sciat oportet, eandem quoque causam in uaginae lapsu adduci posse. Quid enim? An- non suis perinde ligamentis, usque satis firmis, ua-

gina neclitur ossibusque incuneatur? At uero, annon ligamentis ille solutionibus adneclitur? An non mobile etiam est ipsum uteri corpus, et ad lapsum procliuius, inprimis si uis accedat, qua inconditae obsteirices per parturientium uiscera grassantur? Ego sane, quoties faciem naturarium, uteri et uaginae attentius rimor, non uideo, quid prohibeat, quo minus uterus descendere ex parte uel totus possit.

THES. V.

Vieri prolapsus uteru exemplis singularibus confirmatur.

Quandoquidem autem experientia una rite instituta plus ualet, quam mille rationes, et supra dicti viri obseruationibus suis, utut singularibus, confisi et nixi, omnem fidem hac in re ueteribus scriptoribus denegarunt, non immerito recentiores sectionibus in eiusmodi subjectis, prolapsu laborantibus, post mortem institutis, curiosius eam in rem inquisuerunt, pluribusque exemplis demonstrarunt, uterum non tantum extra corpus cum uagina inuersa prolabi posse, sed etiam re ipsa elapsum in cadaueribus inuentum fuisse. Non memorabo nunc Diemerbrockium, Regnerum de Graaf, Corn. Stalpart van der VViel, Peyerum aliosque, qui statim se isti opinioni opposuerunt, atque exemplis, tum ab aliis, tum ab ipsis obseruatis, procidentiam ipsius uteri demonstrarunt. Adducam saltem unam uel alteram Auctorum recentissimorum, adhuc uiuen-

uiuentium, obseruationem, quibus non tantum uteri prolapsus, sed etiam totalis simul eius inuersio confirmatur. Instar omnium esse possunt casus, a *Celeberrimo Ruyshio in Obseru. Anat. Chirurg. VII. IX. X.* consignati, utpote qui omnem animo nostro scrupulum eximere possunt. Rarissima in primis est *Obseruatio I.* qua refert, e tumoris uteri prolapsi quadraginta et duos calculos in octogenaria sectione extractos esse, qui sedem suam in portione aliqua vesicae urinariae simul prolapsae habuerunt. Ibidem quoque *Obseru. XXIV. XXV.* mentionem facit lateralis tantum uteri portionis, itemque orificii ipsius interni in partu prolapsus, a se obseruatis. Contingit praeterea, uti *Idem obs. X. et XXVI.* annotat et fig. 12. delineat, ut uterus in aut mox post partum totaliter inuertatur, cui malo obstetrices imperitae, suniculum umbilicalem fortius extrahendo, occasionem praebent, quandoque tamen illud a conatibus post partum remanentibus ortum dicit. Plura huius inuersionis uteri totalis in partu exempla uidere licet in *Stalpart van der VViell Obseru. Rarior. Cent. I. Obs. LXVII.* Hoc tamen extra partum, a tumoribus intus in cavitate uteri natis oriri posse, nouo eoque singulari exemplo probauit *Clariss. von Sanden, Obseruatione de prolapso uteri inuersi ab excrescentia carneo fungosa, in fundo eius interno, ex potu crepitus lupi enata,*

ta, communicata. Sectio enim post mortem instituta monstrauit, tumorem e pudendo istius foeminae propendentem ipsum uterum, ab excrescentia e fundo eius latiori radice enata, ac successiue crescente, ob spatii defectum per orificium exitum querente, tandemque foras erumpente, inuersum et extra corpus extractum fuisse, uti ex Fig. II. ibidem apposita clare ad oculum patet.

THES. VI.

*Tumores
alii e uagina
enati, uteri
procidenti-
am menti-
entes.*

Sed nunc annotandum est, ex ipsa haginae superficie interna oriri excrescentias tales carneo fungos et scirrhosas, quae in tantam molem auctae, ut spatium interius non inueniant, e pudendo prorumpunt, uterumque prolapsum mentiuntur. Eiusmodi fungos in uagina adhuc absconditos, oui gallinacei ac pugni magnitudine ex illa exsectos memorat *Tulpius Obser. Med. L.III. Cap. XXXIII. et XXXIV.* Fungum pariter cancrosum ex interiori matricis co*li* parte ligatura separatum recentet *Stalpart. van der VViel l.c. Obs. LXXXVII.* Excrescentiam cancrosum, duorum pugnorum magnitudine extra sinum pudoris propendentem, et ab ipso aliisque Medicis et Chirurgis pro utero inuerso et prolapo habitam, describit etiam *Segerus Obs. 121. Misc. Cur. A. 1671.* quae tamen, uti sectio post obitum foeminae instituta monstrauit, nihil aliup

aliud fuit, quam excrescentia fungosa, ex uteri collo, et huius antica parte, prope Vesicae orificium, enata. Ita etiam *lobus a Meckeren in Observu. Anat. Medicis* pro confirmanda sua sententia, qua, uti supra uidimus, uterum omnino elabi posse negat ac pernegat, praeter aliorum observationes, refert integrum historiam Sarcomatis insignis magnitudinis, gangraena iam correpti, praeuia ligatura colli angustioris resecti. Complures Medici atque Chirurgi praefentes illud uterum prolapsum crediderunt. Muliere autem paulo post denata, sectio eadaueris patefecit, non uterum ipsum prolapsum et abscissum fuisse, utpote qui bene constitutus in loco naturali inuentus est, ligamentum uero intus relictum monstrauit, tumorem ablatum nil aliud, quam tunicae rugosae, uaginam praeter alia constituentis, portionem, laxitatis nimiae culpa, extra pudendum elapsam fuisse. Hae similesque historiae satis superque euincunt, excrescentias tales carneo fungosas, e pudendo propendentes, haud raro imposuisse non tantum foeminas, sed ipsis quoque Medicis atque Chirurgis, ut tales uterum prolapsum esse, sibi persuaserint.

THE S. VII.

Filo in praesenti ducimur ad quaestione il-

*Vetus pro-
lapsus an
falsa uita
resecari
possit?*

Iam, quid de refectione uteri prolapsi, ab Auctoribus adeo frequenter commemorata, senti-
endum

endum sit? Integrum Catalogum Scriptorum recenset Meckeren loc. cit. qui uterum salua vita non tantum afferri posse, sed etiam ablatum esse, memoriae prodiderunt. Hos inter Plempius Anat. Cabrol. c. 34. scripsit, uterum prolapsum incuria quadam putrefactum exstirpari sine incommodo, sic, ut eo ablato etiam concipere queat mulier. Fernelius uidisse serefert parturientem quandam, cui uterus cum foetu inclusus, sine ullo uitae dispendio ablatus sit. Plinius et Soranus uterum muliebrem afferri sine uitae periculo posse, exemplo porcorum, probare nituntur, et Laurent. L. VII. de part. Gener. C. II. omnia bona promisit mulieri, cui uterus ablatus sit, uti uidere est in Bonet. Sepulcr. L. III. Secl. XXXII. Addit. obs. VI. p. 41. Ibidem etiam Obs. I. ex Jo. Georg. Volckameri relatione recensetur historia uteri procidentis ex uirgine resecti, cui antea iam testes, per hymenem propendentes, ablati fuere, eodem observante in Miscell. Curios. A. II. Obs. CCXXVI. p. 328. Nullum tamen hic suppeditauit signum certum, unde iudicari possit, tubercula ablata re ipsa fuisse ouaria atque uterum, nisi quod dicat, priora calidae aquae iniecta, testiculos uasis suis annexos praesentasse, ultimum uero formam uteri nondum defloratae retulisse, sed cuitate destitutum fuisse. Maioris momenti uidetur esse obseruatio Paraei de Hom. gener. L. XIV.

qua

qua docet, mulieri tumorem corruptum e pudendo frustatim extractum fuisse, quod ipsi et quatuor Medicis praesentibus corpus uteri uisum fuit, cuius rei fidem fecit non tantum unus ex testiculis postea, ipso referente, extractus, sed etiam sectio foeminae post trimestre pleuritide extinctae, quia nusquam comparuit uterus, sed eius loco callosum quoddam corpus, quod natura, uti ille loquitur, quae nunquam in nobis otiatur, iacturam eius partis quasi reparatura, uel lacunam potius alui repletura, substituerat. Annon uero corpus istud callosum fuerit ipse uterus, ab abscessu diuturno in genitalibus existente deformatus, sub iudice lis est. Verbo: Pleraque historiae de utero exsecto apud Auctores occurrentes ita sunt comparatae, ut dubium sit, an uterus, aut eius loco excrescentia quaedam fungosa et carnea abscissa fuerit. Vnicum tamen exemplum in fine tractatus supra laudati Sandenii, ex prolatione, dissertationi *Inaugurali de foemina grauida, lapsu uaginae uteri laborante ab eius Praeside, D. Ioh. Hadriano Sleuogio* praemissa, adiectum confirmat, impossibile non esse, ut uterus prolapsus et corruptus salua uita resecari possit. Ipse enim testatur, se in massa, a pudendo muliebri resecta, quinque libras pendente, praeter opinionem, ipsissimum os uteri, cruroe uiscido obturatum, reliquumque huius corpus, cum fundo integro et reliquiis tubarum, quasi in theca coriacea, prope iniectum uinculum, abscissa, reconditum offendisse. Imo ut ea clarius

D

dignosci

dignosci possent, uterum ab orificio ad fundum, secundum longitudinem aperuit, et cavitatem eius ac crassitatem, statui naturali prorsus similem, detexit, tubisque setas nigras inseruit, atque sic Excellentissimis Academiae Ienensis Professoribus, plerisque Vrbis istius Doctoribus Medicis Practicis, atque centum studiosis demonstrauit, ut adeo de eo nullus dubitandi locus supersit.

THES VIII.

Sarcoma nostrum an uterum si mul exstetum contineat?

His itaque ad illustrationem nostri casus praemisis, accedendum tandem est ad Sarcoma in praesenti anobis luci expositum, ut pateat, quae sit eius natura atque origo, et ad quodnam genus tumorum in pudendo natorum, haec tenus enumeratorum, idem sit referendum. Optimam quidem huic rei lucem accendet aliquando foeminae huius obitus et corporis defunctoriae apertio, qua locus, unde resectio facta, detegi poterit; uitam tamen et sanitatem, qua haec tenus utitur, ipsi nullatenus inuidentes, interea periculum faciemus, quid quantumque in negotio hoc admodum obscuro, considerando circumstantias antecedentes, concomitantes et consequentes, praestare liceat. Evidem ex praecedente thesi constat, uterum prolapsum aliquando, utut forte rarissime, salua uita resectum fuisse. Tumor praeterea in nostra, post abscessionem portionis eiusdem prominentis a muliere peractam, uno impetu inter conatus, parturientium similes, foras prorumpens, magnam suspicionem excitauit, uterum per aperturam, sectio-

ne

ne hac in uagina factam, simul excidisse. Repletio et occlusio sinus pudoris, a uagina ad inferiora tracta, ob quam digitis, circa tumoris collum ductis, intra pudendum nullibi penetrare licebat, suspicionem illam auxit. Corpus tandem musculosum, in farcomate ablato apparenſ, ac figura externa pariter ac structura interna carnoſa, cum intermixtis orificiis numerosimis uasorum sanguiferorum, uteri ſpeciem praefereſ, ſententiam iſtam penitus confirmare uifa eſt. Quoniam tamen nec intus cauitatem in hoc corpore inuenire, nec extus quicquam de ouariis et ouiductibus ligamentisque detegere licuit, illud uterum, ſectione ex muliere ſublatum ego non diixerim. Retractio enim totalis uaginæ ad inferiora, ac fluxus mensium post illud tempus naturalis et regularis infecutus, ſatis ſuperque edocent, uterum in corpore remansisse, et originem huius tumoris aliunde deriuandam eſſe.

T H E S. IX.

Rebus ſic ſtantibus, aliud iudicium de noſtro Sar-

Quale illud
ſit? et ad
quodnam
genus tumo-
rum enume-
ratorum fit
referen-
dum?

comate ferre non poſſumus, quam quod illud excreſcentia quaedam carnoſa et ſcirrhoſa ex uaginæ iſpius ſubtantia, parteque ſuperiori, utero proxima, enata. Idque penitus uadet pars illa mollior rugoſa et lobofa, corpus muſculoſum uifinens, quam uaginæ portionem eſſe, inspectio docet. Saltem corpus illud muſculoſum, figuram et texturam internam uteri exhibens, diſſicultatem creat, unde illud originem trahat. Notum autem eſt, ua-

ginae uteri substantiam intus quidem membranofam, nerueam atque papillarem esse, rugasque copiosas instar rugarum intestini ieconi, exhibere, ac ubiuis lacunas, uti circa urethram et uteri paeprimis ceruicem, ita per totam superficiem monstrare, quae cum glandulis substratis communicantes liquidum mucosum secernunt. Exterius uero musculosus contextus uaginam ambit, ac copiosissimis uasorum cum utero partibusque adiacentibus communibus ramificationibus, multiplici anastomosi inter se iunctis, ac substantiam uaginae perreptantibus, gaudet. Quid itaque mirum in textura ista musculosa glandulis atque uasculis intertexta, ab humoribus impuris ac uiscidis, intus stagnantibus, obstructiones et indurationes harum partium fieri, unde omnia farcomata, aut excrescentiae carneo fungosae, et scirri, aut quoconque demum nomine ueniant, tumores oriuntur. Faciunt huc iniuriae uariae, quibus uagina, aeque ac uterus ipse, ante, in, et post partum obnoxia est, fluxus mensium et lochiorum inordinatus, retentus, aut inconuenienter suppressus, uel etiam nimius. Humores quippe largius ad genitalia confluentes, atque transitum aut egressum per tubulos obstructos non inuenientes, inter plexus uasorum atque glandularum restagnant, sensim inspissantur, partes circumiacentes distendunt, atque ita excrescentias illas, fungorum more protuberantes, efformant.

THESES

THES. X.

Praecesserunt autem in nostra partus iterati, sub-
inde laboriosi, quibus uagina cum utero ualde
extensa, tonusque eius maxime relaxatus fuit. Foe-
mina egestate coacta, nec tempore grauiditatis, nec
post partum diaetam conuenientem obseruauit, in
nulla re sibi pepercit, labores durissimos suscepit,
pondera gestauit, mox a partu e lecto surrexit, cor-
pus aeri frigido exposuit, fluxusque lochiorum nul-
lam curam habuit. Quae autem et quanta mala in-
de in grauidas atque puerperas redundare soleant,
notius est, quam ut a me hic exponi opus habeat.
Insecuta post illud tempus haemorrhagia diurna
atque enormis sufficienter testatur de uteri parti-
umque connexarum graui laesione, sanguinisque in
iisdem circuitu difficiili atque stagnatione, unde tan-
to impetu tantaque quantitate idem per uias geni-
tales erupit. Fluxum hunc illa neglexit, ac praeter
domestica remedia, nihil eidem opposuit, potius
motu inconuenienti, eleuatione ponderum, refrige-
ratione, aliisque diaetae erroribus illum auxit. Nec
ullum est dubium, illam ad haemorrhagiam coer-
cendam et restinguendam, inter remedia domestica
adstringentibus et stypticis ulam esse, pro more uul-
gi, qui ad talia, tanquam sacram anchoram, confugere
solet. Neminem uero latet, quot et quanta ex in-
tempestive suppressa haemorrhagia mala oriantur.
Per eiusmodi enim austera, constringentia ac stypti-
ca medicamenta sanguis et alii humores intra uasa

*Cause antecedentes
ponderantur.*

distenta stagnantes subito coagulantur et inspißantur, unde in aliis inflammations, abscessus et exulcerationes, in aliis tumores duri ac scirrhescentiae partium internarum haud raro originem trahunt. Ipsa Sarcomata et excrescentias carneo fungosas in partibus genitalibus ortum inde repetere, probat exemplum Sandenii supra memoratum. Foemina illa infuso crepitus lupi, contra abortus frequentes et haemorrhagias uteri usurpato, excrescentiae isti carneo fungosae, in uteri cauitate ex eius fundo enatae, occasionem dedit, a qua uterus inuersus foras propulsus fuit, et insecuta exulceratio et sphacelatio febrisque coniuncta uitae finem fecit.

THES. XI.

Circumstantiae singulares causas nostras considerantur.

Ad nostrum ut reuertamur casum, notatu dignissima in primis in eo est circumstantia, in historia annotata, tumorem hunc prius e vagina exitum non inuenisse, quam resecta prius a foemina parte eius protuberante. Hoc ipso quippe idem quodammodo detumuit, uiamque faciliorem prorumpendi inuenit. Hoc uero mirum, ne minimam inde secutam fuisse haemorrhagiam, quod tamen nulli alii rei, quam scirrhescentiae et sphacelationi tumoris relatum ferri debet. Haemorrhagiam uero a sectione metuendam impediuit ligatura iniecta, utut hac forte opus non fuisset, quia collum tumoris albicans et quasi tendineum nulla insigniora uasa monstrauit, ac uix gutta una sanguinis ex eodem stillauit. A resectione etiam farcomatis, quod,

prae-

praesente et dirigente *Sleuoglio*, e foemina sublatum esse, ipsumque uterum simul abscissum, illo teste, comprehendisse, supra notauius, nulla haemorrhagia secuta est, quamuis pars ligata, simul ac a pondere trahente liberata fuit uinculo, quo collum eius ante sectionem ualide ligauerat Chirurgus, statim se subtraxerit et ad interiora resiliuerit, non sine terrore Chirurgi, haemorrhagiam aegre restinguendam metuentis, cum tamen uix duea unciae cruxis effluxerint, mox sero tenui eum excipiente. Ligamentum istud in nostra foemina omnium subsequentium symptomatum, tractionis et pressionis in abdome, tumoris oedematosi, haemorrhagiarum uteri, aliorumque incommodorum causa existit, quia, illo lenta suppuratione post dimidium demum annum separato, omnia illa accidentia statim euaneuntur. Nihilo tamen secius securitatis gratia ligatura merito applicata fuit, ac in casibus similibus non facile neglegi debet. Cauta tamen cum ista procedendum esse, docet casus *Segeri* supra relatus, ubi in excrementia tali fungosa, statim a ligatura grauissima symptomata secuta sunt, quae uero uinculo sublato cessarunt. Cauendum etiam sedulo, ne partes adiacentes uinculo comprehendantur, quod contigisse refert celebratus *Ruyshius Obs. VII.* in foemina, in qua Chirurgus, uterum prolapsum et corruptum extirpaturus, meatum urinarium simul ligavit, unde aegra, suppressione urinae totali correpta, occubuit.

THES.



THES. XII.

Conclusio.

Ex praesenti tractatione, obseruationibusque in ea recensitis, ni fallor, patescit, in similibus casibus nihil quidem temere agendum, in statu vero dubio atque ancipiti interdum aliquid cum prudentia tentandum esse. Quilibet enim uidet, foeminam hanc e praesentaneo uitae periculo, ob sphacelationem tumoris propendentis, mortisque faucibus per operationem institutam erectam fuisse.

De hoc tamen plura ut addam, opus non esse iudico.

F I N I S.



Tunc

94 A 7368



KD A



