





37  
25

Botan.

e-  
de-  
es-  
ui-  
us-  
n-

1  
e-  
de-  
es-  
ui-  
us-  
n-

0



D. B. V.  
DISSERTATIO MEDICA IN AVGVRALIS  
*1707.12.25.*

V R T I C I S

QVAM *b4am. v. bala.*

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO  
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO  
DOMINO

VVILHELMO HENRICO  
DVCE SAXONIÆ JVLIA CI CLIVIÆ AC MONTIVM  
ANGARIÆ ET WESTPHALIÆ e.r.

PRAESIDE

JO. HADRIANO SLEVOGTTIO

HEREDITARIO *in Ober-Rosla*

MED. D. AN. CHIR. ET BOT. P.P.

IDEM QVE MED. DVC. PROV.

PATRONO PRAECEPTORE  
AC PROMOTORE SVO

GRATA MENTIS SVBMISSIONE VENERANDO

PRO LICENTIA

SVMMOIS IN MEDICINA HONORES

ET PRIVILEGIA

RITE CAPESSENDI

PVBLICÆ ERVDITORVM DISQVISITIONI

TRADIT

JOANNES MELCHIOR *Drechsler*/

WANSLEBIO-MAGDEBURGENSIS

IN AUDITORIO MAJORI

HORIS ANTE ET POMERIDIANIS

D. MAII ANNO MDCCVII.

J E N Æ

TITERIS COLINERIANIS

## EXPLICATIO FIGVRARVM:

- A Litera notat Calycem floris urticæ quadrifolium.  
a Calyceum quinquefol. urtic. Canadens.  
B Antheram integrum, ex capsulis reniformibus, pulvillo flavo plenis, constructam.  
C easdem capsulas, in quatuor foliola divisa.  
d Embryonem futuri fructus, cum crista in vertice.  
D Capsulam seminis urticæ vulgaris racemosæ clausam.  
E eandem apertam bivalvem cum semine.  
F Semen urticæ racemosæ.  
G Capsulam seminis urticæ minoris bicuspidatam.  
H Pilam urticæ Romanae.  
I Capsulam seminal, clausam, fec. Tournefort.  
K eandem apertam.  
L Veriorem iconem capsula clausæ, ut nobis nudo & armato oculo apparuit.  
M eandem apertam cum semine.  
N Semen urticæ Romanae.  
O Semen angulosum urtic. Canadens.  
P Receptaculum ejus, a Tournefortio volvella comparatum.  
Q Spinam seu aculeum urticæ recentem, sacculo succifero insidente.  
R eandem spinam, in cuius apice guttula lippidi laticis ex pressi hæret.  
S Spinam aridam exsicciamque.  
R — — — in medio fractant ut cavitas ejus appareat, cum notis succi subsidentis in sacculo.  
o & p duas spinas, ut a Leeuvenhoek pinguntur, curvas.  
S. T. V. figuræ, in lixivio urticæ leviter congelato apparentes.  
X figura in decocto urticæ, congelato, apparente.  
1, 2, Figuras, in aqua destillata Melissæ congelascente; 3, 4, in aqua Betonicæ;  
3, 6, in aqua salviæ; 7, 8, in aqua hyslopi; 9, in aqua tussilaginis.



Q. D. B. V.

§ L

Vlpantur equidem, post Theophrasti Eresii, & Dioscoridis Anazarbei tempora *Rei botanicae* cu-  
ram habentes, meritissime a recentioribus, quod  
pertam longum temporis spatium, usque ad duo  
proxime elapsa secula, præter confusam, & ple-  
rumque ex veri nominis ignoratione ortam synonymorum  
multiplicationem, parum vel nihil ad faciliorē, diffusissimum  
eiusmodi studium methodice tractandi, rationem contribue-  
rint; quin potius ob neglectos genuinos & unicuique plantæ  
impressos characteres, quorum ope singulas species ad sua ge-  
nera referre potuissent, sèpe diversissimas herbas ad eandem  
classem cöegerint, rursusque ad unam familiam pertinentes, lon-  
gissime a se invicem disjecerint. Sed excusantur quodam-  
modo per vulgatum illud: *Omne principium grave, inventis-*  
*que aliorum aliiquid addere, non sive arduum esse: & revera quo-*  
*que laude digni sunt, quod, melioribus adminiculis destituti,*  
*memoriam, circa tot singularia occupatam, adjuturi, plurima-*  
*rum plantarum appellations modo ab externo earum habitu &*  
*figura, aliisque sensibus hominum expositis qualitatibus, mo-*  
*do a juvandi nocendique facultate, modo a natali loco & germi-*  
*nandi florendique tempore derivare laborarint.*

§ II. Specimen utilitatis istiusmodi denominationis hæc  
ipsa herba, cuius evolutioni præsentes paginas destinavimus,

A 2

offert.

offert. Hanc enim, qui Latine URTICAM & German. Brennessel vocant, ab ardore & pruriore rubidine, quam instar ignis manibus, blandissime eam attingentibus imprimit, ita appellari fatentur. Et græcae quoque voces *νίδη* & *κυνόν*, eandem herbam significantes, prout a *νίδην*, *νειλικαρε* pungere, & *κυνόν*, *mordere*, originem habent, ipsumque German. vocabulum *Nīdē* sī, sī, sec. Chr. Langii Misc. cur. c. 34, de morbill. p. 126, a *νίδην* *pungo*, *percutio*, derivatur, modum agendi *mechanicum* ostendunt; sicut *Cnidiorum* pugnacissimam gentem, mordacesque *Cnidias* aves, ab Aristotele, Athenæo & Aldrovando descriptas, a moribus sua nomina accepisse, probabile videtur.

§ III. A Dioscoride vocatur *άκαλύφη*, ab aliis *άκαλήφη*; secundum Rajum quidem, Hisp. Pl. Lib. 4, S. 1, Part. 1, c. 3, p. 159, ex Athenæo, παρε τῷ μη ἔχειν καλὺν αἴφην, quod injucundo sit tactu: ast cum α in voce *άκαλος* neutriquam privandi aut contrarium significandi facultate polleat, hinc potius *άκαλήφης* appellatio hoc loco *άκαλύφης* involvit, quatenus haec herba nihil minus, quam *άκαλη* τῇ αἴφῃ, *placida* & *mitis* tactui existit; ut per analogiam, ab ejus uredine desumptam, etiam pisces nonnulli, vel si maris Zoophyta marina, *Urtica* salutentur; quia manibus pescatorum sese per informis sui corporis villosum, quibus alias fissis tenaciter adhaerent, applicantes, eas molestissimo ardore afficiunt, nisi oleo prius unctæ fuerint: ut apud Aristotelem, Plinium, Cardanum, Gesnerum, Aldrovandum & Rondeletium legere datur. De aqua vero admodum refrigerante inde destillanda, & oleo singularum virtutum, videatur D. D. Ludov. Hannemannus, Ephl. G. D. 3, ann. 2, obs. 137.

§ IV. Cum, verbis Matthioli, Comm. in Dioscor. lib. 4, c. 89, p. 789, *Urtica adeo vulgaris sit notitia, ut non modo interdiu, sed etiam noctu in tenebris solo tactu ab omnibus facilissime cognoscatur*, hinc Veteres parcissimi fuerunt in externa ejus facie delineanda, operamque suam magis in virium descriptione colloca-

¶ 5. ¶

runt. Quos & nos imitabimur, modo prius genus ejus & no-  
tas quasdam *diagnosticas*, ceu insignia familiae indicaverimus.  
Postquam enim hodie Botanica ingentem saltum ultra antiquos  
limites fecit, non licet amplius nominibus ludere, & pro lúbitu  
atque autoritate Docentium ea vegetabilibus imponere, ut v. g.  
herba, quam *Galeam* vulgo vocant, aliis *Galea*, *Gralega*, *Rega-  
lea*, *Regalicum*, *Castranaca*, *Caprigo*, *Capragina*, *Danieta*, *Rutaca-  
praria*, *gallica*, *Herba Galeri*, *Tbarina*, *Martanica*, *Nesa*, *Sa-  
racenica*, *Taurina*, *Fœnum gracum sylvestre*, *Onobrychis* &c.  
audiat: aut *Teleprium Grecorum* a Brunsfelsio *Scrophularia me-  
dia*, a Matthiolo *Fabaria*, a Lobelio *Faba inversa*, a Do-  
donæo *Crassula*, a Cordæ *Acetabulum*, a Columna *Colyledon*,  
ab aliis aliter appellatur: nec sufficit circa radices & folia, alias  
que § i recitatas circumstantias, in determinando eorum gene-  
re, speciebusque constituendis subsistere; sed decet potius secun-  
dum methodum vegetabilia dignoscendi, a Gesnero *inchoatam*,  
hinc a Cæsalpino & Fabio Columna *approbatam*, postmodum a  
Rajo, Mörissone, Hermanno, Ammanno aliisque *magis diluci-  
datam*, & tandem a celeberrimis viris, Rivino Lipsiensi ingenti-  
bus sumtibus, iisque propriis, a Tournefortio Aquisextensi au-  
tem impensis Regis Galliæ, ad sumimum, quo jam splendet, clarita-  
tis fastigium, deductam, herbas potissimum per florem & fructum  
a se invicem, aliisque eorum nomen gerentibus, aut in uno ter-  
cio cum ipsis convenientibus distinguere.

§ V. Quod ipsum antequam circa *urticas* etiam moli-  
mur, & ad genuinum earum characterem constituendum progre-  
dimur, opus est, remoras nonnullas, a præstantissimis Botanicis,  
Rajo atque Tournefortio, legentibus objectas, e via tollere. Est  
enim, nescio quo fato factum, ut, contra oculorum fidem, una-  
nimirer quaslibet urticas inter herbas, quarum fructus, secundum  
Rajum, l. c. p. 156, a floribus totis plantis distant, sec. Tournefor-  
tiū autem, quæ flore apetalō, alia in eod. genere floribus, alia  
fructibus plerumque donantur, retulerint; quo pacto, si ex hypo-  
thesis

¶ 2. ¶ 5.

thesi de sexu plantarum, secundum Aristotelis & Theophrasti  
placita, post Grevium atque Rajum, a D.D. Rudolpho Jacobo  
Camerario, Prof. Tub. celeberrimo, in Epistola ad celeb. D.D.  
Valentini, comta oratione & speciosis argumentis explicata, lo-  
quendum esset, omnes urticarum species tantum in *mares* &  
*feminas* distingverentur: cum tamen maximam earum partem  
*hermaproditos* esse, autopsia doceat.

§ VI. Quæ ut rectius percipiuntur, sciendum (1) Rajum  
& tantum urticarum species nosse, duas *racemosas*, *totidemque pi-*  
*lulferas*, hisque l.c. arborem urentem Brasiliensem, Pino dictam,  
ex Marggravio, & tres frutices urticiformes, Schorigenam, Batti  
Schorigenam, atque Ana-Schorigenam ex horto malabarico  
præmittere: Tournefortium autem, missis hisce tribus peregrini-  
nis, novem urticarum species tali ordine recensere, ut prima sit  
*Urtica urens maxima* C B; secunda *urens maxima caule rubente*,  
tertia *vulgaris minime urens* Menzelii; quarta *urens minor*; quin-  
ta *urens pilulas ferens* Dioscor. sexta, *pilulifera altera*, *parietaria*  
*folio*; septima *maxima racemosa Canadensis* Hort. Reg. Par. octa-  
va *Canadensis myrrhidis fol.*; nona *racemosa Americana*, *ample*  
*coryli folio Plumerii.*

(2) per flores intelligi h. l. *julos*, sive 4, 5, vel 6 *nucamenta*, ad singu-  
la foliorum superiorum paria ex euntia, quæ numerosos *calyces*  
*quadrifolios A*, (vid. figuræ in Tabula) in nonnullis *quinquefolios*  
*A*, ex viridi flavescentes, teretique axi alligatos, constitutæ vide-  
mus; et quorum fina *stylus quadrangularis* eminent, absque pet-  
alis, & vel 5 staminibus stipitatus, quæ in calyce adhuc clauso in-  
curvata jacentia profiliunt, quamprimum hic aperitur, quasi  
ab elatere quodam mota, disperguntque ex antheris suis, sive  
apicibus B, flavum pollinem in poros & crissatos vertices *embryo-*  
*num d*, ceu in futurorum fructuum rudimenta, ut hæc ab illo,  
tanquam ova muliebria ab aura seminali masculina, foecunden-  
tur, & aptitudinem novas plantas generandi accipient. Repré-  
sentant

¶ 7. ¶

sentant antheræ staminum allegatae duas capsulas reniformes,  
quæ secundum longitudinem dissimiles, post excusum pului-  
sculum, apertæ manent, & libellum quatuor foliorum exhibent  
**C**, obscure a Sculptore delineatum.

(3) Ex 9 speciebus Tournefortii *tres* tantum priores (for-  
san etiam tot ultimas exoticas) ita comparatas esse, ut §. præced.  
citatis notas mercantur, & unius ejusdemque speciei indi-  
vidua, alia in racemis suis non nisi flores gerant, adeoque *mascu-  
lini generis* existant; alia, fructus solummodo alendo absque  
floribus, *feminarum* vices sustineant: Sequentem autem quar-  
tam, quintam atque sextam, instar *androgynorum*, in *eadem* planta  
florentes julos juxta petiolas fructiferos protrudant.

§ VII. Ex præmissis hisce haud erit arduum Urticas defi-  
nire, quod sint *planta*, *florem imperfectum racemosum sine semine*,  
*& semen acuminatum F & N*, *vel angulosum O*, *sine flore in capsula*  
*bivalvi*, *figuram cordis D*, *vel cunei & coni inversi L*, *vel volvelli* & ex-  
bibente, *asseratum*, *preferentes*. Qui character, quamvis val-  
de generalis, singulisque speciebus absque limitatione minus  
adæquatus sit, facile tamen unicuique earum per adjunctas par-  
ticulares notas applicari potest, satis facitque nobis hac vice ideo,  
quia per ipsum Urticas ab iis herbis, quæ earum nomen injuste  
hactenus usurparunt, separare licet, ut in posterum non nisi  
*Melissarum*, *Lamiorum*, *Galeopsidumque* titulo veniant, quæ post  
florem utrinque labiatum, in calyce tubuloso, & circa marginem  
multifido, & nuda semina spectanda alunt, & hactenus vulgo *ur-  
tica silvestres*, *berculea*, & *aculeata*, *fatua* item, & *morta*, *Bil-  
de/Laube oder Todte/Niſſel* fuerint salutatae.

§ VIII. Cum vero novem istas verarum species non uno  
habitu incedere, ex allatis constet, opus erit *speciales charakte-  
res* constructuris, eas, partim ad *florem sexumque* habito respectu,  
secundum § præcedentis num. 3, in *mares*, *feminas*, *hermafro-  
ditosque*; partim vero, ob *fructum*, in *racemosas* atque *pili-  
liferas*.

*liferas* distingvere; cum ad hasce notas essentiales indigena pater ac peregrina facile reduci, harumque beneficio, si simus calycum, seminumque & capsularum figura in considerationem venerit, *omnes urtica quatuor classibus includi* queant; ut ex singularum explicatione apparebit.

§ IX. In prima classe eminent duæ species racemosæ, potissimum per colorem herbae viridem, vel obscure rubrum dignoscenda. Has sub uno titulo, post Matthiolum, J. Bauhinum, Chabréum atque Rajum, illi comprehendunt, qui coloris diversitatem tantum a loci natali situ, solis radiis plus minus exposito, derivant: cum tamen Tabernæmontano non solum distinctæ earum figura p. 920 & 921, exhibeantur, sed etiam a Tournefortio, ex C. Bauhini Pinacis p. 232, prior absolute *Urtica urens maxima*, Germanis *Weisse große brand- oder donner-Nehel* altera vero *urens maxima caule rubente, rothe / oder wilde Nehel* salutetur. Prior, quam domesticam vocant, nascitur juxta sepes & vias, assurgitque ex pingviori solo ad tres cubitos, radice fibrosa, & per hyemen durante, in terra late se expidente. In hujus foliorum dorso observavit Christ. Ioannes Languis, Oper. theor. pract. Part. 3. p. 438, ovula lutei coloris, in vermiculos, & postmodum in scarabæos abeuntia, quos p. 439 *Urticabantbaros* vocat. Posterior humilior existens, nonnullis *sylvestris* audit, facie tristiori & exsucca quasi, foliisque angustioribus & durioribus, ast mitius longe urentibus prædicta est.

§ X. Ex utriusque geniculis superioribus erumpunt juxta singula foliorum paria ordinarie 4, sape 5 vel 6 racemuli, tres, quatuorve pollices longi, iique in uno individuo *tantum flosculus*, in altero *non nisi fructibus* onus. Floriferi decidunt non integræ instar jugorum juglandis & coryli, sed stylis amittunt tantum flosculos, fructiferis autem adhaerent semina F. minuta, depresso, oblonga, cordiformia magis, quam ovalia, & quidem in capsulis membranaceis bivalvibus D, cordis inversi, vel ferri in hastæ figuram habentibus. § XI,

*Urtica vulgaris minime urens*, a Menzelio, in Pugillo rario. plantarum, Indici multilingvi connexo, descripta, ut, nisi magni admireris, eam a prioribus vix distinxeris. Qui potentiam urendi inter notas essentiales urticarum numerant, negant quidem hanc plantam peculiarem inter eas speciem constitutare, eamque pro *spuria* tantum, & a naturali indole degenerante habentes, ad quotidie occurrentes naturae aberrationes inter vegetabilia provocant: cume, g. *viola matronalis* alba saepe flores virides & inodoros, *caryophylli* rubri atque pleni semen flores albos, rubros, pictos, plenos simplicesque ex eadem area producat, *absinthium* absque amaritie, & *raphanus* marinus insipidus nascantur. Enimvero non opus est hoc loco monstra allegare, & præstat potius, de *uredine* inter signa urticarum diagnostica plane tacere. Quamvis enim per hanc qualitatem tactilem cæteræ species satis bene innotescant, nequeunt tamen per eandem a nonnullis aliis, itidem urentibus vegetabilibus, & ab urticarum tamen genere longissime remotis, absque recursu ad supra memorata signa, solide discerni: cum e. g. *Phaseoli Zurratenis* *Parkinsonii* *hirsuta* *silqua*, arida ad nos delata, curiq. leniter affricta, urtica similem dolorem, brevi transiunt, per villos suos rufos excitet, qui proinde joci causa balsamo, quem *bryxier balsam* vocant, admiserentur.

**S XII.** Secundam classem constituit, quæ § 6, in ordine quarta est, *Urticaminor*, Plinio *Cania*, aliis *Canina*, Germanis *Eleine* oder heiter *Mischel* haber *Mischel* dicta, itidem racemosa, sed facile a præcedentibus separanda. Cedit enim istis longitudine jularum, foliorumque magnitudine, sed colore horum magis viridante, & urendi facultate superior videtur. Est prærea utriusque sexus in eodem individuo; quatenus semina, prioribus duplo majora, in oblongis, & in vertice duabus crassis, quasi aculeis, armatis capsulis comprehendens, cum floribus in

¶ 10. ¶ 5.

racemis mixta; alit. Malpighius in calyce floscolorum, instar vesicae rotundo, se, succum glutinosum, terebinthinæ non absimilem, invenisse scribit. Nascitur hæc planta passim, quotannis ex semine largiter rediens, ut propterea a Trago atque I. B. ad luxuriantem pullitatem magis, quam ad vires respicientibus, *pefis bortorum* appelletur.

§ XIII. An ex tribus Americanis media etiam, ut duæ reliquæ, ad racemosas pertineat, cujusque sexus ac indolis omnes ac singulæ existant, definire nequimus; hoc saltem ex Tournefortio intelligentes, per calycem quinquefolium a, & angulosum semen O, hujusque receptaculum, volsella & simile, has species a reliquis abire, adeoque peculiarem characterem præ se ferre, & *tertia classis* membra esse.

§ XIV. In quarta classi stant *Urtica pilifera*, quarum duas tantum species novimus, sola figura foliorum inter se discrepantes; dum in una albam illam racemosam referunt, in altera autem, quando adoleverunt, parietariæ similia sunt; & in juniori planta etiam majoranæ faciem habent, ut ea, verbis Raii, *Majorana Hispanica* Anglis dicatur, & incautos facile persuadeat, eam naribus admovere; unde mordacibus ejus spiculis compuncti, risum spectatoribus excutunt. Vocantur hæ *Romane römische oder welsche Nepheln*; non quidem ob natales, sed, verbis Lobelii, p. 223, Stirp. advers. propter Romani seminis majoris majorem efficaciam. Nam proveniunt non solum passim in calidioribus Italiæ, Hispaniæ, & Galliæ locis, sed in Anglia quoque, teste Rajo, sponte in plateis oppidi Iarmouth, & circa Aldeburgum, nec non in Basileæ pratis, autore I. Bauhino, propullulantque etiam in nostris hortis quotannis, absque cura Hortulanii, ex semine, radicibus hyeme pereuntibus. Conveniunt cum præcedentibus ratione floredi per *racemos*; sed sunt inter *androgynos*, quo pacto a tribus primæ classis speciebus recedunt, dignoscunturque a reliquis omnibus per fructum, capitula

tula scil: rotunda H, sive pilulas spinosas, ex octo, decem, pluribus capsulis seminalibus L coagmentatas.

§ XV. Obiter h. I. notamus, capsularum atque seminum icones apud Tournefortium non esse accuratas; illis enim figuram dedit, qualem pictores cordi affingunt, cum mucrone acuto, basi sulcata, & superficie circum circa spinis obsita I, quæ a mucrone basin versus in duo quasi hæmispharia, vel duas lunulas dehiscens, semen *ovale acuminatum* (ovale pointue) continet K. Sed autopsia docet, semen N non tam *ovum*, quam conum potius, vel corculum quodammodo depresso, cum basi plus minus rotundata, ejusque capsulam membranaceam L, *cuneum* fere vel conum inversum representare, & in basi tantum elatiori spinulas gerere, latera autem ejus esse glabra, ut cum suis sociis in *sphaerulas* f. *pilas* aculeatas compingi queant. Insident tales pilæ tenuibus longisque petiolis, ex ala foliorum emergentibus, quibus *racemuli floscularum* adstant. Unde patet, Tournefortium nimis generaliter in Instit. p. 534, de urticis scribere: *embryones iis speciebus innasci, que flore carent;* Rajum autem in urtica Rom. pariet. fol. pilulas birsutæ in quosdam *delet floscularum racemos explicari* perhibendo, eas fugitivo tantum oculo, aut nimirum conspexisse. Argueretur enim hoc pacto natura erroris, quasi *υσεγν πεωσεγν* vagens, jam præsentibus florigeris racemis, fructum in florem resolveret.

§ XVI. Huc quoque trahuntur a J. van Rheedede & J. Caséario, autoribus partis 2, Hort. Malab. & a J. Commelino, in Comment. quatuor frutices Schorigenam, Valli-Schorigenam, Batti- & Ana-Schorigenam dicti, figura foliorum habituque hirsuto & urende urticis adeo affines, ut Rajus istis primum locum inter has concedens, descriptiones ex Horto Malab. in historiam suam transtulerit. Idque non sine turbatione manifesta ordinis numerorum, quatenus Batti-Schorigenam, quam cum arbore Brasiliensi Pino Marcgravii, eandem esse putat, *fecundam*, &

Ana-Schorigenam' tertiam speciem vocat, cum tamen hanc quartum, illam vero tertium locum obtinere, ex antecedentibus pateat. An Tournefortio hi frutices innotuerint, & quid de iis statuat, incertum est; cum nullibi eorum mentionem faciat. Si dicere licet, quid sentianus, neutquam hos frutices inter urticas tolerabimus, nisi novum specimen discrepantis earum characteris (quem dudum quadruplicem hactenus observavimus) exhibere, & quintam urticarum classem statuere animus fuerit. Quamvis enim prima species Schorigenam', cui altera Valli-Schorigenam', excepta volubilitate, per omnia similis est, a J. Commelino eadem genere habeatur cum Urtica pilifera Dioic. & reliqua in racemis suis flores & fructus gerant, ingens tamen ubique recessus ab urticis ratione florum, calycum, seminum, horumque capsularum, deprehenditur; ut proinde non nisi ratione foliorum urendi facultatis cum urticis convenienter, quæ characterem harum intrare, supra § 11 negavimus.

§ XVI. Nolumus igitur hisce diutius immorari, ad ea potius transiuri, unde, quomodo urtica nonsoltum extero suo habitu nos laedat, sed eodem etiam & reliquis sua substantiae particulis insignia adversus morbos remedia suppeditet, cognoscimus. Tò ô, enim laesioñis in ardoris sensu, ac rubidine, cuti inficta, consistere, nemo, ab ea tactus, ambigit, quamvis quibus medijs id fiat, adhuc nesciat. Plinius H.N.L. 1, c. 15, in determinanda agendis ratione, modo aculeatam mordacitatem, mod. dacemque amaritudinem accusans, modo sine ulla spinarum aculeis lanuginem urticæ noxiā esse, & levit tactu pruritum pustulasque, adusto similes, excitare scribens, dubiam sui animi fluctuationem satis prodit, duabusque quæstionib⁹ occasionem præbet: An scilicet dolorificus effectus ab aculeorum, ex caulinis & foliis prominentium, cutisque continuitatem dissolventium sola mecanica struc̄tura, an vero simul ab humore quodam acri, in vulnera proiecio, derivandus sit?

§ XVII,

¶ XIX. ¶ 5

§ XVII. Priori assertioni haud obscure illustris Leopoldina Societatis Praes favebat, dum in Scholio ad obs. 25, dec. 2, Ann. 2, de urtica siccana ribus foeminae, hemorrhagia earum laborantis, cum successu intrusa agentem, ita disserit: *Scio equidem esse, qui Succum urticae causticum, arem admodum & venenosum venditant, vim e- jus urendi capropter eidem imputantes, quam recentior per microscopia ob- servatio confirmare nititur, succum istum in cutem, a spiculorum impulsu lesam, per earundem in extremitate videndum foramen instillari perhibens.* & paulo post: *Verum, ut urtica urendi vim spinulis acutissimi, in planta ista occurrentibus, post celeb. D. C. Baubinum, exc. D. Chr. Langius in diss. de Morbill. egregie adseruit, ita flaccidentibus istis, aut tritu fractis & conquassatis pungendi vim adimi, siue tuto ad compescendas varium hemor- rhagias adhiberi, non est mirum: Succus enim ille, linguam si judicem ad- mittamus, ab imputata acredinis culpa, immunis omnino deprehenditur, lenemque potius aliqualem adstringendi, non corrodendi facultatem ob- tinet, in spiculis autem dictis licet microscopiorum ope cavitas revera occur- rat, succum tamen in eis, qui quidem in basi eorum vesicula in modum am- pliata flagnet, reperire non posui, utique foramen illud, extremitati innatu- tum, microscopia mea, licet alioquin non contempnenda, detegere valuerunt, a melioribus forte manifestandum.*

§ XVIII. Nec defit analogia, sententiam hujusmodi non leviter corroborans; quando Cleyerus, l. c. obs. 7, p. 20, eos refu- taturus, qui ex vesicula, radici dentis serpentis adnexa, virus lethiferum in vulnera manare statuunt, exemplum famuli sui allegat, qui caput serpentis maximis repurgans, cum digitum dente majore, per coctionem cum aqua calcis vivæ, ab omni gurgitarum substantia dudum liberato, fauciaret, iisdem sym- ptomatibus correptus fuit, quæ vivi animalis morsus excitare solet. Quod phænomenon ita quoque móvet Mentzelium, ut in Scholio, p. 22, anceps sit, num vulnera, dentibus viperinis acutissimis inflictum, sive *veneno instillato*, sive *subtilitate sua*, *exitum cruentum denegante*, sive *utroque modo mortalia inferat sym- ptoma*.

§ XIX. Alteram questionem suam faciunt Hookins,

Mi-

Micrographi. obs. 25, Borellus, in obs. microscop. Malpighius, Thes. botan. p. 67, Hoffmannus, in Clave Schroed. p. 567, Leeuvenhoek, Epist. Contin. p. 107, et alii, qui nobis nudo pariter ac armato oculo & *cavā urtica spicula*, & *humore quoque repleta* viderunt, idque non tantum, ut Leeuvenhoek loquitur, in *florentissimo florendi statu*, sed etiam cum teneræ adhuc plantæ sunt, donec per ætatem iterum marcescunt, aut succus insipitus fundum petit. Opera pretium duximus, icones aliquot ejusmodi spinarum exhibere, tam *curvas*, o. p. ut apud Leeuvenhoekium extant, nimisque angustis & rugosis vesiculis insidentes, quam rectas, sub lit. O, P, Q, R quales fese, in O & P cum adhuc vigent, in Q & R autem exsiccatæ oculis ingerant, observata simul vesicularum justa amplitudine, quater scil. minimum spiculorum capacitatem superante. Substantia earum videtur membranacea, figura aciformis sive conica; haud vero triangularis, ut plerique volunt, multo minus tricuspis, ut non nemo loquitur, suntque ipsis spinis molliores, & breviter pressæ statim eructant per apicem aculei guttulam limpidissimi laticis, ut gustari, & ad experimenta impendi queat. Remittente pressione vesiculae, retrocedit subinde guttula in canalem, manifestumque indicium præbet hujus cuspidem *biare*, sed forsitan latera ejus, nisi a succo dividantur, ita connivere, ut nonnullis impervia visa fuerit; qui proinde eam, cuti infixam, frangi debere putarunt, ut contentus liquor inde in vulnus effluat. Quod si expressa guttula non retro cedit, nec per motum plantæ decutitur, tunc exsiccata relinquit circa marginem cuspidis suas moleculas salinas, ut ab his urtica etiam arida, tanquam telum veneno imbutum, ardorem in cute excitare possit.

§ XX. Oritur igitur *dolor*, & *rubor*, atque *tumor* non a solis *aculeis*, autore Langio, l.c. *nervosas partes vulnerando*, *Archeum s. spiritum insitum partis lesa* statim *irritantibus & accendentibus* ut *ad ejectionem spicularum*, in *cute reliellarum*, cum *spiritu influente sang-*

sanguinem ad effectum locum, ibique per excitatum fermentationem pustulas cum ardore generet; &c. sed quod in apibus, scorpio, & viperis locum habet, potissimum aliquore sculeorum salino sulphureo admodum elastico, atque subito humores in puncta partis poris fermentante: quem licet nec cum alcali, nec cum acido congregari viderimus, lingua tamen eum urinosis quid impressisse, chartam exeruleam slavedine tinuisse, & recenti vulneri digni instillatum, aores dolores excitasse, adhuc probe meminiimus. Exhibit analogum scabies, cuius causam Helmontius in falso contagioso que ichore, proprietatem pruritivo & urticale salis habente, consistere scribit, de Lithiasi, cap. 9, S 24, p. 75. Huc facit, quod verbis Hoffmanni in Clave, si liquor ex spiculis exprimatur, urtica sine metu urendi tangi possit, unaque & eadem spina ad repetitam compunctionem cutis adhibita (ut ter quartae interdum absque fractura ejus fecimus) & tandem succo exhausta, non magis urat, quam in arida urtica solet, quæ paucas adhuc exsiccati succi moleculas vulneri inferens, majorem quidem dolorem, quam ab ejusmodi tantillo telo provenire posset, excitat, sed longe mitius tamen servet, quam si fluido adhuc succo turgeret, eumque guttatum vulnusculo inficto instillaret.

S. XXI. Quando jam queritur: cur urtica, more ferociorum gentium, crudeliter imperantes melius, quam mansuetos tolerantum, manibus, eum blande & cum morsa quadam contrectantibus, infensor, quam subito duriterque comprimentibus esse soleat? respondet equidem Bodaeus a Stapel, in notis ad Theophr. lib. 7, c. 7, p. 815, lanuginem duriusculam in superficie ab impetuosa compressione corrupi, ut nocere desinat, simulque a frigore sucii, ex planta expressi, ardorem excitatum subito obtundi: sed non venit viro doctissimo in mentem, id ipsum jam in questione esse, quomodo spicula sine dolore queant cohereri? deinde nec semper succum herbæ exprimi, nec, si omnino simul extorqueretur, ejus frigiditatem in ardore refingendo potentiorem fore,

C

quam

quam nitri atque glacie, nullatenus confessim ab urtica uscis opitulantium, esse solet. Propius igitur ad scopum videtur Leeuvenhoeck accedere, quando l. c. data opera urticarum attingentes, manum digitosque ita componere scribit, ut spicula urticæ non nisi cutem volæ duriusculam, nequitiam autem mollem dorsum, aut interstialem digitorum ferire queant. Præstat etiam aliquid constrictio pororum incurvata manus, animique præsentia, leviculas puncturas non valde curans, adeoque minus sentiens.

§ XXII. Fuimus in recensione *lessonis*, ab urticarum aculeata superficie metuenda, justo prolixiores, hinc quænam ex eadem in bruta non minus, quam homines utilitates manant, consilio oratione exponemus. Vocant Chirurgi *Urticationem*, quando partes corporis recente herba, & imprimis Romana, reliquis urentiori, cæduntur, ut incalescant cum rubore. Inter Veteres Celsum primum fuisse, qui lib. 3, c. 27, *paralyticorum causam ursicia exasperavit*, autor est Epiphanius Ferdinandus, Histor. 46, p. 140, pro sua ingenuitate DEUM testem efficacia huic remedii, plurimis resolutis, post corporis decentem purgationem, nunquam non salutaris, citans. Consentit ipsi totus chorus Practicorum, ex quibus h. I. Riverium, Pr. lib. 1, c. 5, Roflincium, O & M. Med. consult. lib. 2, conf. 19, illust. Wedellium, Præceptorem & Patronum nostrum devenerandum, Amoen. m. m. lib. 1, sect. 2, c. 6, nec non D. D. Præsidis diff. de *Agro paralytico*, manifeste sensum tactus inde recuperante, allegare sufficiat. Quid in *lethargo* crurum Urticatio valeat, ap. Pliniu, H. N. lib. 22. c. 13, & Aretæum lib. 1, c. 2, de cur. acut. p. 149, legi potest. Eandem nonnulli in parte, a profluvio sanguinis remotiori, ad *reulsionem* adhident.

§ XXIII. In *malo ischiadicó* refert Hoeferus, Herc. med. p. 270, *Matronam medicatricem*, & D. D. Lanzonis, Eph. Germ. Dec. 3, Ann. 1, obs. 34, *Ruficum loca*, per urticarum rubefacta & dolentia.

lentia, spiritu vini, aut vino albo generoso abluentes, adstantium obtinuisse admirationem. Sed non opus esse arbitramur, si omnino propria experientia desitueremur, medicis trorum miracula allegare, quæ certe Practicis dogmaticis quotidiana sunt: quatenus hi, quamdiu recentes urticæ haberi possunt, eas applicant, hyeme vero per vesicatoria atque fonticulos adversus dolentissimum istum affectum, pugnant. Qui uterum prolatissimum & propendens int̄ sp̄m rectū urticis ferunt, ut intro fugiant, autores audaciæ suæ, præter priscos, Diocoridem, Plinium atque Avicennam, etiam J. Bauhinum, H. Pl. lib. 30, c. 69, p. 446, G. a Turre, H. pl. lib. 2, c. 73, p. 465, nominant: quos tamen nos non magis imitabimur, quam a *podagra* aut *arthritide rubentia loca*, spe evocationis materiae peccantis ad exteriora, urticantes, cum sciamus, hasce non semel malum ulterius irritasse & inflammatione nocentissima auxisse. Est enim urticatio remedium quodammodo crudele, a quo D. D. Præses non minus, ac vesicatoriis, ipsaque scarificatione quosdam delicatores doloribus, ad animi deliquium & convulsivos tremores acerbis, subiectos fuisse vident.

§ XXIV. Perficent itaque, ut ex Aristotelis lib. 3, c. 20, Hist. animal. audimus, pastores caprarum harum ubera, donec post cruentem atque pus etiam lac emulgeant; nos certe nemini hominum, ut in se tale quid admittat, autores erimus; quamvis Albertus Magnus, lib. de Animal. c. 3, se hoc modo sapientius in mulieribus lac productum vidisse scribat. Cum vero bruta per genitalium urticationem ad coitum incitentur, tentari posset eadem in *viris frigidis*, qui ab uxoribus, ante expetitum coitum, non nisi virgis casu, ad prælium armantur, adeoque sua voluntate coacti cum spe voluptatis vapulant. *Habet enim*, verbis Portæ, lib. 4, Mag. nat. c. 26, *urtica in generationis partibus movendis atque excitandis, nescio quam vim, ut ea quoque gallinarum & galorum pectoribus (deplumatis) verberatis aut confri catis, gloticare*

¶§. X. - 18. / 58.  
eos statim faciat, atque ova incubare, aut pullos recipere & soverē cogat.

§ XXV. Nevero doloris impatiētes absq[ue] solatio dimittam⁹, s[ed] adēmus, ut quamprimum data opera, aut imprudenter ab Urtica ustī sunt, antequam ad remotiora remēdia confugiāt, mox lādentem herbam quovis modo conterant, & expressō inde succo sese obliniant, quille ipse est, de quo loquuntur, omnem urendi vim solis aculeis, nihilque latīcē cōrūm vesiculari tribuentes, quando, ut § 17 relatum legimus, urticā succum a culpa a creditis immunit, lenique potius aliqua adstringēd[ic] facultate prædictum esse ajunt. Pollet enim particulis gummosis, terreis, & sale quodam nitroso, & temperat equidem ardorem, sed tollit eum neutriūm actutum, quod nec reliqua etiam vulgo commendata auxilia, scil: lini, olivarūm, hyoscyami, albumen ovorūm, cortex medius sambuci, succus nicotianæ, lactucæ, portulaca, &c frigidæ gleba, O, &c. præstare valent.

§ XXVI. Ex allatis succi expressi qualitatib[us] jani judicare licet, quo jure Urtica ab Avicenna & Fernelio, lib. 5, de m. med. 25, aliisque, inter herbas in tertio gradu calidas referatur, a Galeno autem, Dodonao atque Chabraxo, primū tantum calidat[is] gradus ipsi assignetur: quatenus scil: isti a superficie, & succo spinarum calidissimo, ad totam plantam argumentantes, non cogitarunt, in contusa, cocta, aliisque modis examinata urtica nil excessivi inveniri, modicumque illud θ acre spiculorum, per contusionem cum reliquis totis substantiæ aquosis, gummieis, Osis, & visque particulis permixtum, prorsus ab his dilui & obtundi, ut sapor austriacusculus, levissime amaricāns, virtusque modo aperiendī & abstergendī, humorumque fluxum promovendi, modo temperandi sanguinis motum p. n. atque cobibendi pro re nata, & applicationis ratione, inde fluat.

§ XXVII. Percipitur autem haec contrarietas affectuum non solum a distinctiā partibus hujus plantæ, quatenus scil. feme[n],

ma-

majori salium, magisque a terra expeditorum copia, quam radix & herba gaudens, ad resolvendi stimulandique scopum sese activius illis gerit, adeoque suo merito a Veteribus secundo gradu calidum & siccum estimatur: Sed etiam una eademque radix, idemque solium, & succus idem morbis diversis, & a discrepante causa ortis, opponi solet, ut ex sequentibus patebit, quando phænomena, circa motum sanguinis se inde exerentia, in scenam producentur.

§ XXVIII. Notum enim est, quantam semper spem Medici in urticam adversus *excretiones sanguinis* collocarint, ut a recentioribus, Carolo Musitano, Chir. theor. pr. Tom. 2, c. 33, p. 152, & Theoph. Boneto, Thesaur. med. pr. Tom. 1, lib. 2, c. 49, § 76, pro remedio specifico earum habeatur. Hinc in hæmorrhagia narium herba viridis & siccata, nec non radices conquaßatae, & succus turunda illitus, aut ad consistentiam solidiorem inspissatus, ipsis tuto ingeruntur: ut proinde singularis Eucharii Roslein opinio, Herb. p. 303, quasi minoris urtica succus sanguinem ex naribus eliciat, neminem ab ejus usu absterrere debeat, cum hic præ reliquis a Schrödero contra narium cruentationem commendetur. Sunt, qui eundem succum cum *fuligine*, aur pro interno externoque usu cum *stercore asinino* miscent, ut in Amoen. mat. med. lib 2, s. 2, c. 19, p. 507, magni Wedelii legimus. Roder. a Castro, uniu. mul. morb. med. p. 2, lib. 1, c. 5, Eman. Vaezium, septuagenarium, sape narium hæmorrhagia diverxatum, semper siccata asini excrements, succo urtica imbuta, secum in capsula, tanquam remedium, sibi simile non habens, gessisse scribit. Idem præstare radicem ore detentam, autor est, post Riverium, Stokerus prax. aur. de collo suspensi, Petrus, Nosol. Diff. 22, § 29, p. 231, herbam sub axillis gestatam, Tabernæ montanus, succum temporibus & fronti applicatum, Diosc. Plinius, Bauhinus, Ruellius &c.

§ XXIX. In *bæmopysi* putat equidem Franc. Ignat. Thiermaier, lib. 2, Consil. 4, succum non tuto in principio adhiberi; sed

tunc demum, quando, post diuturnum spūtūm sanguinis, pars ejus, in pectore stagnans, in pus, mature expellendum, abiit, convenire: sed innititur hypothēsi de caliditate urticæ, supra § 24 improbatæ, confunditque feminis & herba operationes: ut proinde ipsi merito aliorum experientia opponatur. Inter quos Amiatuſ per succi quatuor uncias, diebus quinque aut sex continuis mane potas, herbamque ipsam, jusculis incoctam, ægros, a Medicis desertos, restituifſe, testatur. Qualem Williſius emulsionem ex ſem. rec. pap. alb. hyoſc. & melon. cum decocto rad. urticæ, ut & potiunculam ex foliis urticæ, plantag. bellid. contusis, & cum v̄ portulacæ expreſſis, contra cruoris ſputum paret, vid. Part. 2, S. 2. c. 7, Pharm. rat.

§ XXX. *Hemorrhoides immodicas* in Regio Consiliario, per venefectionem, aliaque remedia hanc coercibiles, Riveriuſ feliciter per duas uncias ſucci urticæ, levi ebullitione depurati, cum paucō ſaccharo, ſedavit, Cent. 4, obf. 81: cuius remedii efficaciam ex aliis quoque Medicis ſibi D. Tancreduſ Robinsonum probaffe, ſcribit Rajuſ, l. c. p. 161, Cnoeffelius, in app. Eph. Germ. Dec. 1, ann. 6, & 7. p. 119, laudat in hoc caſu cingulum, ex linteo urticæ crndo, (torto ex radice texto) ſpermate ranarum infuſcato. Verum præstat quodlibet linteum ſucco herbae imbuere, vel eandem contuſam in cataplasmaris forma dorſo alligare; cum hacce ratione nuper admodum, ſuau D. D. Præſidis, vir conſistentis etatis convaluerit, qui anteā per aliquot annos nucem oſch. atque mace, & poſtmodum, hiſ non amplius juvantibus, ſola tinctura antiphth. Grammanni aliquoties diuturnum, & vires admodum proſternentum fluxum, compescuerit.

§ XXXI. Cum tandem urticæ folia contuſa, vulnerique indita, mox sanguinem ſupprimere, Ferneliuſ teſtetur, M. M. lib. 6, 13, ejusque ſuccus a Riverio, Pr. lib. 4, c. 7, p. 278, miris laudibus ad quemlibet fluxum sanguinis, ex qua cunque parte prodeuntis cohibendum, efferatur; hinc mirum non eſt, eundem lib. 15, c. 3, p.

§ 21

444, etiam ad fluxum mensum immodicum laudari, & succo plantaginis, millefolii, aliisque, ibidem recensitis efficaciorem statui. Radicem de collo suspendit Wittichius ad lochia nimia; alii alia tentant, quibus facultatem plantæ trahmaticam adeo manifestam reddunt, ut de ea ambigendi nullus locus relinquatur.

§ XXXII. Quamvis enim in contrarium ex Fernelio locus, si p̄a § 24 tactus, allegetur, ubi urtica acris, & tantum abstersione raleus dicitur, ut ventrem subducat, renes infarctos expedit, calculosq; terat, adeo que minime pro ischæma sese gerat: virtutis autem menses nimis sistendi, ejusdem emmenagoga opponatur, & post Dioscoridem, ab Avicenna, Bauhino, Quercetano, aliisque eam, sive cum myrrha modico bibatur, sive cum eadem trita utero imponatur, menses evocare afferatur; Alpino item teste, Ægyptiæ mulieres nil habeant, quo magis uterum excalefacere, mundare, & ab obstructionibus liberare soleant. Salva tamen manet antecedens thesis; pro cuius vindicatione veteres quidem ad virtutem quandam propriam & occultam qualitatem provocabant, & ab ea heteroclitos ejusmodi effectus derivandos esse, dictabant; quibus & recentiores suim calculum eatenus, & sub certa limitatione addunt, quatenus ante omnia supponunt, hactenus non de feminis, sed herba potius ac radicis sanguinem sistendi vi sermonem institutum esse: deinde sè penumero cansa fallaciam committi, primaria amque cum secundaria, & per se influentem, cum ea, quæ per accidens concurrunt, confundi, & præterea nec omni tempore, nec in quolibet subiecto effectum promissis respondere. Hinc quamvis urtica particulas valde heterogeneas, aquosas puta, diluentes, deinde terreas, gummosas, obtundentes atque temperantes, & denique salinas, Ossas, sulphureas, resolventes, abstergentes & aperientes, obtinet, & harum beneficio diversa & contraria phænomena exerit; æque ac rhubarbarum & ipecacuanhæ solent, quæ in eodem ægro dysenterico sulphureis salinis suis particulis fedes vomitusque excitant, gummosis vero atque terreis dolores & ex-

*& excretiones tollunt: potissimum tamen, ob variam dispositio-*  
*nem objectorum, & peculiarem crasis sanguinis, reliquorumque*  
*humorum misturam, tot disformium operationum causa evadit.*  
*Prout scil: secundum vulgatum illud axioma: quodlibet agens,*  
*non pro suæ activitatis ratione, sed pro patientis ad recipiendam*  
*ejus actionem aptitudine, operatur, adeoque sol, duram ceram*  
*molliens, molle lutum indurat; camphora membra frigida*  
*calefacit, & inflammat refrigerat; optimum vinum hos læ-*  
*tos & jucundos, illos tristes & morosos, trucesque istos & con-*  
*tentiosos reddit.*

§ XXXIII. Quibus ita fusi in genere expositis, nullo labore recitatrum restantumque urtica operationum speciales  
causa inveniri poterunt: ut prouinde satis fuerit, levi brachio singularum ejus partium commoda, in culinam, pharmaciā, chirurgiam, remque domēticā redundantia, expendere.

§ XXXIV. Antiquos herbam in cibum assumisse, iisque, pro istorum temporum frugalitate, jucundum fuisse, ocimo & urtica sese recreare, legere datur ex Verg. Marcellō, apud Dörstenium, in Botan., quadratque huc ex Persii sat. 6, (nisi piscem forsan intellexerit.)

— *mibifesta luce coquatur urtica.*

Alias evadunt novellæ plantæ summitates medicamentosæ, quando, ut Rajus scribit, l. c. Matronæ Anglicanæ eas cum foliis, primum erumpentibus, verno tempore jusculis incoquunt, ad *sanginem depurandum*. Si vero prius aqua leniter cocta, cum *so* & aceto assumuntur, vomitus excitant, ut turiones sambuci solent, teste Steechio, Art. med. lib. 6, c. 55, p. 36, solvuntque alvum, secundum Schröderum, & utrumque quidem cum euphoria, ut ex Fernelii lib. 5, c. 13, de M. M. patet: *Urtica oxyuelle, raphano domestico, & peponis radice aliquanto acrior, non modo e ventriculi capacitatem, sed partibus quoque et vicinis crassos humores evocat, ac facile minimoque labore vomitu pellit, nec calore, nec acrimonia quicquam offendens.*

§ XXXV.

§ XXXV. Poterit hoc pacto recte *alexiterium cicute & hyoscyami*, nec non *cerussa & fungorum* a nonnullis salutari: quatenus assumta nocitura per vomitum expellit. An vero cum energia sufficientia Nicandro, Apollodoro & Quercetano venenis serpentum atque scorpionum, & a Dioscoride canis morsibus, gangrenis item, & carcinomatibus, sordidisque & cacoethicis ulceribus, nec non luxatis, panis, parotidibusque &c. opponatur, aut inter morbillos & variolas expellentia remedia, absque periculo turbationis conatum naturae, a Schroedero, in tumultaria virtutum recensione, & Sam. Mullero, in *Vade mecum botan.* p. 890, referatur, merito dubitamus, nec, presentibus efficacioribus, in proletario ejusmodi pharmaco acquiescimus.

§ XXXVI. Apud Hippocratem, lib. 2, de diet. § 27, edit. Linden, stat urtica inter τὰ ἄγρια λαχανά, ολέρα στυβεστρία, & subnectitur immediate una cum scopolendrio, mentha, sefeli, caucalide & hyperico τοῖς χυροῖς διαγένησις, crethimi scil., apii, allii &c. Hinc quamvis a Foesio, Sect. 4, p. 360, per mutatam interpunctionem, ea cum suis sociis mox ad sequentia διαχωρία, καὶ παδαγγία, ciceri puta, lenticulam, hordeum, betam &c. deiiciatur, horumque proprietates ab ipso Hippocrate in antecedentibus lincis expositae, in ipsam magis, quam diureticorum nota, ibidem recitatæ, quadrate videantur, sumus tamen persuasi, Lindenium Coimenterem clarius quam Foesium perspexisse, cum ipse Dioscorides foliis coctis, præter vitutem *alvum emoliendi*, etiam *urinam movendi*, aperte tribuat, & per sequentium seculorum experientiam tota planta in classem medicamentorum, calculum immunitentem prohibentium, presentemque resolventium transferit; dum Medici hanc virtutem ex insigni ejus abstergendi, materiamque viscidam, tartaream & sabulosam, cum euphoria & levamine ægrorum, per urinam educendi potentia, concludentes, eam passim a tartaro calculo que afflictis commendarunt, ut hodie non tantum in una alteraque Serenissimorum Principum aula, sed etiam ab aliis personis folia loco theo usurpentur: idque optimo consilio, cum hac ratione crassiores impuritates chyli peralvum,

& subtiliores per vesicam educantur. Tabernæmontanus propinat ȝi floscilorum cum vino rhenano calefacto. Leviathan Rabbi, citante Heurnio L. 2, Meth, ad prax. p. 191, miscet succi urtic. græc. ȝiȝ, cum ȝȝ amygd. amar. ȝi, vin. rhen. ȝiȝ, præsentissimumque auxilium ex hac potiuncula ter quaterque ægro oblatæ, non sine ratione pollicetur.

§ XXXVII. Postquam Dioscorides urticam, cum ptisana coctam, etiam *vitia pectoris extrahere* scripserat, herbam modo solam, modo cum semine & radice sumtam, apud Plinium, Galenum, Avicennam, Bauhinum, Scribonium, Sennertum, Quercentanum, Roflinicum, a Turre, Musitanum aliasque plurimos, sub varia, conservæ, trageæ, infusi, decocti, sirubi &c. forma, protus, asthmate, orthopnoea, ipsaque phthisi, imo pleurifide & periœmonia laudatam deprehendimus, prout scil. vel digerendi & resolvendi, vel temperandi & evacuandi necessitas ejus usum indicarunt.

§ XXXVIII. Propter multitudinem enim suarum qualitatum, non solum totrecensis malis apta est, sed ad aliorum insuper mitigationem utilis evadit. Unde Bayrus de morb. distinct. 1, tract. 5, c. 3, ad *epilepsiam*, a succo melancholico dependentem, inde levamen petit. Christ. Wirsung, Herb. part. I. c. 9, p. 120, succum *auribus*, *vermibus*, *scatentibus*, instillat, simulque radicem comedendam exhibet, extemporaneum inde effectu spondens. Non tantum, qui ex *signature* vires medicamentorum assimilant, ex colore flavo, quo radix, cum ovis & linteis cocta, ea inficit, hanc ad *icterum* idoneam censem, sed alii etiam ad elementa ejus magis attendentes, eam ob facultatem aperiendi in hoc affectu experti. Ex multis formulis unam adducemus minime artificiosam, quam Willius celebre Antiætericum Gesneri vocat, Ph. rat. p. 2, l. 2, c. 1, p. 146, *re*. rad. urtic. maj. ȝiȝ, Crocidij, contundantur probe, & cum vino albo extrahatur tinctura, dosis ȝiii, mane per 4 vel 5 dies. Legitur idem remedium apud Tabernæmont. p. 921, & in Jonstoni quoque Synt. univ. med. pract. lib. v, p. 970, sed suppresso autoris nomine, & sine ulla dosi, & modo utèdi

§. XXXIX. Idem Ionston ponit inter *magica remedia*, quando isterici, quotidie in urticis virenres minigendo, reconvalscunt, quamprimum hæ exarescunt. Quorsum etiam modus *eventum morbi* hariolandi pertinet, quando Durantes ex urticæ, recenter evulsa, & per viginti quatuor horas in ægroti lotio assertatae constante viriditate vitam, ex mutato autem ejus colore, grave periculum, & mortem prænunciare, jubet. Certius his signum superstitis vita Tabernamontanus ex *rubicidine* sumere docet, si enim hominis, sine sensu & motu jacentis, urticis cælæ partes induunt, mortis vero, si pallidæ manent.

§ XL. Pro *lienosis* miscet Dioscorides urticam cum cera-to, suntque inde fots & cataplasmata pro *apoplectis & paralyticis*, nec non *articulorum doloribus* vexatis, adiiciendo adhuc alia, singulis affectibus convenientia, quæ ap. Cardanum, Heurnium, Sennertum, Ioh. Schenkium &c. videri queunt. Sic pro *febris intermitt.*, *fugandis* a Theoph. Erefio, Nicolao Nicolo, cap. de Tertiana, Langio L. 1, Ep. 53, Cratone lib. 5, Cons. 26, &c. nunc radix sola, nunc folia, sale, meliloto, sem. papav. albi & nigri mista, temporibus, carpis atque pedibus alligantur. Gargarismata ad udam, ex *inflammatione tumentem*, laudat Diſcor. ex succo; quæ alii ex aceto pro re nata, aut vino, cum radice cocto, parant. Sennertus, omisso aceto, retinet vinum, additique urticæ herbas adstringentes, & radicem pyrethri atque zingiber, pro *uvula & gingivis firmandis*, *sordidis oris ulceribus* extergencis, *orisque foctore* corrigendo. Ingreditur igitur herba nostra etiam Aquam I. B. Portæ, a Musitano. Trutin. med. chim. lib. 1, c. 36, p. 355, valde laudatam adversus *mobilitatem dentium*; quorum *dolorem* Riverius lib. 6, c. 1, decocto, ex radice & pauxillo N Mosch. atque croci cum acero & vino concinnato, & calide in ore detento, vel ficibus, pane, foliisque urticæ simul in cataplasmata contusis, maxillisque admotis, mitigare studet. Heurnius, de dent. morb. p. 502, imponit ipsis dentibus *urtica cineres* cum succo porri, quos novimus hodie a nonnullis, ceu singulare arcanum, in petium ligari, ut inter dentes contineri queant. Forestus succum herbæ cum □

§ 26. §  
pueri mistum, & *utero ulcerato* injectum, eum mirifice purgare  
tradit, obs. 48, lib. 22.

§. XLI. Non minorem hactenus relatis virtutem quoniam aquæ, ex herba per vesicam destillatae, adscribebant; quod tamen impossibile esse, facile cognoscet, qui particulas salinas atque  $\ddot{\alpha}$ reas urticæ fixiores esse, considerabit, quia ut rudi ejusmodi opere ultra alembicum transeant; quin potius, post expressio-nem validam capit is mortui, & ulteriore brodii inspissationem, in rob ingrati & amaricantis saporis abeant, simulque & concre-tum quoddam tartareum, sive sal essentiale, ut vulgo vocant, præ-beant, minime speciosum aut crystallinum, ut ex acetosa, aliisque valde sapidis herbis venit, sed lutosum fere, & exiguis spiculis or-natum. Quod si vero herba tota contusa, &, post aliquod die-rum fermentationem, cum affusæ aquæ s. q. vesicae, vel sine pere-grino humido B.M. traditur, prodeunt liquores sapore suo acri atque odore (ab initio halecibus infumatis fere simili, lapsu tem-poris autem gratori evadente) salis sulphurisque resoluti præ-sentiant testificantes, adeoque in multis quidem a nativa plantæ indole recedentes, nec ad sanguinis fluxum amplius impenden-di, sed ex adverso ulceræ fordida & cuius vitia abstergendo, ob-structiones viscerum aperiendo, sudoremque & urinam ciendo, ipsi multum superiores.

§ XLII. Post Romanas, præstat ad has operationes urti-ca minor, cuius rob non adeo saporis abominabilis existit, ac ma-joris: Cum contra ea hujus radicis decoctum per inspissati-onem saporem subdulcem, & nescio quid violaceum referente acquirat, virtutis egregia & matri suæ conformis. Extrahitur inde facili negotio per  $\psi$  tintura rubella, blanda, pectoralis & diu-retica, pro lubitu cum aliis miscenda.

§ XLIII. Oleum athereum ex herba fermentata nec ex-pectavimus quidem: ex non fermentata autem contenti fuimus vidisse miculas quasdam oleiformes, liquoris innatantes, non nisi per apicem digiti capiendas, linguaeque non æque adversas; si vero radix sicca in retorta, vitrea calore forti urgetur, fundit ab initio

initio liquorem aquosum, quem alias acris, nebularum forma  
maxima ex parte prodiens, sequitur, cum oleo duplice, uno super-  
nataente fusco, altero fundum petente nigro, & salis volatilis mo-  
leculis, parietibus excipuli affixis. Est horum omnium odor  
empyreumaticus, & si oleo gravior, sapor lingvam diu mors-  
cans, ut proinde nil minus, quam turticæ qualitates, si diuresin ex-  
ceperis, possideant.

§ XLIV. Caput mortuum nigrum, leve, per ulteriorem calcinationem in cinerem redactū, longe minorem molem salis fixi offert, quā radix, eadē quantitate aperto igne combusta sollet; ex qua, ut & ex herba ipsa notabilis istius quantitas colligi potest. Album hoc fit & scintillans, si per repetitā solutionem & coagulationem depuratur, ut quod hujus generis salia faciunt, acidum morbosū in primis viis obtundendo, viscidas cruditates resolvendo, alvumque nonnunquam & urinam ciendo, plurima commoda hypochondriacis, & scorbuticis, acore justo nimio humorū onustis, præster, retineatque hoc pacto *salis stomachici* dignitatem, a nonnullis ipsis obtrusam, si, ut in pulvere Birkmani fit, aliis absorbentibus, incidentibus & aromaticis miscebitur, ubi quantū in se est, acorem vitiosum temperabit, reliqua autem ingredientia circa calorem vitalem, tonumque & fermenti vigorēm occupabuntur.

§ XLV. Non possumus non hoc loco varietatis figurarum, quibus frigus in lixiviis vegetabilium congelatis ludere solet, meminisse, dum schemata plantarum crematarum, earumque partium subinde adeo nitide adumbrat, ut ea spectantium animis, nescio quam opinionem de virtute seminali, ideaque totius concreti, in ejus cinere & Θe fixo laritante, ingenerent. Memorabile est inter alios, non superficiariæ eruditio viros, etiam Quercetano talismodi phantasmatu illusisse, ut debile lixivium, exurticæ cinere tractum, & per noctem in testa a frigore in glaciem constrictum, mane videns, verbis Helmontii, § 12, Tr. Pharmacop. ac Dispersis. nov. p 438, miratus exclamaret: *Ehem frondium urtica figuram in glacie conspicio! gavisusque axioma fundare:*

¶ 28 ¶

quod in cinere ens seminale figurativum berbarum, ignibus invictum, permaneret.

§ XLVI. Quales harū frondiū, in glacie depictarum, facies fuerint, cum nec Helmontius, nec ipse Quercetanus scripto reliquerint, lubet eas, quæ nostris oculis præterita hyeme plus simplici vice, distinctisque temporibus constanter, lit: S; T; V, in lixivio, X, autem in decocto herbæ sese obtulerunt, exhibere, quibus bina melissa num. 1, 2, & totidem betonicae, no. 3, 4, atque salvie no. 5, 6, archetypo satis bene respondentia schemata, in aquis destillatis visa, una cum ipsis figuris, quæ no. 7, & 8, in hyssopi, & no. 9 in tussilaginis Vis, origini non adeo similes apparuerunt, subiunximus. Idque in eorum gratiam potissimum, qui Spiritum aliquem Mundi architectum ejusmodi spectaculoruſ faciunt; ut cognoscant, eum circa urticas, neglectis ceteris earum partibus, id quod maxime mirabile in iis est, repræsentando se valde ingeniosum, circa sex reliquas solerterem, in tribus ultimis autem de pingendis, oscitantem negligentemque exhibuſſe.

§ XLVII. Sed missa lubrica glacie, ejusque levibus umbris, ad ſeminis vires, & reliquias urticæ uſus exponendos redeundum eſt. Colligitur illud mense Julio & Auguſto, in primis Romanum, noſtrate actiuius, quod in calidioribus regionibus natum, ad primam mansio- nem tertii caloris gradus affurgere, ajunt, cum apud nos natum, in ſecundo ſubſiftat. Mirum itaque videtur, ipsum a Petro de Abbaño, c. 50 de Venenis, adeo acre ſtatui, ut comedendum os & guttur excoriet, & mihi ardenteſ reddat, & proinde oleum amygd, dulc. lapis bezoar. & mucilago ſem. cydonior. bibi debeant. Fluxit error ſine dubio ex verbis Dioscoridis, quibus iſtud erodentibus medicamentis admiferi aſſeritur: unde Vidg Vidg, Part. 2, lib. 2, c. 3, p. 339, de curat' gene- ratim, occaſionem nactus eſt, ſemen inter immodiſ calore noceſtia, uni- versum corp̄ inflammatia, ardorem in ore, gula, ventre & intelliſiſ excitantia, eaque exulcerantia numerare: Cum contra ea Galenus, lib. de med. ſimpl. rectig latifimum vocabuli erosionis ſenſum perſpiciens, ſemen a- que ac herbam minime vehementer calefacientem aut mordacem, ſed di- rentem poti⁹ & reſolventem, & ſine morſu exſiccantem facultatem obtinere doceat.

§ XLVIII. Quid in pectoris affectibus valeat, ex antecedentibus liquet.

liquet. In urina cienda, calculo que movendo reliquas urticæ partes multum superat, quacunque forma usurpatum. Encomia ejus vid. ap Trallian. L. 9, Rolfinicum, l. c. Frid. Dekkerum, Exercit. practi circa m. med. Mynsichtum, Musitanum &c. Hoffmannus in clave, p. 567, jubet die Maria Magdal. cum ☽ & ☾ ingreditur, tempore matutino semina, rore adhuc madida, colligere, eorumque in umbra siccatorum 3ii, cum pulu. foliorum querç tenell. & liquirit. à 3ii saccharique f. q. ad gratiam miscere, & singulis pleniluniis ac noviluniis 3i ad 3i pro calculo expellendo propinare. Faventing ex decocto sem. urtic. nap. à 3ii, rad. gram. faxi. frag. à 3i c. v parato, & cum nuc. perficor. 3i, in emulsione misto, post aliquantulum somnum, mictumque lapidem promittit.

§ XLIX. Virtus *aphrodisiaca*, præter Medicos veteres atque recentiores etiam meretricibus innotuit, quæ, I. Bauhino teste, id amatoribꝫ suis stimuli loco ad venerem porrigunt. Vehiculum ipsius a Dioscoride laudatur passum, sec. Æmilium Macrum de Herb. virtut. autem

*Cum vino bibuum venerem semen moveat ejus, (scil. urticæ)*

*& melius trito, si jungas melique piperque.*

An ex flatulentia, actu vel potentia tali hæc virtus sit derivanda, illi definiunt, qui hanc, ex Galeno desumptam distinctionem, ventilare amant. Carminativum enim semen esse, cum ejus elementa, tum Amati cur. 95, Cent. 6 docet, ubi viro, loco genituræ flatum excernenti, inter alia, etiam illud commendatum legimus. Idem *uterum aperire*, autor est Dioscorides, unde *sterilitati interne atque externe opponitur*, apud Sennertum & passim. Purgat uterum, ciet menses, medetur *passioni hysterica* & *fluori albo*; de quibus vid. Hippocrates, de Nat. mul. & alii.

§ L. A *purpura* serenissimam personam urticæ semine, per 14 dies usurpato, liberatam fuisse, didicimus ex Colleg. Wedeliano de morb. extern. sect. 1, c. i. Contra febrem intermittentem quotidianam adhibetur a Mercato, lib. 6, de feb. p. 415, informa pilularum, quas Avicenna ex agar. & sem. urticæ à 3ii, cum melle conficeret consuevit. Externe ingreditur clystères & emplastrum rubificantia pro *apoplecticis*, quibꝫ Empiricus Wurtenbergensis lingua fricando loquelam reddidit. Cancer inspergit pulverem Theod. Dorstenius, Botan. fol. 301, præunte Galeno & Fernelio l. c. Oleum expressum alvum emollit, sumptum & per clysterem injectum, pellit urinam, faciat ad expectorationem, infillatur auribus ulceratis, illinitur pernionibus, imo, quod mireris, labii etiam mammisque fissi. Si 158 sem. urtic. min. cum 3 iv rad. raphan. sylv. in talecolos scæti, rad. ari & pip. long. à 15ii (forsitan 3ii) cum vini malvat. vel  
the.

¶ 30 ¶

Rhenani opt. s. q. per 140° digeruntur, hinc per alembicum liquor evocatur, prodit Aqua ad ariduras Hoffmanni, in Thes. pharm. S. I, no. 8, descripta, qua linta made sunt, iisque membra arida bis torque in die fortiter fricantur, ut incalescant.

§ LI. Cum illustri Wedelio autore, cap. 2, de sale vol. plant. p. II, in semina plantarum, ductu naturali, & extraneo calore vegetante solari, vis & anima quasi omnis abeat, recumbatque in his, cœn in punto ultimo, sal volatile, inclusimus 3x sem. urtic. maj. & vitrea, ubi prodiit ex balneo sicco phlegma per guttas, mox nebulosus, cum salis volat. crystallis flavis, diaphanis, absque certa figura & angularorum numero, capaci excipulo affixis, & tandem ex crassum foetidissimum, quod cum ▽, & u & sal. volat, confusum, pendebat 3v, quæ salis fixi, partim ex  $\ominus$  huic distillationis, partim ex herbae cineribus extracti 3x superfuse, prævia aliquot dierum digestione, ex cœcurbita liquorem penetrantissimi odoris atque saporis, olei flavi modicum, nil vero salis volatilis largiebantur. Abierat enim pars ejus in poros phlegmatis, ut totum latex & um referret, parte altera a  $\ominus$  nigrante absorpta, ex quo per cohabitationem in alembicum post & um & ex elevabatur, quantitate fere maiore, quam ex  $\ominus$  prodierat, manifesto indicio, portionem olei salinum habitum induitæ, ab igne & sale fixo alteratam.

§ LII. Semen urticae minoris fundit quidem largiorem humiditatem, quam modo dictæ majoris; sed est debilitas sapore atque odore: quam sine dubio reliquis speciebus multo activiore Romiana suppeditasset, si hunc labore sufficiens pondus præsto fuisset.

§ LIII. Claudimus tractationem urticarum usu earum domesticæ. Papulares mei, inquit S. Pauli Quadr. Bot. certo experimento cœfervi, si recentis intempestiuam fermentationem inhibent, eamque a tontri defendunt, collocando in dolis urticam urentem maximam, & frusta chalybis. Sit fides penes antorem. De lineis pannis delicatis, in India orientali apud Calecutos & Goas ex urticarum cortice, diu in aqua macerato textis, & inde in regiones occidentis translatis, legi potest Lobel in stirp. Adv. An, quod nomen svadet, illi panni idem sint cum hodierno Netel vel Nett. Itchy in meo relinquimus, Mercatorum nostrorum negligentiam in cognoscenda origine mercium suarum merito increpat. Videri possunt de hac materia Georg. a Turre Hist. plant. lib. 2, c. 73, p. 461, & Iacobus Wolffius Scrut. amuletor med. C. 2, sect. 1, p. 200.

D. S. L. H. E. G.

I. S. A.






Jena, Diss, 1707 A-V  
X 2396251


ULB Halle  
006 205 95X

3



Vol 18





L. D. B. V.  
DISSE<sup>T</sup>AT<sup>O</sup> MEDICA IN AVGVRALIS  
*1702. 19d*  
DE  
**V R T I C I S**  
*25*  
QVAM *b. a. u. n. v. p. a. l. u.*  
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO  
SERENISSIMO PRINCIP<sup>E</sup> AC DOMINO  
DOMINO  
**V V I L H E L M O H E N R I C O**  
DVCE SAXONIÆ JVLIA CI CLIVIÆ AC MONTIVM  
ANGARIÆ ET WESTPHALIÆ e. r.  
P R A E S I D E  
**J O . H A D R I A N O S L E V O G T I O**  
HEREDITARIO *in Ober-Rosla*  
MED. D. AN. CHIR. ET BOT. P.P.  
IDEM QVE MED. DVC. PROV.  
PATRONO P R A E C E P T O R E  
AC PROMOTORE SVO  
GRATA MENTIS SVBMISSIONE VENERANDO  
**P R O L I C E N T I A**  
SVMMOS IN MEDICINA HONORES  
ET PRIVILEGIA  
RITE CAPESSENDI  
PVBLICÆ ERVDITORVM DIS<sup>Q</sup>VISITIONI  
TRADIT  
**J O A N N E S M E L C H I O R** *Brechßler/*  
WANSLEBIO-MAGDEBURGENSIS  
IN AVDITORIO MAJORI  
HORIS ANTE ET POMERIDIANIS  
D. MAI ANNO MDCCVII.  
J E N Æ  
TITERIS COLLVERIANIS