



XIII, 84.


3. 906.

111.907.
CHRISTIANI SIGISM. RICHTERI,
MEDICINAE QVONDAM DOCTORIS
ET PRACTICI,
SVCCINCTA RECENSIO
DE
MEDICAMENTIS
ALIQVOT SELECTIS,

QVAE
HALAE MAGDEBVRGICAE
IN ORPHANOTROPHEO
DISPENSANTVR,


ET
QVORVM LEGITIMO VSV
NON LEVES TANTVM, SED GRAVIORES
QVOQVE MORBI,

TESTE LONGA EXPERIENTIA,
FELICITER DEPELLVNTVR.



EDITIO TERTIA
PROCVRANTE

D. DAVIDE SAMVELE DE MADAI,
SERENISSIMI PRINCIPIS ANHALTINO-COETHENI
CONSILIARIO AVLICO ET ARCHIATRO,
ITEMQVE PRACTICO IN ORPHANO-
TROPHEO HALENSI.



HALAE,
LITTERIS ORPHANOTROPHEI
ANNO M DCC LXXII.

Quum tanta sit audacia fraudatorum, qui nostra me-
 dicamenta per quam illicite imitantur, vt nostro fi-
 gillo, quo obfignare medicamenta solemus, abuti, atque
 effreni æmulatione illud effingere non dubitent: nostrum
 esse putauimus, vt quemlibet de eo moneremus, ne ab eius-
 modi hominibus incautus in errorem inducatur. Alii
 quidem sigillum Richterianum, tam ratione signi, quam
 inscriptionis nominum Inuentorum beate defunctorum,
 integrum repræsenterunt; alii vero, qui paulo moderatio-
 res videri gestiunt, nomen quidem suum aut symbolum
 quoddam sigillo Richteriano adiecerunt, ita tamen vt ista
 ob litteras minutissimas sine microscopii ope vix legi aut
 cognosci queant. Vt igitur, si quid a nobis fieri potest,
 fallaciæ istorum hominum obicem ponamus, consultum
 videtur, ista sigilla, quibus medicamenta nostra obfignari
 a nobis solent, paulo grandius expressa hic exhibere, vt
 quisque litteras illis incisas et inscriptionem nominum eo
 distinctius legere atque a noxa falsorum medicamentorum
 sibi cauere facilius possit.





PRAEFATIO
AD LECTOREM.

§. I.



PRAETERFLUXE-Initium et
runt iam anni quadragin- progressus
ta sex, et quod excurrit, huius insti-
cum beatus focer meus, tuti.

CHRISTIANVS SIGISMVNDVS
RICHTER, Medicinæ Doctor, et fra-
ter ipsius germanus, CHRISTIANVS
FRIDERICVS, Medicinæ itidem Do-
ctor, *medicamenta quædam selectiora* in
vsum orphanotrophei, quod heic est,
adinuenire atque præparare iunctim
cœperunt: quæ huc vsque quidem,
tam intra quam extra Germaniam,

a 2

magno

magno cum fructu per diuinam gratiam, a multis ægrotis vsurpata esse constat. Quoniam autem *instituciones* atque *instructiones*, quas de recta eorundem adplicatione ediderant, diuersis iterandæ fuerunt temporibus: subinde quædam factæ sunt accessiones, quibus horum medicamentorum vsus paullo vberius et accuratius exponeretur, donec b. agnatus noster, D. CHRISTIANVS FRIDERICVS RICHTER, paullo ante nominatus, anno MDCCVIII. pleniorum illum tractatum germanicum, qui *Höchstnöthige Erkenntniss des Menschen, sonderlich nach dem Leibe und natürlichen Leben &c. i. e. COGNITIO HOMINIS summe necessaria, secundum corpus potissimum et vitam naturalem considerati*, inscribitur, in lucem publicam mitteret. In quo non tantum perspicua instructio continetur de valetudine hominis eaque tuenda, item de variis morborum causis, indiciis et appellationibus: sed docetur etiam, quomodo quisque, deficiente medico, hæc medicamenta, in commodum *domesticæ, portatilis*

Tractatus
primus
hac de re
editus.

lis et castrensis apothecæ compendium selecta, tam in leuibus quam grauioribus ac periculosis morbis recte adhibere et in valetudinis vsu conuertere ipse queat.

§. II.

Qui quidem tractatus etsi pluribus vbique fere locorum comprobatus maximeque utilis visus est, vt iam decima quarta eius editio anno MDCCXLVII prodierit: reperti tamen sunt passim, qui eum iusto ampliorum putantes in votis habuerunt, vt arctius contractus et in *compendium* redactus, propter commoditatem, præsertim iter facientium, ederetur. Istud autem facere hac de causa dubitauerunt antecessores nostri, quod verebantur, ne tractatus iste maior deinceps negligeretur aut indiligentius legeretur: quum tamen in eo edendo id illis maxime curæ fuerit, vt in primis ii, quibus placeret nostris vti medicamentis, ex crebriore sæpiusque repetita huius libri lectione aliquam notitiam

Causæ hunc tractatum edendi curæ primum sint neglectæ.

de natura hominis, eiusque proprietatibus, ac motibus in corpore accidentibus; de valetudine, quam illa in re proprie consistat, et qua ratione aut conseruetur aut laedatur; item de morbis horumque caussis, signis et differentiis, ac denique de ægrotantium regimine haurirent. Hoc enim pacto futurum existimabant, vt lectores non aptiores modo redderentur ad medicamentorum, secundum methodum ab ipsis præscriptam et commendatam, adplicationem; sed facilius etiam animis conuiescerent, sibi que persuaderent, nihil esse in ægrotis curandis prætermissum aut neglectum: licet effectus, quem sperant, non semper e vestigio ac manifesta cum demonstratione, (quod quidem multi volunt atque optant,) subsequatur; quippe quod in hominis potestate sæpe non est situm.

§. III.

Expeditur
breuior

Alii desiderauerunt, vt ex memorato

morato tractatu saltem *institutionem*, ^{quædam} ^{institutio.}
 qua distincte doceatur, quæ medi-
 camenta, quo modo et aduersus
 quos morbos ac adfectus adhiberi
 debeant, extrahendam et seorsim
 imprimendam curarent: quo et iis
 ex parte consuleretur, qui tracta-
 tum maiorem aut non emere pos-
 sunt, aut quibus ampliozem illam
 instructionem perlegere per tem-
 pus aliasque occupationes non
 licet.

§. III.

Atque hoc quidem sæpius est pro-
 missum; sed in aliud semper tem-
 pus reiectum: donec focer noster
 D. CHRISTIANVS SIGISMVNDVS
 RICHTER instantibus multorum
 exterorum precibus et monitis ami-
 corum eo tandem adactus compul-
 susque fuit, vt illud anno MDCCLXX.
 et quidem in gratiam linguæ germa-
 nicæ expertium, sermone *latino* effe-
 ctum præstaret.

Quæ tan-
 dem in hoc
 tractatulo
 exhibetur.

Quando igitur post dilectissimi

a 4

foceri

foceri beatum e vita excessum, qui
 anno MDCCXXXIX contigit, medica-
 mentorum cura in Orphanotropheo
 nostro mihi concredita est, quia
 ipso viuo per aliquot retro annos
 medicamenta ipse præparauit et ex-
 petita consilia medica conscripsi;
 præterea itidem sæpius rogatus sum,
 vt de medicamentorum nostrorum
 vsu et effectis breuem aliquam re-
 censionem ederem: huic etiam de-
 siderio satisfaciendum duxi, eumque
 in finem latinum illum foceri tracta-
 tulum laboris mei fundamentum
 esse volui, vt eum lingua quidem
germanica euulgarem, paucis qui-
 busdam medicamentis, quæ inse-
 quuto tempore, Deo studium ac la-
 borem clementer prosperante, in-
 uenta accefferunt, simul recensitis,
 iis etiam, quæ ratione priorum me-
 dicamentorum eorumque vsus, mu-
 tata et emendata sunt, insertis. Pro-
 diit hic libellus *germanicus* anno
 MDCCXLVI, et nunc quidem latine
 iste, me quoque procurante, denuo
 exit, dictis additamentis, mutationi-
 bus et emendationibus auctus.

§. V.

§. V.

Medicamenta igitur, quorum Recensio
 vsus et adplicandi modus in hoc tra- medica-
 ctatulo præscribitur, vt primo loco mentorum
 recenseantur, instituti ratio requirit. cum pretii
 Sunt autem illa, quæ sequuntur: denotatio-
ne.

1. Essentia dulcis I loth I Imper.
2. Essentia amara I loth 4 gr.
3. Essentia anthypochondriaca, (sub
 nomine germanico *Miltz-Effentz*
 h. e. Essentia pro liene, magis
 nota.) I loth 4 gr.
4. Pilulæ polychrestæ I loth 16 gr.
5. Pilulæ contra obstructiones
 I loth 8 gr.
6. Pilulæ purgantes I loth 12 gr.
7. Puluis bezoardicus I loth 4 gr.
8. Puluis antispasmodicus I loth 4 gr.
9. Puluis contra acridinem (vulgo
wider die Schærfe) I loth 3 gr.
10. Puluis vitalis I dosis I gr.
11. Balsamus cephalicus I drachma
 6 gr.

§. VI.

Hæc medicamenta, quæ nomina- Modus dis-
 vimus, tam singula separatim dif- trahendi
 pensantur, quam vniuersa coniun- hæc medica-
 camenta

a 5

Etiam

per sic di- Etim, in cistula quadam, ad istum
 Etas apo- cum primis vsu aptata et in com-
 theculas. modissimam *domesticæ, portatilis et*
 castrensis *APOTHECVLAE* formam
 instructa. Hanc autem ob causam
 cistulas illas *Apothecularum* nomine
 insignitas volumus, quod hoc, licet
 exiguo, medicamentorum numero
 et adparatu morbis illis omnibus, et
 pluribus etiam, occurri efficaciter
 potest, ad quos alia quæcumque,
 in officinis publicis obuia, vulgo
 vsurpantur. Hinc paucula illa, si
 virtutem et efficaciam spectes, tan-
 tumdem et plus etiam valent, quam
 ingens multitudo medicamento-
 rum, quæ in officinis communiter
 dispensari solent: quamuis horum
 numerus longe supra mille adscen-
 dat. Præterea tutissimus est horum
 medicamentorum vsus, vt nihil pla-
 ne metuendum sit mali, ne tum qui-
 dem, cum non satis congruenter,
 quod interdum fit, ægrotis adpli-
 cantur, et morbi a morbis minus
 sollicite dignoscuntur. Habent et-
 iam hæc medicamenta durationem,

et

et citra dispendium aut corruptionem in remotissima deportantur loca: ita ut, si reliquum modo tempus in loco quodam opaco et frigidiusculo adseruantur, plurimos per annos sine virium deminutione retinere illa possis.

§. VII.

In adornandis autem et instruendis huiusmodi *apotheculis* ratio habetur impensarum, quas quisque facere cogitat: adeoque ad 5, 10, 12, 16, 20, etiam 30, vsque ad 100 et plures imperiales instruuntur, prout singulorum medicamentorum maior vel minor quantitas additur.

§. VIII.

Ut autem cuique certius constare possit, quænam medicamenta et quanta singulorum copia in *apotheculis* his, pro diuersitate pretiorum diuersis, reperiatur, illud in sequentibus distincte ostendemus.

In

In apothecula quinque imperialium continentur

	Imp.	Gr.
Essentia dulcis 1 loth	I	-
Essentiæ amaræ 3 loth	-	12
Essentiæ anthypochondriacæ 2 loth	-	8
Pilularum polychrestarum 1 loth	-	16
Pilularum contra obstructionem 1 drachma	-	2
Pilularum purgantium $\frac{1}{2}$ loth	-	6
Pulveris bezoardici 3 loth	-	12
Pulveris antispasmodici 3 loth	-	12
Pulveris contra acredinem 2 loth	-	6
Pulveris vitalis 12 doses	-	12
Balsami cephalici $\frac{1}{2}$ drachma	-	3
Pro lignea cistula	-	4
Pro vitris	-	3

5 Imperiales.

§. VIII.

Apothecula pro sex imperialibus.

In apothecula sex imperialium in-
sunt omnia, quæ modo recensui-
mus, medicamenta: quibus addi-
tur etiam compactum exemplar me-
morati tractatus germanici *Unter-
richt, h. e. Cognitio hominis cat. et*
quum

quum aliquid pecuniæ superfit, valor illius Effentia dulci aut alio quodam medicamento compensatur.

§. X.

In *apotheca octo imperialium* habentur

	Imp.	Gr. Apotheca
Effentia dulcis $1\frac{1}{2}$ loth	I	12 ^{la pro octo}
Effentia amaræ 3 loth	-	12 ^{imperialibus.}
Effentia anthypochondriacæ 2 loth	-	8
Pilularum polychrestarum I loth	-	16
Pilularum contra obstructio- nes I drachma	-	2
Pilularum purgantium $\frac{1}{2}$ loth	-	6
Pulueris bezoardici 3 loth	-	12
Pulueris antispasmodici 3 loth	-	12
Pulueris contra acridinem 2 loth	-	6
Pulueris vitalis 16 doses	-	16
Balsami cephalici I drachma	-	6
Compactum libri germanici exemplar	-	20
Cistula, rubro corio obducta, oris deaurata et bene mu- nita	I	16

8 Imperiales.

§. XI.

§. XI.

Apotheca pro decem imperialibus. In apotheca decem imperialium exhibentur

	Imp.	Gr.
Essentia dulcis 2 loth	2	-
Essentia amaræ 4 loth	-	16
Essentia anthypochondriacæ 2 loth	-	8
Pilularum polychrestarum $1\frac{1}{2}$ loth	I	-
Pilularum contra obstructio- nes $\frac{1}{2}$ loth	-	4
Pilularum purgantium 3 drachma	-	9
Pulveris bezoardici 4 loth	-	16
Pulveris antispasmodici 4 loth	-	16
Pulveris contra acridinem 3 loth	-	9
Pulveris vitalis 24 doses	I	-
Balsami cephalici I drachma	-	6
Libri <i>Unterricht</i> compactum exemplar	-	20
Cistula, vt supra	I	16

10 Imperiales.

§. XII.

§. XII.

In *apotheca duodecim imperialium* Apotheca
la pro duodecim im-
perialibus.
includuntur

	Imp.	Gr.
Essentiæ dulcis 3 loth	3	-
Essentiæ amaræ 4 loth	-	16
Essentiæ anthypochondriacæ 4 loth	-	16
Pilularum polychrestarum $1\frac{1}{2}$ loth	I	-
Pilularum contra obstructio- nes $2\frac{1}{2}$ drachma	-	5
Pilularum purgantium 3 drachma	-	9
Pulveris bezoardici 4 loth	-	16
Pulveris antispasmodici 4 loth	-	16
Pulveris contra acredinem 4 loth	-	12
Pulveris vitalis 36 doses	I	12
Balsami cephalici I drachma	-	6
Tractatus compactus	-	20
Cistula vt supra	I	16

12 Imperiales.

§. XIII.

§. XIII.

Apotheca
la pro sede-
cim impe-
rialibus.

In apotheca sedecim imperialium
inueniuntur

	Imp.	Gr.
Essentia dulcis 4 loth	4	-
Essentia amaræ 6 loth	I	-
Essentia anthypochondriacæ 4 loth	-	16
Pilularum polychrestarum $2\frac{1}{2}$ loth	I	16
Pilularum contra obstructio- nes 3 drachma	-	6
Pilularum purgantium I loth	-	12
Pulueris bezoardici 6 loth	I	-
Pulueris antispasmodici 6 loth	I	-
Pulueris contra acredinem 6 loth	-	18
Pulueris vitalis 48 doses	2	-
Balsami cephalici $\frac{1}{2}$ loth	-	12
Libri <i>Unterricht</i> exemplar compactum	-	20
Cistula, vt supra	I	20

16 Imperiales.

§. XIII.

§. XIII.

In apotheca viginti imperialium
porriguntur

Apotheca
pro vi-
ginti impe-
rialibus.

	Imp.	Gr.
Essentiæ dulcis 5 loth	5	-
Essentiæ amaræ 8 loth	I	8
Essentiæ anthypochondriacæ 6 loth	I	-
Pilularum polychrestarum 3 loth	2	-
Pilularum contra obstructio- nes 1 loth	-	8
Pilularum purgantium 1 loth	-	12
Pulveris bezoardici 8 loth	I	8
Pulveris antispasmodici 8 loth	I	8
Pulveris contra acridinem 8 loth	I	-
Pulveris vitalis 72 doses	3	-
Balsami cephalici $\frac{1}{2}$ loth	-	12
Liber compactus <i>Unterricht</i>	-	20
Cistula	I	20

20 Imperiales

b

§. XV.

§. XV.

Apotheca
la pro tri-
ginta im-
perialibus.

In *apotheca trīginta imperialium*
mittuntur

	Imp.	Gr
Essentiæ dulcis 8 loth	8	-
Essentiæ amaræ 12 loth	2	-
Essentiæ anthypochondriacæ 8 loth	1	8
Pilularum polychrestarum 6 loth	4	-
Pilularum contra obstructio- nes 2 loth	-	16
Pilularum purgantium 2 loth	1	-
Pulueris bezoardici 12 loth	2	-
Pulueris antispasmodici 12 loth	2	-
Pulueris contra acridinem 10 loth	1	6
Pulueris vitalis 96 doses	4	-
Balsami cephalici 1½ loth	1	3
Liber compactus	-	20
Cistula, vt supra	1	20

30 Imperiales.

§. XVI.

§. XVI.

Tali modo pretia *apothecularum* Observatio specialis de diuersa apothecularum instructione. pro ratione et copia medicamento-
rum semper augentur. In quibus adornandis illud cum primis agitur, ut illa medicamenta, quorum vsus in pluribus morbis requiritur, in maiori copia dentur, quam reliqua, quæ non ita frequentis vsus sunt; aut quæ non toties continuanda, ut puluis vitalis, cuius ordinarie vna tantum dosis, aut duæ per diem sumuntur; aut quæ dosibus perquam exiguis capiuntur, ut pilulæ contra obstructions, quarum semiuncia plures quam septuaginta doses continet, et sic porro. Liberum tamen unicuique relinquitur, modum harum *apothecularum* pro lubitu præscribere, et, quantum singulorum medicamentorum habere velit, denominare. Addimus etiam pro more consueto tractatum, in lingua germanica editum, cui nomen: Cur tractatus de vsu medicamentorum

apotheculis inferatur.

Höchstnößbige Erkenntnis des Menschen, sonderlich nach dem Leibe und natürlichen Leben, oder ein deutlicher Unterricht von der Gesundheit und deren Erhaltung: auch von den Ursachen, Kennzeichen und Namen der Kranckheiten, und bewährten Mitteln gegen dieselben, damit ein jeder, auch Ungelehrter, bey Ermangelung eines Medici, sonderlich durch elf sichere, hierzu hinlänglich erfundene, und zu einer bequemen Haus-Reis- und Feld - Apothecke selegirte Medicamente, und Gebrauch dieses Tractats, vermöge bisheriger reichen Erfahrung

fabrung, die gewöhnlichen, auch schweren Kranckheiten, sicher und mit gutem Success curiren könne, abgefasset von D. Christian Friedrich Richtern, Medicinæ Practico in Halle. Latine: Notitia hominis secundum corpus potissimum et vitam naturalem considerati; vel: Instructio perspicua de sanitate eiusque conseruatione: De caussis, signis et nominibus morborum, nec non illis oppositis salutaribus medicamentis, ita ut unusquisque, etiam indoctus, deficiente Medico, per undecim tuta, in hunc finem inuenta et ad commodam domesticam, portati-

b 3

tatilem et castrensem apotheculam instruendam selecta medicamenta, usu huius tractatus, omnes morbos ordinarios, graviores etiam, secure et bono cum successu curare possit, edita a D. Christiano Friderico Richter, Medico Halensi.

Idque facimus ea de causa, quia crebram illius lectionem unicuique utilissimam esse diximus. Quodsi quis igitur tali quadam *apotheca*, vel separatim medicamentis supra recensitis, uti constituerit, ille in memorati tractatus indice, quidquid velit, evolvat: sic satis abundeque de omnibus ac singulis docebitur.

Sin autem aliquis tractatu hoc, *apothecula* subiungi solito, iam instructus est, aut non indiget; tum aut pretium eius de summa detrabi, aut pro cuiusque lubitu medicamentorum quantitate compensari potest. Qualis ratio etiam *cistularum* est: ita,

VT

ut nemo ad earum emtionem compellatur, sed medicamenta sola, in fasciculum collecta et chartis emporeticis bene munita volenti transmittantur. Si quis non velit vniuersa, habebit singula, et ex singulis quantumcunque lubuerit.

§. XVII.

Præter hæc medicamenta in promptu sunt et alia quædam bona, nec ubiuis obuia: quæ tamen *apotheculis* his *domesticis*, *portatilibus* et *castrensibus* ut ordinaria medicamenta subiungere ideo dubitauimus, ne numerus illorum, cum eoque sumtus etiam, supra modum accresceret. Nihilominus tamen ea volentibus seorsim dispensari aut transmitti poterunt, qua etiam de causa nobis visum est ea, quæ de illorum effectu et virtutibus adnotare licuit, huic tractatulo paucissimis subnectere.

§. XVIII.

Sunt autem hæc medicamenta Quorum præ-nomina

b 4

recensentur.

præter illa, quæ supra §. V. recensuimus, sequentia:

I. Puluis Niger I dosis ad 8 gr.

II. Puluis Laxans I loth 5 gr.

III. Electuarium antiphthificum, vna libra, continens duodecim vncias medicorum

I imper.

III. Puluis Solaris I dosis I gr.

V. Tinctura Salis i loth 4 gr.

VI. Tinctura Corallina

I loth

4 gr.

VII. Puluis stomachicus

resoluens contra febres; fasciculus duodecim dosium

6 gr.

§. XVIII.

Fidem his medicamentis facit experientia.

Pro defendenda horum medicamentorum bonitate superuacaneum esse ducimus, noua argumenta, testimonia atque exempla producere, postquam illud antehac abunde factum est partim in libro germanico iam memorato, partim in peculiari tractatulo, cui titulus: *Mercknürdige Exempel sonderbarer durch die Es-*
sentiam

*sentiam dulcem von anno 1701 bis 1708
geschebener Curen.* Adpellamus potius
commune testimonium eorum fere
omnium, qui intra hos quadragin-
ta sex annos his medicamentis per
benedictionem caelestem cum emo-
lumento vfi sunt.

§. XX.

Propter multiplicem fraudem in Qua de
caussa me-
dicamenta
obsignen-
tur. his medicamentis huc vsque tenta-
tam et exercitam, ita quidem, vt
diuersi homines, turpi lucro inhian-
tes, prorsus spuria ac falso substituta
pro nostris venditarint; de quibus
tamen varia ac multiplex experien-
tia docuit, quod neque colore, ne-
que sapore, multo minus salutari
operatione, nostris paria fuerint:
faciendum nobis esse putauimus, vt
non apotheculas modo, sed singula
quoque vitra et capsulas sigillo no-
stro obsignaremus ac muniremus,
vt quilibet medicamenta nostra ab
alienis et supposititiis eo melius pos-
set discernere. Enimuero, hoc non
obstante, comperimus et documen-
ta

ta ad manus habemus, fraudatores quosdam impudencia atque audacia fretos non dubitasse sigillum nostrum illicita quadam imitatione effingendum curare, eoque merces suas obsignando multos incautos in errorem induxisse. Factum hoc est, dum alii sigillum illud integrum, tam ratione insignis quam inscriptionis circa marginem: CHRIST. SIGM. CHR. FRID. RICHTER M. DD. repræsentarunt; alii autem fraudem suam astute dissimulaturi nomen quidem suum apposuerunt, insigne tamen retinuerunt. Quo callido agendi modo id saltem adsecuti sunt, ut illi, qui nominis inscriptionem aut non potuerunt legere, aut in ea recte dignoscenda nihil posuerunt operæ, ad simulata ipsorum medicamenta, propter expressum in sigillo *insigne Richterianum*, pro nostris habuerint atque emerint turpiter decepti. Quorum sic deceptorum vicem uti dolemus, ita ut isti fallaciæ, quantum fieri potest, in posterum anteuertamus, Lectores

res beneuolos monemus, omnia
 -medicamenta, quæ a gestatoribus
 et propolis circumforaneis vendun-
 -tur, falsa esse et spuria, si vel ma-
 -xime sigillum nostrum siue ex toto
 siue ex parte præ se ferant. Neque
 enim per eiusmodi conductos homi-
 -nes medicamenta nostra cuiquam ve-
 -nalia offerimus, sed per cursus pu-
 -blicos, vulgo *Postas*, ad illos mitti-
 -mus, qui ea a nobis desiderauerunt.
 Postquam quoque talia medicamen-
 -ta, quæ pro ante memoratis venui-
 -habentur, publicis relationibus, par-
 -tim sub generali *probatorum medica-*
mentorum Halensium adpellatione, par-
 -tim sub suis propriis nominibus infer-
 -ta, iisque alia quædam, quæ quidema
 nobis non dispensantur, adiuncta fue-
 -runt: hunc libellum iam denuo eden-
 -tes indicandum duximus, hæc me-
 -dicamenta nostra numquam per pu-
 -blicas relationes siue nouellas vul-
 -gari, nec per vagabundos gestato-
 -res, vti modo diximus, venalia cir-
 -cumferri, adeoque neminem non
 persuasissimum habere posse, istius-
 modi

modi medicamenta pro nostris, qualia quidem esse dicuntur, nequaquam habenda, neque hoc nomine emenda esse, nisi quis sibi ipsi tribuere velit, si effectus, in hoc tractatulo memoratos, non solum non experiatur, sed contrarios etiam et noxios sentiat. Qui igitur omne fraudationis periculum euitare cupiunt, neque vero norunt, ubi germana nostra medicamenta hic illic extra Halam dispensentur, illi sibi omnium optime consulent, si prima quidem vice ea a nobis ipsis Halam per litteras accierint. Hac enim ratione fiet, ut falsa et spuria sigilla a nostro tanto facilius postea dignoscant. Libenter quoque ipsis indicabimus, ubi memorata genuina medicamenta, vel in ipsis, in quibus habitant, locis, vel in vicina quadam regione ab amicis nostris nancisci possint.

§. XXI.

Ad quem
litteræ ho-
rum medi-

Quod ergo qui facere voluerint,
illi litteras suas Halam, in ducatu
Magde-

Magdeburgico fitam, dirigere poterunt, cum hac inscriptione: camenterum causa dirigenda fiat,

*A Monsieur le Docteur de Madai,
Conseiller de la Cour et Me-
decin de S. A. S. Monsei-
gneur le Prince d' Anhalt
Cæthen*

à Halle en Saxe.

*Auf dem Waysenhause
abzugeben.*

Vnusquisque autem pro eo ac de-
cet rogatur, vt nomen suum et lo-
cum, tam specialem, vbi degit, quam
generalem, in qua prouincia situs
est, expressis ac distinctis, et, quæ
bene legi possint, litteris adscribat,
moneatque simul, per quam viam
mitti sibi velit responsionem, ne hæc
pariter et medicamenta, litteris no-
bis minus recte redditis, in via de-
tineantur, aut ad locum alienum de-
portentur. et qua cum cautione.

(30) PRAEFATIO AD LECTOREM.

§. XXII.

Cæterum summis merito laudibus celebramus benedictionem, a Deo, rerum omnium auctore optimo maximo, his medicamentis inditam atque impertitam, et veneramur gratissima mente permagnam eius bonitatem, tot ægrotis afflictisque, illorum ope et auxilio, in laudem sanctissimi sui nominis præstitam: orantes etiam atque etiam, vt eadem in posterum quoque vsuris fausta ac salutaria esse iubeat.

Hale Magdeburgicæ,
d. XIII Martij
MDCCLII.

DAVID SAMVEL DE MADAL,
Med. Doctor.

CON.



CONSPECTVS.

I. SVCCINCTA RECENSIO

- Cap. I. De Essentia Dulci p. 1-16
Cap. II. De Essentia Amara p. 16-20
Cap. III. De Essentia Anthypochondriaca p. 20-27
Cap. IIII. De Pilulis Polychrestis p. 27-44
Cap. V. De Pilulis Purgantibus p. 45 seq.
Cap. VI. De Pilulis contra obstructiones p. 46-50
Cap. VII. De Puluere Bezoardico p. 50-53
Cap. VIII. De Puluere contra Acredinem p. 54-55
Cap. VIIII. De Puluere Antispasmodico p. 56-62
Cap. X. De Puluere Vitali p. 62-66
Cap. XI. De Balsamo Cephalico-Stomachico-Neruiuo p. 67-70

II. AP.

II. APPENDIX.

- Sect. I. De Pulvere Nigro* p. 72. 73
Sect. II. De Pulvere Laxante p. 74. 78.
Sect. III. De Electuario Anti-
phthifico p. 79. 80.

III. BREVIS NARRA-
TIO

- De Pulvere Solaris* p. 81. 104

III. ADDITAMENTVM
TRIPLEX.

- I. *De Tinctura Salis* p. 106. 110
 II. *De Tinctura Corallina* p. 111. 112
 III. *De Febri Tertiana promte*
et tuto curanda. p. 113 seqq.

SVC.



SUCCINCTA RECENSIO
DE HORVM
MEDICAMEN-
TORVM
VSU ET EFFECTIS.



CAPVT PRIMVM
DE
ESSENTIA DVLCI.



§. I.
ESSENTIA DVLCIS Essentia
dulcis quæ
le fit medi-
camentum.
est medicamentum con-
fortans et roborans,
quod vires vitales valde
auget, naturam excitat, eamque ala-
crem reddit ac vigentem. Cuius rei
intuitu, tamquam *medicina vniuersalis*
in omnibus morbis, sine vlla exceptio-
ne, quam tutissime adhibetur: cum
A in

2 CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI.

in omni genere morborum confortantia vsum suum habeant et sapius abesse nequeant; cum primis ea, quæ nihil damni ad hunc vel illum morbum conferunt, quale quid ab hoc quidem medicamento minime metuendum.

§. II.

Quibus ea commendatur iis, qui ætate sunt prouecti, quique viribus deficiuntur; hos enim frequentior eius vsus multum roborat validosque conseruat. Vtilissimum etiam est medicamentum his, qui grauissimis morbis defuncti, ægre vires recipiunt.

§. III.

Diuersæ eius operationes. Et quoniam naturam admodum firmat atque ad necessarios motus excitat: operatio eius apud quemque ægrotorum tali modo peragitur, qui et naturæ et morbo conuenientissimus est. Itaque in nonnullis per sudorem, aut saliuam, aut vrinam, aut aluum, aut grauedinem, aut efflorescentiam in cute; in aliis per fonticulos, quos habent; in pleisque autem per transpirationem insensibili-

CAP. I. DE ESSENTIA DULCI. 3

sensibilem operatur: atque ita virtutem suam exserit, vt inde ægrotantes nihil sentiant, nisi quod ad meliorem redeant valetudinis statum.

§. III.

Qua ex causa etiam fit, vt retenti sanguinis fluxus, si ad valetudinem faciant, reuocentur: sin autem illorum superfluitas noceat, eadem vten-
di ratione sistantur atque cohibeantur. Quod si medicamenta, in pari casu infra commendanda, in auxilium vocantur, effectus erit eo præsentior celeriorque.

Effectus illius in hæmorrhagiis.

§. V.

Singularem quoque virtutem ostendit hoc medicamentum in pluribus aliis morbis, dum dolores minuit atque tollit, somnum etiam ac requiem sine metu periculi reddit: eaque de re eximia quadam virtute antispasmodica, hoc est, ea, quæ spasmis resistit, donatum esse cernitur.

Leniuntur per hanc Essentiam dolores.

§. VI.

Præterea discutit *Essentia dulcis* mirum in modum congestiones ac stagnationes sanguinis: ideoque in discutendis inflammationibus tam in-
ternis,

Discutiuntur congestiones.

4 CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI.

ternis, quam externis, apprime utilis est. Quo in casu vsus quoque pulueris antispasmodici multum valet.

§. VII.

Adplicatur
vulneri-
bus etc. fa-
nandis.

Cæterum notabilis est illius effectus in vulneribus, in vlcerosis, fistulosis, aliisque huius fortis adfectibus, quos et mundat et sanat.

§. VIII.

Commen-
datur fe-
minis gra-
vidis.

Mirificam autem ac plane singularem potentiam habet in *feminis*, veterum gerentibus, et cum fœtus vehementius se mouet, et cum alia symptomata accedunt: efficit insuper quoque, vt facilius solito sit partus et puerperium tolerabilius ac minus multis incommodis subiectum.

§. VIII.

Parturi-
entibus
etiam.

Similem operationem bonam, quam hoc medicamentum prodit, euidentissime licet videre in ipsis parturientibus, tam in partu, quam etiam post partum. Quare talibus in casibus illud tamquam specificum commendamus, et possumus vere adseuerare, parilem effectum ac virtutem ab nullo alio, quodcumque illud sit, æque facile ac tuto expectari posse.

§. X.

CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI. 5

§. X.

Nobilissimus etiam est *Essentiæ dul-* Prodest fe-
cis effectus, qui ex illius vsu in ipso tibus eden-
foetu animaduertitur: ita quidem, vt dis.
salutari huius beneficio bene forma-
tus, viuax ac vicens infantulus in lu-
cem edi possit. Exempla in promptu
sunt, quæ testantur, *feminas*, infan-
tulos alias mere epilepticos enixas,
postquam *Essentiæ dulcis* vsum tem-
pore graviditatis suæ diligenter fre-
quentarunt, saluos oppido vegetos-
que peperisse.

§. XI.

In primis commendanda illa est in Inferuit
omnibus morbis spasmodicis et con- morbis spa-
vulsivis, aut talibus, in quibus aliquid sticis cu-
spasmatis aut conuulsionis cernitur. randis.
Itaque bonum effectum præstat pri-
mum in epilepsia, et morbo caduco,
quem Germani *das bese Wesen*, *die*
Schwere Noth, item *den Jammer*, adpel-
litare solent: siue hoc malo pueri et
iuvenes, siue adulti et ætate prouecti
adfaciantur, etiam si illud aliquo modo
sit inueteratum.

Deinde eximium præbet in arthriti- In arthriti-
de, et speciatim vaga, nec non in poda- de, cat.

6 CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI.

gra, chiragra, gonagra, malo ischiadico, hemicrania aliisque adfectibus vsus.

In contracturis. Virtutem quoque eius experiuntur, qui contracturis et membrorum rigoribus laborant.

In partu difficili. In partu difficili varius est et insignis eius vsus, dum spurios parturienti dolores compescit, veros autem ac necessarios prouocat: matrem cum foetu inter hos viribus firmat, atque infantuli expulsionem leniter ac sensim promouet. Tum vero locum habere medicamentum hoc non potest, cum partus difficultas oritur vel a magnitudine vel mala situatione foetus: quo in casu facile intelligitur, illum inde neque minui neque inuerti aliterque disponi posse. Nihilo minus tamen foetus æque ac mater hinc robur accipiunt non exiguum, vt labores istos facilius sustinere queant.

In doloribus post partum. In doloribus post partum insigni cum fructu adplicari potest, si quindecim guttæ in vnam dosin pulueris antispasmodici destillentur, idque post duarum horarum spatium repetatur, insuper autem puerperæ, interiectis
semper

CAP. I. DE ESSENTIA DVLCL. 7

semper viginti quatuor horis, fedecim pilulæ polychrestæ porrigrantur.

Denique opitulatur haud parum in retentione secundinarum, si cum usu pilularum polychrestarum coniungatur. In retentione secundinarum.

§. XII.

Cum etiam motus illi, qui in inflammationibus, internis pariter ac externis, sese produnt, proprie loquendo, motus sint spasmodici: in his quoque *Essentia dulcis*, quid valeat, notabiliter ostendit. Ideoque in morbis sequentibus, et qui his similes sunt, vtilissima esse deprehenditur: Medetur inflammationibus.

1. in nephritide, seu renum inflammatione.
2. in erysipelate, seu igne sacro, siue inflammatione cutis.
3. in apostematibus, quæ vel interne vel externe oriuntur.

§. XIII.

Ingens etiam est *Essentiæ dulcis* vtilitas, quam in variis oculorum morbis atque defectibus, a causa quadam interna oriundis, interne adhibita producit. Ad usum externum oculorum alia quædam peculiariter paratur, quæ nomen *Essentiæ dulcis ad oculos* habet. Item morbis oculorum.

§. XIII.

Qualis ef-
fectus in
adfectibus
soporosis.

In morbis soporosis effectus ideo solet esse difficilior atque operosior, quod tum natura multum eneruata est: attamen efficacia huius medicamenti, continuato aliquamdiu usu, in sequentibus morbis est manifesta, saltem promptior, quam vulgarium medicamentorum; in paralyti nempe, apoplexia, vertigine idiopathica, hebetudine auditus, lipothymia, artuumque tremore.

§. XV.

Vfus eius
externus.

Multo quoque cum emolumento externe adhibetur in morbis, in quibus alia externa locum habent, et quidem in doloribus membrorum et articulorum spasticis, in arthritide, contractura, aliisque id genus adfectibus. In quibus is est præstantissimus illius effectus, ut dolores et materiam, in istis partibus retentam, discutiat, et ipsos nodos, ibidem obortos, si vfus medicamenti diligenter iteretur, et partes adfectæ sæpius vngantur, feliciter resoluat. In vulneribus, vlcerebus, fistulosis aliisque circumserpentibus et exedentibus adfectibus, pariter

CAP. I. DE ESSENTIA DULCI. 9

riter vt alia balsama vulneraria solent, infectis partibus adplicatur; si prius omnis immundities, sanationi contraria, deterfa sit ac sublata.

§. XVI.

Externis vsibus inferuit etiam *Essentia*, quæ ad hunc finem paratur, ideoque *Essentia dulcis externa* denominatur. Essentia dulcis externa. Qua quidem partes, in quibus dolor maxime sentitur, vnguntur: id quod quatuor per diem vicibus, mane circa sextam, ante meridiem circa decimam, post meridiem circa quartam, vesperi autem circa nonam iterandum erit.

In doloribus dentium, alias odontalgia, pauca guttulæ in gossypium destillantur, et denti affecto imponuntur: quo post aliquam moram repetito et continuato, dolores mitigantur atque cessant. Sin dolor a dentibus excauatis oritur, nullum hinc expectandum est auxilium constans, nisi prius dentes carioli euellantur. In otalgia seu doloribus aurium sedandis, duæ tresue guttæ huius *Essentia* in aurem, vbi sedes dolorum est, immittuntur, idque, necessitate sic

A 5 postu-

IO CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI.

postulante, post duas horas vel citius iteratur.

§. XVII.

Vfus illius generalis.

In quibus morbis et adfectibus *Essentia dulcis* porro adhiberi queat, non pluribus heic exponemus, referentes nos ad ea, quæ iam supra §. II. sunt memorata. Nimirum nullus est morbus, in quo *Essentia dulcis*, propter eximiam roborandi virtutem, non commode adhibeatur. Quare et in sequentibus, cum de vero ac iusto reliquorum medicaminum vsu exponemus, frequentiore eius mentionem faciemus.

§. XVIII.

Observatio specialis de securo eius vsu.

Sine vlllo autem vel temperamenti, vel ætatis discrimine, adeoque a iunioribus senibusque, ne exceptis quidem infantulis, nuper in lucem editis, a maribus et feminis, omnibus anni temporibus, æstate atque hieme, diebus etiam canicularibus, quibus alias ab vsu medicamentorum abstinetur, omni cum securitate ac fiducia sumi poterit hoc medicamentum.

§. XVIII.

Quo cum vehiculo sumatur?

Ordinarie sumitur cum vino; si tamen dubium de hoc existat vehiculo,

CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI. II

culo, substituere cereuisiam, iusculum, aquam destillatam vel communem, et ipsum quoque lac licebit.

§. XX.

Dosis pro adultis sunt guttæ ordinarie decem, duodecim, vsque ad quindecim, in morbis quidem communibus: in grauioribus autem diuque inueteratis, ad viginti sumi possunt. Infantulis, haud ita pridem natis, duæ; firmioribus tres, sex, vsque ad octo sufficiant.

§. XXI.

Pro temporis ratione, quatuor, ^{Quoties} trium, duarum horarum interiectu, ^{vsus eius} et in casu necessitatis singulis horis ^{iterandus.} semel vel bis, sine formidine noxæ sumetur. Quo magis enim eius vsus frequentatur, eo facilius est effectus; siquidem ea bonitate est hoc medicamentum, vt non facile in modo peccetur; cum omne emolumentum verioris vsus in eo consistat, vt sæpius repetatur et vna dosis alteri manum quasi porrigat. Vbi tamen hoc obseruetur discriminis, vt in frequentiore vsu doses minuantur, exceptis illis casibus, in quibus præsentissimum

mum periculum ob oculos versatur; tum enim doses maiusculæ vsque ad viginti guttas, aliquot vicibus continuis dentur, si vel bis per horæ spatium ægroto sint porrigendæ.

§. XXII.

Quid faciendum, si dolores au-
geantur. Quod si contingat in certis morbis, vt inter vsum huius *Essentiæ* dolores oboriantur, quod nonnunquam in contractura fit; continuandum nihilo minus erit, et nequaquam desistendum. Sin operatio sit vehementior, ac dolor minus tolerabilis: vsum eius ad tempus intermitteri ac deinde rursus iterari potest.

§. XXIII.

Item, si obstructions maneat. Id quoque generatim notandum est, si ægroti alui difficultate vel obstructione laborent, eaque inter huius *Essentiæ* vsum non tollatur: tum aliquod laxans v.g. pilulas contra obstructions, aut polychrestas, aut simile quiddam, rhabarbaram, fennæ folia, aliaque in subsidium adhibenda esse.

§. XXIII.

Porro, si patientes sanguinem mittere. Qui sanguinem mittere siue per venæ incisionem, siue per cucurbitulas, quam scarificationem vulgus adpellat,

lat, consueuerunt, illis vtrumque erit ^{consueue-}
 suo tempore iterandum, si optatum ^{rint.}
 effectum a medicamento expectare
 velint. Idque tanto magis, si alii flu-
 xus sanguinis, vt hæmorrhagia na-
 rium, hæmorrhoides, menses, simi-
 lesque cessare sentiantur:

§. XXV.

Si qui morbi admodum sunt dolo- ^{Admonitio}
 rosi, eaque de re celerio rem medici- ^{de morbis}
 nam postulant: e. g. dolores calculi, ^{dolorosis.}
 suffocationes, passiones hystericæ,
 partus difficilis, dolores post partum,
 retentio secundinarum, obstructio
 sanguinis in puerperis et nimius il-
 lius fluxus, arthriticis, dolores dentium
 et aurium, inflammatio renum, vlce-
 ra, vehementes vomitus et similes ad-
 fectus; decem vel duodecim guttæ,
 per dimidium horæ interuallum, aut
 cum vino, aut cum cereuisia, aut cum
 aqua destillata vel communi, ægrotis
 dentur, idque tamdiu continuetur,
 dum sudor sequatur lenis ac modera-
 tus; aut maior impetus morbi remit-
 tat et dolores paulatim minuantur;
 aut alia quædam mutatio in melius
 animaduertatur. Tum enim satis erit,

Essentia

14 CAP. I. DE ESSENTIA DULCI.

Essentia usum quater vel quinques per diurnum spatium repetere et ad plene recuperatam usque valetudinem continuare.

§. XXVI.

De minus dolorosis.

In morbis, qui nullis cum doloribus sunt coniuncti, non opus est medicationem festinare. Sufficit, si *Essentia dulcis* quatuor vel quinque diei temporibus, vel sex etiam, quod imprimis in adfectibus apoplecticis ac paralyticis, item vertiginosis fiat, mane circa quintam et octavam, ante meridiem circa decimam, post meridiem autem circa tertiam et quintam, et vesperi ante somnum adhibeatur: eaque methodo ad aliquod tempus sine intermissione continuetur, donec ægroto plena valetudo redeat.

§. XXVII.

Vsus in morbis remittentibus.

Quando morbis sua sunt interualla atque paroxyfmi post moras redeunt, uti epilepsia, palpitatio cordis, passiones hystericæ, vomitus cruentus, nimius hæmorrhoidum et mensium fluxus, nec non obstructio eorundem, fere eadem methodus adhibetur, hoc tamen discriminis tenendum est,

vt

CAP. I. DE ESSENTIA DVLCI. 15

vt vsus medicinæ præcipue sub paroxysmi tempus, et cum maxime ægrotus adfligitur, crebrius repetatur.

In morbis, in quibus accessionis Quando tempus accurate præscitur, vsus *Ess.* tempus *sentiæ dulcis* tres vel quatuor horas anticipetur, et deinde, durante paroxysmo, per dimidiata horæ spatia, in dosi decem vel duodecim guttarum tamdiu repetatur, donec fiat remissio. Si vero postea quoque, quam recessit impetus, tres aut quatuor horas frequentetur vsus: auxilium hinc eo est certius, in iis præsertim casibus, in quibus inter paroxysmi tempus, nihil medicamentorum ægrotis adplicari potest; quod in his, qui morbo epileptico corripuntur, haud infrequenter contingit.

Sin autem tempus, quo ea vicissitudo accidit, aut prorsus ignoretur, Quando idem ignoratur. aut dubie tantum præcognoscatur: tum quidem medicamentum exhibetur, quando paroxysmi redivit forte expectatur, aut quo diei tempore accessio fieri solet.

§. XXVIII.

Qui de *Essentia dulci* plura doceri Lector ad- cupit,

16 CAP. II. DE ESSENTIA AMARA.

lium tra-
ctatum re-
mittitur.

cupit, ille adeat, si placet, tractatum nostrum, de *Essentia dulci* separatim scriptum, videatque exempla, quæ collecta sunt memorabilia; item quæ in tractatu *Erkenntnis des Menschen nach dem Leibe und natürlichen Leben, etc. i. e. Cognitionis hominis, secundum corpus et vitam naturalem considerati*, huc pertinentia habentur.



CAPVT SECVNDVM

DE

ESSENTIA AMARA.

§. I.

Essentia
amaræ
constitu-
tio et pro-
prietas.

ESSENTIA AMARA constat ex vegetabilibus amaris, resolventibus, antiscorbuticis, tonicis et balsamicis. Proprium eius est sanguinem purificare, in iis potissimum morbis atque adfectibus, qui a scorbuto proficiscuntur.

§. II.

Illius vsus.

Tribus illa vel quatuor per diem interuallis ab ægrotis accipi potest, iuncto semel atque iterum per hebdomadem pilularum polychrestarum vsu;

vsu: qui tanto magis est necessarius, quanto durior alui forte erit obstructio. Si ad hanc obstructionem præternaturalis etiam accedat calor, vna vel altera dosis pulueris bezoardici, quotidie fumendi, in auxilium veniat.

§. III.

In adfectibus vlcerosis ac madentibus, purulentis, in scabie, fluxu aurium, crusta lactea, (vbi capillos infectos necesse est euellere,) lue venerea, gonorrhœa, fluore albo, et his similibus aliis, hæc *Essentia* bono successu adhibetur: sumto insuper binis per hebdomadem temporibus pulvere laxante.

In adfectibus vlcerosis, etc.

§. IIII.

Opponitur illa etiam, non sine insigni effectu, flatibus, inflationibus, tumoribus ventris: sedatque dolores colicos, vomitus, diarrhœas ac dysenterias, a fellis acredine concitatas. Quamquam et in hoc casu puluis antispasmodicus aut bezoardicus cum primis vtilis est: atque hi tutius quoque adhibentur, si præsertim incommoda, quæ memoramus, a concitato

In flatulentis, etc.

B

fan-

18 CAP. II. DE ESSENTIA AMARA.

fanguinis motu aut adfectibus hypochondriacis ortum nanciscantur.

§. V.

In adfectibus apoplecticis.

Quodsi contingit, vt homines phlegmatici adfectus *apoplecticos* patiantur: *Essentia amara*, cum *Essentia dulci* sapius vsurpata, opem feret optatam. Vbi tamen id maxime erit videndum, ne alius obstruatur.

§. VI.

In stomachicis.

Est hæc *Essentia* medicamentum quoque stomachicum. Medetur enim debilitati et doloribus stomachi; ita quidem, vt omnes cruditates, siue acidas siue nidorosas, in ventriculo contentas, subigat, tollatque vitium malæ concoctionis, et appetitum prostratum corrigat: si nimirum inter prandendum et cœnandum quadraginta vel quinquaginta eius guttæ cum vitro vini aut cereuisiæ sumantur.

§. VII.

In febribus continuis et intermittentibus.

Quos febres continuæ et præcipue catarrhales vrgent, his *Essentia amara* pro alexipharmaco esse poterit. In febribus autem intermittentibus, illo quidem die, qui liber est a paroxysmo,

CAP. II. DE ESSENTIA AMARA. 19

fmo, inter prandium vel cenam; die vero paroxyfmi post impetum fuperatum, prouocandi fudoris gratia accipiatur.

§. VIII.

In grauedine ac tuffi, quæ vel ex materia tenaci ac pituitofa in pectore, vel ab acredine, ex capite deftilante, oritur, pariter locum habere potefl *Effentia amara*: fic tamen, vt interdum vna quoque dofis pulueris contra acredinem adfumatur.

In adfectibus pituitofis.

§. VIII.

Quis gingiuæ vitiis laborat, vt inde vel os fœteat, vel illa fæpius cruentetur: is nonnihil *huius Effentia* in cochlear infundat et mane gingiuam eo lauet, aut melli rofaceo partem admifceat, eoque mundet dentes.

In vitiis gingiuæ.

§. X.

Vfus *Effentia* huius pro ratione morbi aut per quæuis duarum horarum spatia, fi morbi vis id poftulet; aut per longiora interualla, quarta nimirum aut fexta quaque hora, fi leuior fit impetus, reperatur.

Qualis vfus effe debeat.

§. XI.

Adultis 40 guttæ; iunioribus 16

B 2

circi-

Quanta dofis.


20 CAP. II. DE ESSENTIA AMARA.

circiter annorum, 20 aut 30; pueris 15 vel 18; paruulis autem infra tertium annum 7 aut 10 pro dosi sufficient: quæ vel cum lacte, vel cum cereuisia, vel cum vino, vel cum iusculo imbibantur.

§. XII.

Virtus
eius auge-
ri potest.

Si quis virtutem *buius Essentiæ* exaltare atque augere velit, illam cum *Essentia dulci* commisceat et ad semivnciam *amaræ* vnam drachmam *dulcis*, aut duas, si mauult ac res postulat, adiiciat. Quod vbi factum, dosis nihilo minus retineri poterit, quæ ordinarie est præscripta.



CAPVT TERTIVM

DE

ESSENTIA ANTHY-
POCHONDRIACA.

§. I.

Quas par-
tes purget
et aperiat.

HAEC ESSENTIA primum quidem *lieni* purgando atque aperiendo accommoda est: deinde eundem quoque effectum prodicit
in

in aliis corporis partibus internis, quæ aut spiffitudine sanguinis aut mucii tenacitate grauantur; utpote quæ mala *Essentiæ huius* vsu atque efficacia resolui egerique per aluum solent.

§. II.

Atque hæc *Essentia* tum quoque, Commen-
datur etiam
valentibus. cum adhuc recte valemus, et quidem loco *purgantis* cuiusdam, sed multo commodius, quam alia id genus medicamina sumi, eiusque virtute, si quod morbi grassatur contagium, præuerti facile ac feliciter potest.

Quia vero apud sanos tardior solet esse, quam apud ægrotos effectus, eo, quod natura extra morbi statum non tam facile sentit ac percipit: doses illi non nihil augeant et pro Illius dosis. 40 sumant 50 vel 60 guttas *huius Essentiæ*, idque post duarum horarum interualla continuent, donec alui deiectio sequatur. Cui placet pridie ante somnum pilulas polychrestas sumere et postridie mane *Essentia* hac *anthypochondriaca* ad 60 guttas uti, effectum eius celeriozem habebit atque optatiorem.

§. III.

Effectus in
febris
tertianis.

Quæ cau-
tio adhi-
benda.

Optimo pariter successu *hac Essentia* utantur illi, qui febris tertianis aut quartanis laborant: tum enim, præsertim diebus a paroxysmo vacuis, commodum hoc erit pro deiciendis impuritatibus remedium. Franguntur autem facilius citiusque februm vires, si illius usus per dies aliquot liberos continetur. Si minus e re videatur esse, usum *huius Essentia* diutius persequi: tribus deinceps per diem temporibus pulvis bezoardicus submitatur, idemque die paroxysmi redeunte, semel aut bis paroxysmo præmittatur.

Cumque maxima vis caloris fracta est, tum 40 sumantur guttæ de *Essentia amara*, et qui sequitur sudor, intempestiva refrigeratione non impediatur, sed potius leniter promoveatur.

§. IIII.

In pete-
chialibus.

In febris petechialibus aliisque malignis et continuis, in quibus ægros multum diuque exercuerunt alui obstructiones, siue furor ac delirium accesserit, siue lethargus
alia-

aliaque symptomata periculosa: hoc medicamentum sæpius evidentissimum ægrotis auxilium, saltem initium rectioris valetudinis, post breue horarum spatium attulit. Dum enim aluum sine molestia aperuit, morbi vis infracta est subito, simulque discussæ sunt magnæ illæ in capite congestiones. Deicit nempe materiam febris per aluum, et quidem sine vlla periculi formidine, aut concitato sanguinis motu, vnde alias febris plus noxæ quam salutis accederet. Quæ etiam res est, cur nullus heic facile locus aliis purgantibus ad hunc finem concedi queat: nisi ægrotantem præsentissimo vitæ periculo exponere velis; dum vel conuulsiones vel alia grauia symptomata plerumque consequuntur.

§. V.

Hac de causa medicamentum hoc ante aliquot annos, cum passim pestilentia ingrauesceret magna hominum cum strage, optimum et prorsus singularem successum ex diuina quadam benignitate habuit: vnde et apud quosdam nomen *Essentiæ An-*

In pesti-
lentiæ.

B 4

tipesti-

ripestilentialis seu, vt puriore, quamvis græco, vocabulo vtamur, antilemiacæ fortitum est. Quando autem talis modi febres non incipiunt ab alui obstructione, vsum quoque in iis hæc *Essentia* habebit nullum. Hoc enim casu consultius est, eadem aduersus memoratas febres methodo procedere, quæ infra, cum ad vsum pulueris bezoardici deueniemus, commendabitur. Si ægroti tussi affliguntur, aut a variolis et morbillis impetuntur: tum pariter hoc medicamentum cessabit; etiamsi morbus cum alui obstructione incipiat.

§. VI.

Vfus illius in malo hypochondriaco. Præcipuus eius vsus est in malo hypochondriaco et melancholia hypochondriaca, in vertigine, cephalalgia seu capitis dolore et passionibus hystericis.

Commendatur etiam in palpitatione cordis, flatulentia, ab ebullitione sanguinis eiusque libero impedito motu oriunda: nec minus in fluxu mensium, aut retento, aut imminuto, aut obstructo; item in obstructione hæmorrhoidum, adfectibusque

busque omnibus inde dependentibus. In quibus *hæc Essentia* duobus aut tribus per hebdomada diebus sumi potest, si cæteris modo diebus illud diligenter curetur, ne alius de-
 Quid ca-
 ven-
 dum.
 tingat, adeoque necessitas vrgeat, ad pilulas contra obstructions confugium esse potest.

§. VII.

In adfectibus œdematosis, cum In adfecti-
 partes corporis ab aqua intercure bus œde-
 valde intumescunt, vsus *Essentiæ huius* matosis.
 et pilularum polychrestarum alter-
 nari potest: ita quidem, vt quatuor
 vel quinque dies continuos pilulæ
 polychrestæ accipiantur, et deinde
 alios aliquot *Essentia anthypochondria-*
ca interponatur.

§. VIII.

Furiosi ac maniaci aliquanto for-
 tius sunt adgrediendi, iisque vna do-
 si 60 vsque ad 80 guttæ, cum aliquot
 cochlearibus cereuisiæ vel aquæ
 communis porrigendæ, vel vi infun-
 dendæ: idque singulis horis tam diu
 est continuandum, donec iis alius
 cum multa deiectione soluatur. His

B 5

enim

enim non nocebit, si vel 20 sedes per aliquot dies continuos inde habuerint. Quo facto, vsus in aliquot dies intermittatur, ac deinde rursus continuetur. Si nolunt fumere medicamentum, cogendi sunt, vt fumant, vti modo diximus. Tali ratione plures, quod diuinæ tribuendum benignitati, ex hoc miserabili statu sunt liberati et ad bonam valetudinem reducti.

§. VIII.

Quanta
dosis.

Prouectioris qui ætatis sunt, 40 guttas; pueri duodecennes 20 ad 25; nouennes 15; puelli bimuli, trimuli ac quadrimuli 8 aut 10 guttas pro dosi cum vno cochleari aut duobus cereuisiæ vel aquæ communis fumant.

§. X.

Quid in
vsu obser-
uandum.

De ipso vsu hæc probe sunt obseruanda: primum, vt vitrum ante, quam dosis aliqua datur, diligenter moueatur; quia sedimentum deponit in fundum vitri, si aliquamdiu steterit. Deinde, vt vsus medicamenti per duarum horarum intervalla, et quidem eo vsque repetatur, dum ægrotus aluum habeat laxam,
et

et sedes minimum tres aut quatuor. Denique, vt inter vsum frequens sit potus, eoq̄ue medicamenti operatio adiunetur ac promoueatur.

§. XI.

Si satis defedisse videatur ægro-
tus, cesset vsum medicamenti pro eo
quidem die: per sequentes autem di-
es mane tantum et vesperi repetatur,
et alius molliter ducatur, ne ad prio-
rem duritiem subito redeat. Quod
quidem si non sufficiat nonnullis, a
meridie circa quartam medicamen-
tum iterum sumere licebit.

Quid por-
ro obser-
vandum.



CAPVT QVARTVM

DE

PILVLIS POLYCHRE-
STIS.

§. I.

HAE PILVLAE etsi ab
omnibus indiscriminatim sumi
possunt, idque maxima cum utili-
tate, quandoquidem sanguinem, ca-
put et ventriculum depurant, lie-
nem.

vtiles sunt
præcipue
feminis.

nemque aperiunt: tamen præcipue *feminis* optatissimum præstant atque efficacissimum medicamentum.

§. II.

Earum vir-
tutes.

Inseruiunt illæ sanguini depuran-
do a particulis acidis, scorbuticis ac
mucosis: attenuant enim et resol-
vunt mucositatem sanguinis, illam-
que per aluum et urinam exterminant.

Vfus.

Ad hunc finem obtinendum
bis aut ter per hebdomadem ante
somnia nocturnum viginti capian-
tur *Pilulæ polychrestæ*: sequatur reli-
quos dies vsus Essentiæ amaræ inter
prandium et cœnam; et sub somni
tempus detur Puluis antispasmodi-
cus. Moderata corporis motio si
coniungatur, effectus medicamenti
promouetur tanto certius.

§. III.

Commen-
dantur in
morbis
ventriculi.

Roborant hæc *Pilulæ* ventriculum,
ideoque variis adfectibus ex ventri-
culo oriundis, vt sunt cardialgia,
crebrique ructus ac flatus, multo
vtilissime opponuntur. Faciunt et-
iam aduersus dolores capitis, ex ven-
triculo originem habentes. Suma-
tur dosis earum sub noctem ante
somnia,

somnum, et iungatur vsus pulueris
antispasmodici ante prandium et
cœnam.

§. III.

Aduersus vacuos vomendi conatus nimiosque et vehementes vomitus *Pilulæ polychrestæ* ita exhibeantur: In vacuo vomendi conatu et quo modo.
Infundantur 20 pilulæ cum pauxillo cereuisiæ vel aquæ communis cochleari, et soluantur conterendo super cendentibus prunis vel super candela; deinde diuidatur solutio in duas æquales partes, quarum vna statim, altera post dimidium horæ spatium porrigatur. Et licet forte ægrotus medicamentum per vomitum reddat: aliquid tamen ex istis solutis pilulis retinebit, quod conatum vomendi coerceat. Admonendus autem est ægrotus, ne bibat vel nimis frigide vel stomachum magnis haustibus oneret. Si materia, quæ vomitu profertur, multum acredinis habeat: necesse erit ægroto vnam vel alteram dosin pulueris contra acridinem exhibere. Sedato vomitu, nihilo minus vsus *Pilularum* per aliquot insuper vesperas continuabitur.

§. V.

§. V.

Nec non
in flatu-
lentiis.

Magnus etiam est *harum Pilularum* vsus aduersus flatum, singultus, tormina ventris, passiones colicas, distensiones lumborum, dolores dorsi et ossis sacri: vbi itidem puluis antispasmodicus commodissime in auxilium adhibetur.

§. VI.

Admonitio de illarum effectu proprio.

Omniū maxime illud hoc loco est monendum, ne quis *hasce Pilulas* pro purgantibus habeat, aut putet, idem his intendi pilulis, quod aliis purgantibus vulgo intenditur. Hac enim potissimum de causa inuentæ sunt *hæ Pilulæ*, vt earum ope sanguis depuretur, viscera interna roborentur, et motus humorum inordinatus compescatur. Tantum igitur abest, vt ventriculo vel intestinis sint aduersæ; vt potius tunc sint vtilissimæ, cum quis vehementiori quodam purgante vel vomitorio varia sibi incommoda cumulauit: hoc enim casu eueniente, *Pilulæ* per aliquot dies circa tempus vespertinum saluari cum efficacitate resumentur.

§. VII.

§. VII.

Qui *his Pilulis* vel ad depurationem sanguinis vel tamquam purgante ordinario uti volet: ille harum usum quotidie ad octavum usque vel decimum diem repetiturus, quod in votis habet, facilius consequetur et felicius, quam si aliud purgans fortius sumisset.

Quamdiu
vius conti-
nuandus.

Qui aliquanto vehementius aluum concitare intendit: ille vespertino tempore *has* capiat *Pilulas* et postero die quadraginta vel quinquaginta guttas essentiae anthypochondriacæ adsumat: aut, si libet, licet pilularum purgantium usum, postquam *polychrestis* per aliquot dies usus est, interponere, ut mucus, qui passim visceribus adhæsit, eo melius deducatur.

Maxime
in conci-
tanda aluo.

Illud etiam commodi habent *hæc Pilulæ*, quod post illarum usum nullæ alui obstructions sequantur: id quod aliis purgantibus perquam est familiare et usitatum.

§. VIII.

Quod si in febribus continuis, morbillis, variolis, similibusque morbis, aut

In quibus
morbis la-
xantis vi-

cem suffi-
nere pos-
sint.

aut in feminis, vterum ferentibus, e re esse iudicatur, aluum relaxare; illud *harum Pilularum* vsu multo tutius fiet, quam alio quocunque remedio; cum ab *his Pilulis* minime concitetur sanguis, vt augmentum aliquod febris aut maior sanguinis impulsus idcirco timeri debeat.

§. VIII.

Vtiles et-
iam in alui
fluxibus.

In omnibus alui fluxibus, in diarrhoeis, in passione coeliaca, cum cibi semicrudi deiiciuntur, in lienteria, cum plane iidem per aluum redduntur; in dysenteria, cum cruenta excernuntur, quæ adsumta intra corpus fuerant, optimo cum successu *hæ Pilulæ* adhibentur, neque quicquam aduersi a continuato earum vsu est timendum. Qui ab his morbis inuaduntur et vexantur, *Pilulas polychrestas* semel per diem sumant; addantque quotidie vnam vel alteram dosin pulueris contra acredinem, (qui etiam vtiliter cum æquali pondere radicis gentianæ rubræ commisceri potest,) item vnam pulueris bezoardici; sic dolores subinde minuentur, fluxus sanguinis paullatim

tim cohibebitur, vsque dum plane desinat, diarrhoea cesset et ægrotus sanitati restituetur.

§. X.

Præterea medentur *Pilula polychrestæ* et omnis generis tumorum. omni generi œdematum seu tumorum: efficaciter adhibentur in cachexia, hydrope, anasarca, ictero. Dantur illæ talibus ægrotis quotidie circa vesperam: interdium vero semel atque iterum puluis antispasmodicus, vel essentia amara porriguntur. In curando ictero addi potest vsus tincturæ rhabarbaræ, aliquot diei interuallis iterandus.

§. XI.

In primis merentur hæc *Pilula* Speciatim in adfectibus mulieribus. commendari *feminis*: utpote quibus admodum utiles sunt contra quoscunque sui sexus morbos et adfectus; ita quidem, ut alia medicamenta hac in parte cum iisdem vix, immo ne vix quidem, comparari posse verissime dicamus.

§. XII.

Si mensium fluxus in feminis *in vitis moribus*, iusto, quo debet, tempore In vitis mensium. non eueniat, aut sanguis non in iusta
C quan-

quantitate euacuetur; aut, si plane iterum obstruatur, vnde multa gra-
 uia symptomata, passionum hysteri-
 carum nomine, tormina, nausea,
 adpetitus prostratio, vomitus, tussis,
 inflatio lienis, palpitatio cordis, con-
 strictio et angustia pectoris, præcor-
 diorum anxietas, lassitudo pedum,
 dolor capitis, sensus frigoris in capi-
 te, inflammationes, inflationes faciei,
 œdemata manuum pedumque, hy-
 drops, cætera, oriuntur: contra
 omnes hos naturæ errores atque de-
 fectus hæ *Pilulæ polychrestæ* multum
 præualebunt.

Feminæ, fluxum mensium nondum
 expertæ, vsum *harum Pilularum* duo-
 bus ante vel tribus diebus, quam
 nouilunium sequitur, quo potissi-
 mum tempore aduentante, natura
 sanguinem in iuuenibus ad excre-
 tionem impellere solet, auspicentur,
 repetantque eum dies adhuc quin-
 que aut sex continuos: intra quos
 singulos puluis etiam antispasmodi-
 cus iteratis vicibus adsumatur.

Quoniam vero effectus non sem-
 per primo statim tempore, quo me-
 dicatio

dicatio instituitur, respondet: hæc medicandi ratio sub nouilunii redivit iterum iterumque repetenda erit, vsque dum sequatur ordinatus mensium fluxus. Interea vero temporis consultum fuerit, vt illæ aliquando, nempe vna per hebdomadem vel altera vice, essentia anthypochondriaca vtantur: quo alius *barum Pylularum* beneficio aperta satis et laxa feruetur. Alui enim obstructions numquam non illis nocent feminis, quæ mensium vitiis laborant.

§. XIII.

Quando adfuetus mensium fluxus aut imminutus nimium est, aut omnino obstructus: eadem medicandi methodo procedatur. Id autem insuper est notandum, si fluxus eius modi reuocandus sit, atque ad iustam corporisque constitutioni aptam rationem perducendus, hoc negotium eo tempore, aut paucis diebus ante suscipiendum esse, quo illud natura antea suscipere consuevit, vel quo natura illud maxime, vt sanguis euacuetur, moliri ex concurrentibus signis obseruatur.

C 2

Sin

Sin autem de tempore nihil certi constat, id quidem agendum erit, vt ante et sub nouilunium ꝛac plenilunium *Pilulæ polychrestæ* quater vel quinques capiantur: non enim tempore importuno (quod sine discrimine et damno non fieret) concitari debet sanguis.

§. XIII.

Nota specialis de feminis plethoricis.

In feminis plethoricis et abundantia sanguinis laborantibus consultum ducitur, vt iis, instante tempore, quo mentes exspectant, vena in pede secetur.

Sicut autem hæc mala plerumque vitæ sedentariæ et parciori potui debentur; quippe quæ non possunt non sanguinem generare spissiore: ita mulieres adfectæ sedulo admonendæ sunt, vt corpus ratione quadam ipsis minus molesta, e. g. quotidie per quadrantem vel dimidium horæ ligna diffecando cat. laboriose, moderate tamen, moueant, sufficienterque bibant. Maior enim est huius rei necessitas, quam paucissimi opinantur. Quid? quod interdum omnis fere spes auxilii tollitur,

litur, vbi ea, quæ ad motum potumque pertinent, minus studiose obseruantur: quoniam sola medicina id præstare non potest, vt sanguis a spissitudine ista ad tenuitatem reducatur. Vtui his quoque sunt balnea et pediluua, ita tamen instituenta ac moderanda, ne qua sanguinis ebullitio, si forte aqua nimis sit calida, concitetur, vtpote quod illis minime prodesset.

§. XV.

Si quæ nimio mensium laborent fluxu, dum vel nimis copiosus contingit, vel cum frustorum coagulationum excussione coniunctus est, vel iusto diutius durat; ita, vt virium debilitatio et corporis languor sequatur: tum ita suscipiatur medicatio, vt instante sanguinis fluxu aut dies aliquot ante, vna dosis *Pilularum polychrestarum* exhibeatur, et ter aut quater singulis diebus de pulvere antispasmodico; idque ad sextum vsque diem continuerur. Omnibus sanguinis profusionibus, leges naturæ ac modum excedentibus, *Puluis niger* etiam, semel atque ite-

Quo modo iis vtendum in nimio mensium fluxu.

rum sumtus, optatum præstare solet effectum. Præterea monendæ sunt, quæ nimis huiusmodi hæmorrhagiis adfliguntur, vt nonnumquam sanguinem, et quidem sufficienter, ad sex vncias vsque, mittant per venæ in brachio incisionem.

§. XVI.

Nec non
in abortu.

Feminis, quibus foetus, quem gestabant, ante tempus expellitur, vsus *Pilularum* commendatissimus esse debet. Cum enim abortum vnum quam facillime, post iteratam conceptionem, plures consequi soleant: consultissimum est, vt primo statim post abortum die vsus *Pilularum polychrestarum* incipiant et illius per octiduum continuatione vterum bene expurgent, vt ita molarum etiam, aliæque huius generis informes concrecentiæ impediatur. Reperatur *Pilularum* vsus, quoties tempus menstrui fluxus recurrit, vt, si forte quid impuritatis in vtero retentum fuerit, expellatur. Circa tempus, quo antea abortum experta est grauida, præsertim plethorica, venæ sectionem in brachio admittat,
ne

ne sanguinis turgescentiæ inordinatis commotionibus ansam præbeant. In diæta autem sit moderata, et a vehementioribus animi pathematibus sedulo sibi caueat.

Sin autem nihilo minus quædam animaduertat symptomata, unde periculum esse possit: ternis quotidie dosibus pulueris antispasmodici, et frequenti essentiæ dulcis ac pulueris vitalis vsu illud præuertat.

§. XVII.

In ipso partu hoc præstant *Pilulæ* Et in ipso partu. *polychrestæ*, vt dolores vagos spurios-que sedent et dispellant, vtilis vero et ad foetum expellendum necessarios concitent ac promoueant. Vna igitur dosis *harum Pilularum*, in aqua destillata vel communi contrita, vt eo citius operentur, parturienti feminae porrigatur. A pellentibus autem calidis et sanguinem fortiter commouentibus medicamentis, quibus heic vulgo vti solent, parturientes omnes diligenter sunt præmonendæ: siquidem ea, experientia teste, plurimum sæpe damni intulerunt in partu laborantibus.

C 4

§. XVIII.

§. XVIII.

Quem
vsum præ-
beant pu-
erperis
post par-
tum,

Apud puerperas *Pilula polycbrestæ* istud efficiunt, vt nimium sanguinis lochialis fluxum temperent et ad iustam proportionem redigant: Contra promouent eadem necessariam eius excretionem, expellunt leniter secundinas, in vtero retentas; et præstant alios salutarens insuper effectus, tam in doloribus post partum dissipandis, quam in multis aliis symptomatibus, quæ puerperis sæpissime exitialia esse solent, præcauendis atque declinandis. *Puerperis* igitur quam maxime est commendandum, vt illas vel quotidie, dum fluxus sanguinis continuatur, adsument. Quicquid etiam aduersi ipsis contingere potest, siue ab iracundia et pauore, siue a frigore, siue ab aliis causis; id omne *harum Pilularum* virtute sic auertetur, vt nihil postea restet, quod metuant; cum quidem alias facile accidat, vt turgidum inde atque intumescentem vterum retineant.

Quando *puerperæ* anxietatibus et angustiis circa præcordia premuntur,

tur, aut effusiohem lochiorum fluxum experiuntur; aut quando fluxus eorum intempestiue obstruitur; aut sanguis grumofus retinetur, et in concrefcencias membranofas, quæ vterum præcludunt, compingitur; vnde varia, molefta admodum et difficilia, fympptomata oriuntur: per frequentem *harum Pilularum* vsum, a diuino numine fortunandum, morbi cauffa sublata, priftinæ reftituentur fanitati. Concurrente magna sanguinis ebullitione, vna vel altera dofis de puluere antifpafmodico et bezoardico quotidie interponi potest.

§. XVIII.

Quodfi ex certis indiciis alicui feminae constat, fe non verum fœtum, molam gerentibus, fed molam gestare: illa confugiat ad *harum Pilularum* vsum, fumatque quotidie dofim, per octiduum continuando; post mensis autem decurfum illarum vsum denuo repetat et eadem methodo procedat, qua menses per medicamenta reuocari poffe diximus §. XII.

§. XX.

Lactantibus feminis hæc *Pilulæ* con- lactantibus
du.

ducunt ad lactis emendationem: similiter efficiunt, ne ira, terror, tristitia, mœror et alia animi pathemata, quæ *lactantes* perpeffæ sunt, infantibus noceant. In ipsos etiam infantes *Pilularum* effectus redundat, dum inde laxantur, si matres lactantes iisdem usæ fuerint.

§. XXI.

et infantu-
lis.

Quando *infantuli* sex vel duodecim hebdomadam torminibus, alui profusionibus vomitibusque affliguntur: illis vna vel duæ ex his *Pilulis polychrestis* vesperi et mane infundantur, in aliquot guttis aquæ prius dissoluendæ aut conterendæ; aut porrigantur *Pilulæ* ipsis matribus, infantes mammis nutrientibus, quemadmodum iam supra a nobis est monitum.

§. XXII.

Item in
fluore al-
bo,

In *fluore albo* probatissimum illæ sunt remedium: in quo tam diu sunt capiendæ, donec ille sit sublatus. Ne vero redeat, earum usu, semel atque iterum repetendo, præcauebitur. Cum his autem *Pilulis* coniungi poterit essentia amara, aliquoties

ties per diem fumenda. Si malum hoc ortum fuerit ab inquinamentis venereis, dicta remedia non semper omnem medicationem absolvent: quare et pulvis laxans, cum aliis infra laudandis medicamentis, in auxilium vocandus erit.

§. XXIII.

Quando ex obstructione *hæmor-* et hæmor-
rroidum vel ex nimio earum fluxu *rroidum*
varia mala eueniunt: *his Pilulis* ea- vel obstru-
rundem fluxus vel restituendus est ctione vel
vel moderandus, ne siue defectu, *xu.*
siue excessu amplius peccet. His autem semper erit vsus pulueris antispasmodici iungendus.

§. XXIII.

Contra si *hæmorboides* sint *cæcæ*, Cur in cæ-
quæ sanguinem non effundunt, sed cis non ad-
eiusdem circa anum infarctu, tu- hibendæ.
menses et turgentes ingentibus doloribus, aliquando etiam inflammationibus, molestissimæ sunt, harum pilularum non erit vsus: eo quod sanguis concitatus, viis nondum apertis, exitum non inueniat, et frustraneus erumpendi conatus varias molestias inferre soleat. Quo in ca-
su

fu *Tincturam* nostram *Salis* commendamus, de qua sub finem huius libelli breuis narratio subministrabitur.

§. XXV.

nec in vomitu cruento.

In vomitu quoque vel mictu cruento ab illis abstinendum est. In calculo, doloribusque inde oriundis, cautione opus est, ne sæpius repetitæ calculum commoueant. Tuto autem vna alteraque dosis sumi potest, et hoc eo securius, si ægrotantibus duæ præterea vel tres pulueris antispasmodici doses in diem porrigantur, id quod omnem noxam auertet.

§. XXVI.

Dosis.

Dosis pro adultis erunt octodecim vel viginti Pilulæ; pro personis mediæ ætatis duodecim vel quindecim; pro iunioribus autem et septenibus octo; infantulis pauciores sufficient.

Quomodo in formam pulueris porrigenda.

Qui pilulas auersatur, illas vel conterere et in formam pulueris redigere, vel in paucula cereuisia aliove liquore, ad calorem moderatum colliquare poterit et ad vsum suum accommodare.

CAPVT

CAPVT QVINTVM

DE

PILVLIS PURGANTI-
BVS.

§. I.

CVM *Pilulæ polychrestæ*, de quibus modo diximus, leniter tantum aluum ducant; in multis autem casibus vtile sit ac omnino necessarium, fortiori remedio rem agere, quo impuritates, a quibus periculum esse potest, resoluantur atque deiciantur: visum est, in rem ægrotantium fore, si hoc pilularum genus adderetur.

Cur hæc pilulæ sint inuentæ.

Quarum quidem ea est natura ac virtus, vt mucositatem, in ventriculo et intestinis contentam, feliciter dissoluant et per aluum eiiciant, idque sine vllius nausææ aut torminum ventris excitatione: quod alia huius generis medicamenta, quæ corporis purgandi gratia dantur, vt plurimum facere solent.

Quæ sit earum natura et virtus.

§. II.

§. II.


Quando et
quomodo
sumendæ.

Capiantur illæ vespertino vel matutino tempore, et mane bibatur aqua cum Théè vel Coffée cocta, aut cereuisia calida: quo sic faciliori negotio et maiore quoque celeritate opus suum perficiant.

§. III.

Quanta
dosis.

Quodsi homo adultæ ætatis viginti pilulas pro vna dosi sumserit, circiter sex vel septem sequentur sedes: pueris, annum agentibus duodecimum, duodecim et aliquot supra, ad quindecim vsque dentur.



CAPVT SEXTVM

DE

PILVLIS CONTRA OBSTRUCTIONES.

§. I.

Vfus et effectus harum pilularum.

HAE, quæ nominamus, *Pilulae*, vsum habent in his præcipue, qui consueuerunt durioribus ac pertinacibus *alui suppressionibus* vexari, cum illa vix semel post aliquot dierum

rum interuallum, et magna quidem cum difficultate ac molestissimo conatu, exoneratur. Vnde permulta in morbis, valetudinis incommoda, qualia sunt qui ab ob- capitis dolor, vertigo, tinnitus au- structioni- rium, inflammationes oculorum et bus oriun- tuar. vuulæ, flatulentia, tormina, colica, nausea, vomitus, compressiones et anxietates præcordiorum, palpitationes cordis, cardialgiæ, qui dolores sunt circa os ventriculi, ructus ex cruditatibus orti, sorda, pleuritis, pauores dormientium, passiones hysteriæ seu vterinæ, lipothymia, seu animi defectiones, respirandi difficultas, suffocationes, tussis sicca, cætera, enascuntur: Alii vero morbi haud exigua inde quoque capiunt incrementa.

§. II.

Pessimum in talis modi adfuetis Cur aliis *obstructionibus* est, quod aluus in eius. purganti- modi personis sæpissime ne fortissi- bis præ- mis quidem purgantibus soluatur. polleat. Si etiam vel maxime soluta sit: illa mox tamen iterum, et multo quidem durius, quam antea, adstringitur.

tur. Cum autem fieri non possit, aut debeat, ut singulis diebus nouæ purgationes, et præsertim fortiores, adsumantur: hæc *Pilulæ* aluum conferuabunt apertam, et id quidem sine ullo incommodo sanitatis. Hinc sumi possunt quotidie, non facta prius intermissione, quam natura ad officium redierit iusto tempore et modo excernendi, quæ excerni valetudinis ratio iubet. Id quod *his Pilulis* non intenditur tantum, sed re etiam ipsa, continuato harum usu, feliciter obtinetur.

§. III.

Ratio
vtendi.

Possunt igitur hæc *Pilulæ*, si opus fuerit, per quatuordecim dies continuos sumi. Tum vero ad vnum diem cesset usus, fiatque periculum, num sponte aluus suum posthac facere velit officium. Quod si facit, non opus erit ista quotidiana *Pilularum* continuatione: Sin minus, repetatur ad octo vel quatuordecim dies *Pilularum* usus, videaturque deinde, utrum nunc sine isto adminiculo aluus cieatur. Atque hoc eo usque continuetur, oportet, donec natura redacta

duæ. Si validior sit effectus et sedes numerosior: dosis erit imminuenda. Sufficit etiam aliquibus *Pilulæ* vnius tantum pars dimidiata ad naturalem alui apertionem procurandam. Illud enim hoc loco repetendum est, non esse *has Pilulas* eo fine fumendas, vt alius quasi ex instituto purgetur, sed vt in officio contineatur, et contra obstructiones adsuetas ac diuturnas præseruetur.



CAPVT SEPTIMUM,
DE
PVLVERE BEZOAR-
DICO.

§. I.

Huius pul-
veris virtu-
tes.

HIC PVLVIS resistit veneno, promouetque *sudorem*, ita tamen, vt nulla sequatur sanguinis commotio aut vehementior æstus. Neque autem, si quid impuritatis, præsertim biliosæ, in corpore latet, id per *sudorem* tantum, sed per *urinam* quoque expellere solet. Prod-
est

est etiam ventriculo, educitque blandissime per *aluam* cruditates, in eo contentas. Si quis tamen hunc in finem hoc puluere uti velit, ille pilulas polychrestas simul in subsidium adhibeat oportet.

§. II.

In ebullitione sanguinis, præsertim acrioris; in doloribus capitis atque oculorum inde prouenientibus; nec non in inflammationibus vuulæ et tonsillarum, in erysipelis, hæmorrhagiis seu sanguinis fluxionibus nimis, spasms, artuumque doloribus, ternis quotidie vicibus *Puluis* hic *bezoardicus* capiatur. *Pilulæ* etiam *polychrestæ*, tum præsertim, cum aluus concitanda est, commode inter huius pulueris usum adhibentur.

Quæ in ebullitione sanguinis se ostendunt.

§. III.

Corrigit autem hic *Puluis* præcipue acridinem bilis, ideoque maxime prodest *sanguineis*, omnibusque *liis*, qui aut *cholera* aut *plethora* laborant. Quotiescunque igitur sanguis a nimis vel corporis vel animi commotionibus æstuat, sumatur hic *Puluis*, ut ebullitio sanguinis sedetur et

Quibus maxime conducit.

aluis aperiatur: siquidem tales ab ob-
structionibus alui præseruare solet.

§. III.

In febribus continuis quomodo hoc puluere vtendum.

Qui febribus *continuis*, petechialibus, aliisque malignis conflictantur, illis tribus per diem interuallis *Pulis bezoardicus* porrigatur. Si minus autem respondeant sudores, vna insuper atque altera dosis de Essentia amara aut de Essentia dulci adii-cienda erit. Eo tamen tempore hoc fiat, quo æstus paroxysmi maximam partem videtur minutus esse et a pristina acerbatione remisisse: vel quod vtilius pariter ac securius est, misceatur *Pulueri bezoardico* puluis vitalis: vel destillentur in illum 15 aut 20 guttæ Essentiæ dulcis, vt vna fumantur.

§. V.

Quomodo in intermittentibus.

In febribus *intermittentibus*, quæ interualla temporum habent, et vel singulis diebus, vel tertio quoque et quarto die redeunt, consultum fuerit sub tempus frigoris *Puluerem bezoardicum* dosi paululum auctiore dare: tum autem, cum æstus vis ac imperus maxima ex parte remisit, ad sudo-

sudores promouendos, quorum semper in febribus præcipua esse debet cura, essentia amara ægroto porrigatur, et circa instantem noctem *Puluis bezoardicus* iteretur. Diebus paroxysmo liberis, sumat patiens mane pilulas polychrestas aut purgantes, vel essentiam anthypochondriacam; hora autem decima matutina et vespertina *Puluerem bezoardicum*; et inter prandium ac cœnam essentiam amaram.

§. VI.

Vsum quoque hoc medicamentum habet post obortos terrores aliasque vehementes animi commotiones; aut, si quis onera grauia attollendo vel portando corpori vim fecerit, indeque se male habeat; aut, si quis ex alia quacumque causa minus recte valeat, neque tamen dicere possit, quænam corporis pars præcipue laboret, aut quo nomine adfectus ille nuncupandus veniat.

§. VII.

Illis, qui iam adulta sunt ætate, ad 20 Quantum eius pro dosi capiendum. grana hordeacea; pueris duodecenis ad 12; trimulis ad 6 hoc detur medicamentum. D 3 CA.

CAPVT OCTAVVM

DE

PVLVERE CONTRA
ACREDINEM.

§. I.

Proprium
eius absor-
bere acre-
dinem.

HIC PVLVIS, acredini op-
positus, eximium habet vsum
in omni genere morborum, in qui-
bus aliquid acredinis, aciditatis et
æstus animaduertitur. Mouet ille su-
dorem, sed lenissimum plane et valde
moderatum.

§. II.

Opem fert
in febribus
perechiali-
bus.

Qui febribus perechialibus aliis-
que malignis correpti decumbunt,
iis quotidie post quælibet 8 vel 6
horarum interualla detur *hic Pulvis*:
isque vel solus vel vicibus cum pul-
vere bezoardico commutatis.

§. III.

In vario-
lis, mor-
billis.

Similiter inferuit etiam his, qui
variolas, morbillos aut purpuram
patiuntur: vbi magna cura et atten-
tio esse debet, ne qua medicamen-
ta ægrotis porrigantur expellentia,
calida

calida et sanguinem nimium commoventia. Si vero contingat, vt exanthe-
mata ista vel non ita, vti debent, vel
difficulter et nimis tarde, erumpant:
tum laboranti naturæ cum essentia
dulci et puluere vitali succurratur.

§. III.

Multum etiam valet *hic Pulvis* in In ebulli-
præternaturali sanguinis incalescen- tionem fan-
tia eiusque ebullitione, dysenteria, in guinis.
erysipelis, in profusionibus alui, in tor-
minibus, in sôda, in pruritu cutis, dy-
suria et stranguria, in scabie, crusta
lactea, adfectibusque vlcerosis et se-
rum fundentibus.

§. V.


Paruulis et infantibus dabitur, cum Quando
febriculas habent et inquieti sunt; paruulis
item cum tormina patiuntur, aut par- conducat.
tes aliquæ corporis illis crudescunt.

§. VI.

Dosis erit pro adultis ad mûcronem Dosis.
cultri seu 20 granorum pondus; pro
pueris sex annorum et supra, quindecim;
pro inferioris ætatis decem gra-
norum. Quæ quidem dosis, re sic po-
stulante, bis, ter et quater in diem re-
peti poterit.

D 4

CA.



CAPVT NONVM

DE

PVLVERE ANTISPA-
SMODICO.

§. I.

Effectus
huius pul-
vis am-
plissimus.

HIC PVLVIS in pluribus ad-
fectibus insigne præbet com-
modum, vsumque habet latissime
patentem. Aperit enim aluum, ciet
vrinam, resoluit mucum tenacem,
roboratque ventriculum. Exter-
ne quidem non satis contritus ac
tener, sed paullo crassior videtur, de
industria autem sic granosus præ-
paratur, et liquefcit illico in ventri-
culum demissus: vnde hunc ipsum
nullo modo aggrauat, quemadmo-
dum alii eiusmodi pulueres facere
adfolent.

§. II.

In primis
apud san-
guineos.

In primis prodesse deprehenditur
iis, qui ex abundantia sanguinis la-
borant, eiusque commotionibus et
exæstuationibus valde expositi sunt:
siquidem ebullitionem eius sedat,
spu-

spumescentiam tollit, motusque impetuosiore compescit et ad statum naturalem reducit.

§. III.

Hinc eo illi præfertim magno cum In pluri- emolumento vtuntur, qui ex negle- mis adfe- cta, alias consueta, venæ sectione, aut ctibus, qui intermissa cucurbitularum adplica- recensentur. tione; item, qui ab obstructione vel retentione suetorum sanguinis fluxuum, vt sunt hæmorrhagia narium, mensium, lochiorum in puerperis, hæmorrhoidum; varii generis incommoda, inflammationes, erysipelas, raucedinem, pleuriticidem, ophthalmiam, otalgiam, cephalalgiam, odontalgiam, h. e. oculorum, aurium, capitis, dentiumque dolores: item dolores in manibus pedibusque spasticos, cordis palpitationem, respirandi difficultatem, constrictionem pectoris, flatulentias, anxietates præcordiorum, passiones hystericas seu vterinas, tussés, nauséam, vomitus, dolores colicos, malum hypochondriacum, inflationem lienis, cardialgiam, hæmorrhoides cæcas earumque inflammationes experiuntur.

D 5

Nec

Nec minus vtilitatis inde sibi promittent illi, in quibus consueti sanguinis fluxus nimis excedunt, suaque abundantia patientes multum debilitare conspiciuntur.

Ratio et
modus
vtendi.

Quotquot igitur his memoratis similibusque malis adficiuntur, *bunc Pulverem* tribus aut quatuor diei temporibus capiant. Ad præsertandum multum contribuit, si interdum naturæ, quæ sanguinis euacuationem apud tales intendit, aut per scarificationem aut venæ sectionem succurratur, et pars sanguinis emittatur. Cauebunt præterea sedulo, ne alius ipsis sit obstructa. Quando vero vsui huius *Pulveris* illa non ita, uti debet, respondet: tum pro lubitu aut essentia anthypochondriaca, aut pilulis polychrestis, aut pilulis contra obstructiones, aut clystere aperienda alius erit.

§. III.

In hæmo-
ptysi, vo-
mitu et
amictu
eruento.

In hæmoptysi, vomitu et mictu cruento, dentur patientibus quotidie tres vel quatuor *Pulveris huius* doses. Ante omnia autem summa postulat necessitas, ut hæmoptysi et vomiti.

vomitu cruento laborantibus vena in pede fecetur: qui vero sanguinem mingunt, illi in brachio venæ sectionem admittant; quamquam id sine periculo in pede etiam fieri potest.

§. V.

Aduersus dolores calculi, lumborum, coxarum, femorum, item aduersus stranguriam, ardores vrinæ, vel suppressionem eius, plurimum hinc auxilii petetur, tribus vel quatuor eius dosibus quotidie acceptis.

In doloribus calculi, lumborum, cat.

§. VI.

Quando ante prandium vel cœnam sumitur, confert ad faciliorem ciborum concoctionem, præseruatque a flatibus ructibusque, ex ventriculo oriundis.

In præuertendis flatibus.

§. VII.

Nec minus felici cum successu *hic Pulvis* adsumitur in arthritide vaga, in podagra, gonagra, in malo ischiadico, in pleuritide spuria, hemicrania, cæterisque huius generis morbis. Cuius in singulas doses si 15 guttæ de essentia dulci instillentur, effectus tanto præstantior erit celeriorque.

In affectibus spasticis et convulsivis.

§. VIII.

§. VIII.

In variis
animi pa-
thematis.

Si quis ira vehementer est com-
motus, vel terrore percussus, adsu-
mat statim vnam *buius Pulveris* dosim,
eamque vel solam vel cum essentia
dulci per quæuis duarum horarum
spatia aliquoties repetat. Consultum
quoque fuerit, tali tempore a cibi
potusque sumptione abstinere.

§. VIII.

In æstua-
tione fan-
guinis.

Quibus a fortiori potus genere
sanguis inæstuauit, illius commotio-
nem vehementiorem *buius Pulveris*
beneficio restinguant et ebullitio-
nem compescant. Nec desunt, qui
a legitimo vsu recedentes, præsidium
in eo vel aduersus ipsam ebrietatem,
quamuis præter nostram intentio-
nem, inuenerunt.

§. X.

In eius-
dem con-
gestione.

Qui casu ab alto, ictu aut ponde-
ribus portandis, corpori membris-
que vim intulerunt, hi pro discussio-
ne sanguinis *hoc Puluere* vtantur.

§. XI.

In morbis
mulie-
rum, spe-
cialim
gravidarum,

Feminis, vterum gestantibus, *hic Puluis* iuxta et essentia dulcis, vbi-
que fere, et in omnibus, quæ ipsis
acci-

accidunt, quam maxime opitulatur. Adfert his auxilium, cum hæmorrhagias vteri siue metuunt siue patiuntur; cum doloribus capitis affliguntur; aut ægre et magna cum difficultate spirant; aut ira et pauore vehementius commotæ sunt; aut cum abortum formidant; aut cum vomitu, flatulentia, torminibus ac doloribus lumborum et coxarum cruciantur; aut cum fœtus sese movet præter solitum, aut urinæ excretio retinetur. Parturientibus etiam, et parturientium. quæ a viribus ad partum intensis multum æstuant, semel *hic Pulvis* atque iterum datus, plurimum est profuturus.

§. XII.

Tantum autem eius dabitur adultis, quantum cultri mucrone capi potest, aut quantum viginti grana hordeacea pondere æquabit. Quantum illius sit dandum et quoties. Vfus illius pro rei necessitate ac temporum ratione, bis, ter, quater quotidie iterandus erit; aut interiectis semper duarum horarum spatiis tam diu frequentandus, donec in adfectibus gravioribus vis morbi fracta sit et maximus impetus profligatus. *CAP.*



CAPVT DECIMVM

DE

PVLVERE VITALI.

§. I.

Est medicamentum roborans et securi vsus.

HIC PVLVIS ideo cognominatur *vitalis*, quod eo motus vitales insigniter roborantur, promouentur et in ordine ac iusta proportione conseruantur. Cuius quidem vsus ita securus est omnisque adeo periculi et metus expers, vt ab omnibus sine discrimine sexus et ætatis, ne infantibus quidem exceptis, vtilissime capi queat.

§. II.

Modus operandi per sudorem.

Modus operandi blandissimus est et naturæ admodum conueniens: siquidem vsus eius nullas excitat turbas, et impuritates, quas obuias habet, ordinarie per moderatum sudorem, cum insigni quadam virium corroboratione, e corpore propellit.

§. III.

Illius potentia in febribus acutis.

Reddit *hic Puluis* sanguinem puritati suæ, eiectis hinc inde, quæ nocere

cere valetudini possunt: in primis ^{tis et pete-} autem mundificat lympham. Est vir- ^{chialibus,} tutis *balsamicæ*, refilit veneno et pu- ^{cat.} tredini, quæ corporis structuram corrumpunt vitæque quam maxime aduersantur. Quare summa non minus securitate, quam vtilitate adhibetur in febribus *acutis*, *petechialibus*, aliisque *malignis*, in purpura alba, morbillis, variolis, compluribusque aliis exanthematibus: in quibus medicamentum hoc materiam febrilem et malignam, quæ in corpore grassatur, non modo corrigit, sed eam simul etiam secernit atque excernit. Idem et exacerbata, quæ concurrunt, symptomata sedat, eorumque diminuit immo infringit nocentissimum effectum. Confortat quoque naturam, cuius motus multum adiuuat atque ita moderatur, vt febris, accedente diuini Numinis auxilio, et accurata regiminis præscripti obseruatione, feliciter decurrat et salutari-ter finiatur. Quam ob rem necesse est, vt ab initio febris vsque ad finem eius, vsus *huius Pulueris* diligentissime continuetur.

§. III.

§. III.

In proflu-
viis ven-
tris.

Optimum etiam et notabilem effectum producit, quando alui profusionibus, in primis diarrhœæ et dysenteriaë opponitur. Non adstringit aluum: roborat tamen ventriculi et intestinorum tonum. Mitigat etiam grauiore, qui ægrotos cruciant, dolores, promouetque impuratum, quæ intestina rodunt, moderatam deiectionem.

§. V.

Inque plu-
ribus aliis
morbis,
qui recen-
sentur.

Efficit autem *hic Puluis*, vt sanguis per vniuersum corpus æqualiter distribuatur, et *congestiones*, si quæ obuiæ sunt, *dissipentur*, quæque ex his sanguinis congestionibus ortum trahunt, nimiaë hæmorrhagiæ, præsentissima ope compescantur. Salutaris etiam medicina est illis, qui scorbuto, gonorrhœa seu feminis fluxione, item fluore albo, lue venerea, apostematibus, putidisque ac fistulosis vlceribus laborant: aduersus quos quidem corporis adfectus tanta pollet virtute, vt primum facile inter quæcumque alia medicamenta obtineat.

§. VI.

§. VI.

Phtifici quoque et tabescentes hic inueniunt, quod non vbiuis obuium est. *Huius enim Pulueris* continuato vsu, pristinam recipiunt sanitatem, si modo per naturam vltus auxilio locus sit relictus. In resoluendis *tumoribus* sanguisque stasibus præstantissimus eius est et optatissimus effectus. Porro *hic Pulvis* opponitur adfectibus *arthriticis* morbisque articularibus, idque felici cum successu: ita tamen, vt ægroti ad sudorem vel lenem transpirationem sese sæpius disponere debeant; tum vt tonus fibrarum membrorumque constrictus relaxetur, tum vt particulæ acres et sulphuræ eua-
 porent.

§. VII.

Atque hoc quidem, quod iam monitum est, in reliquis quoque morbis curandis obseruatu necessarium est: quia *hic Pulvis* maxime per sudorem, vrinam et sedes virtutem suam exserit. Hinc necesse est, vt patientes, ad minimum, dum eo vtuntur, quiete et moderate in
 E calo-

Quid
 Phtificis
 arthriticis
 que inde
 promittatur
 auxilii.

Quale re-
 gimen il-
 lius vsus
 requirat.

66 CAP. X. DE PVLVERE VITALI.

calore se contineant: quo sic effectus, quem prædicauimus, tanto facilius consequatur.

§. VIII.

Quo utendum vehiculis, et in qua quantitate. Sumitur autem pro re nata et conditione morbi, cum vino, cereuisia, aqua destillata vel communi, aut cum iusculo, potu aquæ calidæ, cum Thée vel Coffée coctæ. Ætatis qui iam confirmatoris sunt, *buius Pulueris* integra dosis, puerili autem et teneræ ætati dimidiata tantum exhibeatur.

§. VIII.

Quoties illius vsus repetendus. Vfus eius quouis viginti quatuor, aut duodecim, aut octo, aut sex, aut quatuor, aut duarum horarum interuallo, prout morbi ratio postulat, repetatur. Quo enim plus periculi videtur imminere, eo frequentius sumatur medicamentum. Contra ea si moras patiat morbus, nec instans periculum aliud vrgeat, semel in diem et quidem tempore matutino, vel bis etiam, mane ac vesperi capiatur.

CA.



CAPVT VNDECIMVM

DE

BALSAMO CEPHALI-
CO-STOMACHICO-
NERVINO.

§. I.

HIC BALSAMVS habet ^{vsus eius} ^{in morbis}
vsu in adfectibus apoplecti- ^{capitis.}
cis, lipothymiis siue animi defectio-
nibus et vertigine capitis: multum-
que facit ad memoriam confirman-
dam. Vnguntur eo nares, tempo-
ra et vertex.

§. II.

Neque vero minus efficax est in ^{In dolori-}
dissipandis doloribus, quibus caput ^{bus eius-}
vehementer adficitur, si eo modo, ^{dem.}
quem præscripsimus, adhibeatur.

§. III.

In susurro, tinnitu et pulsatione ^{In adfectu-}
aurium, item in vehementiori ea- ^{bus au-}
rum dolore, aliquantum *buius Bal-* ^{rium.}
sami, ad magnitudinem pisi, cum
gossypio immittatur in aurem, vbi

E 2 do.

dolor sedet, inibique per aliquot horas retineatur: d quod, si semel atque iterum sit factum, effectu non frustrabitur.

§. III.

In doloribus dentium.

Si qua particula eius in dentem carie laborantem et multis doloribus adfectum adplicatur, sequitur plerumque mitigatio dolorum ac leuamen.

§. V.

In impotentia partium et contractura.

Si quæ corporis partes adfectæ sunt apoplexia vel paralyfi, ita ut sensum ac potentiam motus amiserint; aut si contracturam passæ sunt ex quacunque causa: illæ diligenter hoc vngantur *Balsamo* et ad calorem probe perfricentur. Effectus testabitur, illas non exiguum hinc robur et firmitudinem accepisse.

§. VI.

In malis stomachicis, colicæ, cat.

Quibus stomachus valde intumuit, aut dolet; item qui passione colica, flatibus torminibusque ventris vexantur: illi stomachum et abdomen hoc vngant *Balsamo*, ut incommodis istis liberentur.

§. VII.

§. VII.

Bono etiam cum successu *hic Balsamus* adhibetur tam ab adultis quam a paruulis, si in sedandis ventris profusionibus, vel vomitu reprimendo, venter eo vngatur, ac deinde linteolum, spiritui vini calefacto vel vino adusto vel aquæ apoplecticæ immersum, iteratis temporibus calidum imponatur.

In profu-
viis ven-
tris, dysen-
teria, cat.

§. VIII.

Optato itidem cum effectu *hoc Balsamo* vtentur feminæ, vterum gestantes vel ex partu laborantes. Dissipat enim dolores ac flatus, quibus affliguntur, moderatur vehementiorem fœtus motum, obsistit doloribus vagis, et vbique vt balsamus pro infantibus vtilissime applicatur.

Inferuit
valitudini
femina-
rum gra-
vidarum.

§. VIII.

Si qua partium contiguitas vel incisione, vel ictu, vel punctione, vel vstione, sit soluta; item, si quod membrum frigore sit læsum: tum applicetur mox *hic Balsamus* recenti vulnere aut membro læso. Sic patiens virtutem leniendi, discutiendi, sanandi, qua pollet, notabili cum

Adplica-
tur etiam
vulneribus.

70 CAP. XI. DE BALSAMO CEPHALICO.

effectu experietur. Quod si *hic Balsamus*, cum vitello ouorum permixtus, vulneri applicetur: magis etiam et promptius respondebit effectus.

§. X.

Loco vnguenti ad labia applicatur. Porro vicem sustinebit *hic Balsamus* vnguenti ad labia: quo casu illa, si ab aeris asperitate et siccitate sint dirupta, eo vngentur ac sanabuntur.

§. XI.

Vfus eius internus in profluuiis ventris. Vbi ad sistenda ventris profluuia, dysenteriam, vomitum, passionem colicam, flatulentiam, hisque similia mala, in promptu non sunt alia idonea medicamenta, ibi eorum defectum idem *hic Balsamus* supplere, dictisque incommodis non sine effectu opponi poterit. Sumatur igitur ad magnitudinem pisi maioris in cochleari iusculi calidi.

§. XII.


Præseruatiuum esse potest iter facientibus. Quibus iter faciendum, hi tantum eius, quantum modo est dictum, matutino tempore, priusquam egrediuntur, in linguam excipiant, et in ore solutum paulatim intra corpus demittant: sic ab omni aeris asperitate et cæli nebulosi inclementia atque insalubritate saluam integramque præstabunt valetudinem. AP.



APPENDIX

DE
ALIIS QVIBVSDAM
SALVTARIBVS
MEDICAMENTIS.

SVCCEDVNT iam alia quædam medicamenta, quorum in præfatione facta est mentio. Illa quidem non includuntur ordinariè *apotheculis* nostris, quas ad vsum *domesticum*, *viatorium* et *castrensem* instruimus, vti ea medicamenta, quorum vsus hæctenus et virtutes exposuimus. Quoniam vero eorum bonitas ac præstantia nobis exploratissima est, et plurimis exemplis atque testimoniis confirmata: non possumus, quin promissi memores, eorum quoque rationes atque utilitates nunc in medium proferamus. Neque tamen, vt modo dictum est, ea in dictas *apotheculas* inferuntur, nisi vnum vel alterum expresso nomine deposcatur.



SECTIO PRIMA

DE

PVLVERE NIGRO.

§. I.

Hic puluis
prorsus in-
signi vir-
tute præ-
ditus.

HVNC *Puluerem Nigrum*, eo quod multi operis ac laboris est, et non ita magna copia vno labore paratur, huc vsque in casus tantum necessitatis reseruauimus: nempe, quando aut cætera medicamenta respondere noluerunt, aut impetus morbi adeo violentus fuit, vt vitæ metuendum esset periculum. Est enim medicamentum, quod insigniter naturam corroborat ac firmat, vt alia, quæ in vsu sunt, cum hoc comparari non possint. Hinc in omnibus morbis quam securissime adhibetur. Certum est, et re ipsa sapius cognitum, vitam pluribus hoc remedio seruata esse, cum in summo constituti essent discrimine.

§. II.

§. II.

Singularem virtutem ostendit *hic* Resistit im-
Puluis, cum magnis et enormibus moderatis
 hæmorrhagiis seu sanguinis effusio- sanguinis
 nibus vexantur patientes; maxime fluxioni-
 vero, cum nimio mensium et lo- bus.
 chiorum aut hæmorrhoidum fluxu
 laborant: utpote quæ immoderata
 et damnosæ fluxiones hoc remedio
 temperantur et sistuntur. Si vero
 post eius usum profluvia ista apud
feminas non cessant, suspicandum
 est non sine causa, molam subesse
 in utero: qualis tamen mola, me-
 dicamenti huius beneficio, sæpe
 paucis post diebus feliciter excussa
 est. Quo facto et ipse sanguinis flu-
 xus, postquam sublata hoc modo
 causa fuerat, constanter cessauit.

§. III.

Adultis integra dosis, iunioribus Dosis.
 autem et paruulis dimidiata porri-
 gatur. Repetendus vero est usus
 post viginti quatuor horarum inter-
 vallum, si periculum non exigat fre-
 quentiorum. Summa urgente ne-
 cessitate, vel post alteram quamque
 horam denuo dari potest.

E 5

SE.



SECTIO SECVNDA

DE

PVLVERE LAXANTE.

§. I.

Hic pulvis
est laxans
quoddam
lenissi-
mum.

HIC PVLVIS, quem *Laxan-*
tem dicimus, laxat quidem
alium, sed modo quodam lenissi-
mo et sine molestia fumentis: ita,
vt vix operatio eius sensu perci-
piatur. Ordinarie alius per *hunc*
Puluerem bis vel ter soluitur: quan-
do vero multæ sunt in corpore
impuritates, sequuntur sex vel se-
ptem sedes, nulla tamen cum vi-
rium debilitatione coniunctæ. Si
bis per diem sumitur, vna dosis sub
somnia tempus, altera postero ma-
ne: effectus erit paratior. Aperit
autem alium magna cum facilita-
te, et emollit quoque hos, qui nul-
lis aliis purgationibus emolliuntur.
Neque tamen *hic Pulvis* adultis tan-
tum, sed iunioribus quoque, immo
et

et infantibus, non ita pridem in lucem editis, secure dari potest: utpote quos moderate laxat. Quando autem impuritatis vel mucii aliquid in ventriculo est, efficit plerumque vomitum, ne illud cum periculo valetudinis inibi detineatur.

§. II.

Inest præterea huic Pulveri alia quædam, non minus certa, quam eximia virtus, nempe vis enecandi vermiculos atque eiiciendi eos: quæ tum præsertim sese exserit, quando luna decrescente usurpatur. Idcirco, cum dici nequeat, quot et quanti sæpe morbi tam in adultos quam paruulos a vermibus proficiantur: vsus huius medicamenti hac etiam de causa commendari maxime meretur.

§. III.

Nec parum eo proficitur, si adhibeatur in scabie, petigine, crusta lactea, fluxu oculorum auriumque, in externa

Enecat vermiculos eiicitque eos.

Ostendit etiam virtutem suam in scabie

similibus-
que mor-
bis.

terna cutis immunditie: etiam in adfectibus, ichore madentibus atque ulcerosis, si vel maxime sint inueterati, usus eius cognoscitur. In primis bonus est effectus eius, quando scabies vel a frigore vel intempestiuo vnguentorum abusu ad interna recessit, et febris causam præbuit. Quo casu mox detur vna dosis *huius Pulueris*: sic scabies rursus pelletur ad externa et præcauebitur malum, quod internis corporis partibus hac ex re facile infligi poterat.

§. III.

Vtendi ra-
tio ac mo-
dus.

His igitur et similibus malis qui adfliguntur, duas capiant per hebdomadem *huius Pulueris* doses: adhibeantque simul ter in singulos dies essentiam amaram. Si quis præterea vti volet puluere vitali, et post illum semel vel bis moderatum sudorem admittere: ille efficaciam eius sentiet tanto celeriore ac maiorem.

§. V.

§. V.

Vtilissimum pariter est in dissol-
 venda pituita tenaciore et purgan-
 do sanguine a particulis acidis, qui-
 bus inquinatus est, hoc ipsum me-
 dicamentum. In gonorrhœa, fluo-
 re albo, aliisque impuritatibus ve-
 nereis, si semel atque iterum he-
 bdomade sumtum, et cum essentia
 dulcis terna vel quaterna per diem
 sumtione atque acceptione aliquot
 dosium de puluere vitali coniunctum
 fuerit, non minimam præstabit vir-
 tutem.

Dissoluit
 quoque pi-
 tuitam, et
 purgat san-
 guinem.

§. VI.

Illud autem tenendum est, non
 esse *bunc Puluerem* propter Mercu-
 rium dulcem, in eo contentum,
 sapius, quam ad summum bis, ca-
 piendum. Tres igitur vel quatuor
 ad minimum dies intercedant oportet
 ante, quam illius vsus repetatur:
 tum vero, si qua id necessitas
 postulat, sine deliberatione illum
 de-

Quænam
 in eius vsu
 sint cauenda.

denuo sumere licebit. Deinde et hoc sciendum, inter vsum *huius Pulueris* corpus esse fouendum, et nequaquam aeri frigidiusculo committendum.

§. VII.

Dosis. De *hoc Puluere* infantes ad quatuor grana; pueruli trium annorum ad decem; decimum agentes annum et maiores natu ad viginti pro dosi sumere possunt: parum autem interest, siue aqua, siue iusculo, siue cereuisia pro vehiculo vtantur. Adulti autem bono cum successu sub vesperam dosin vnam, et sequenti mane denuo dosin possunt recipere.



SECTIO



SECTIO TERTIA

DE

ELECTVARIO ANTI-
PHTISICO:

§. I.

PROBATISSIMUM re-Electuarii
 medium est *hoc Electuarium* ad huius vir-
 phtifin incipientem: item ad va- tus.
 ria pectoris ac pulmonum vicia.
 Experientia cognitum est atque ob-
 servatum, illud sæpe in eiusmodi
 casibus plus, quam alia medicamen-
 ta, morbis huius generis opposita,
 profuisse; in primis si pulvis vitalis,
 de quo supra actum est, vel pulvis
 solaris, de quo statim agetur, simul
 adhibitus fuerit.

§. II.

Pulmonibus ita prodest, vt illos In pulmo-
 mundet, roboret et sanet. nibus con-
 Prom- spicus.
 vet

vel expectorationem materiæ impuræ, mucosæ et saniosæ, et resistit per virtutem suam balsamicam putredini pulmonum, ne malum latius serpat pulmonesque in totum corrumpat.

§. III.

Dosis. • Tantum autem eius sumatur pro dosi et comedatur, tempore matutino et vespertino, interdum etiam postmeridiano, quantum duobus cultri mucronibus excipi potest, vel duæ drachmæ ponderant: idque continuetur tam diu, donec omne malum profligatum et valetudo in pristinum restituta sit statum.



BREVIS NARRATIO
DE
PVLVERE
QVODAM SOLARI.

Quomodo

Ad depurandum sanguinem et
lympham in adfectibus venereis, in
iëtero nigro, in arthritide, in malis corpo-
ris externis madentibus, in exanthe-
mate aliaque cutis immun-
ditie;

Similiter

In varii generis febribus, acutis vi-
delicet, heëticis et lentis, in periculosis va-
riolis ac morbillis, in internis pariter et ex-
ternis inflammationibus, in hæmorrhagia
sive violento sanguinis
effluxu:

Nec non

Ad aperiendas sanandasque obstru-
ctas et læsas partes internas, in phtisi et
atrophia, in malo hypochondriaco,
multisque aliis morbis
chronicis,

Diuina benedictione secundante,
adhuc adhibitus fuerit.

F

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION

INSTITUTION





§. I.

QVAMQVAM medicamenta,
a nobis huc vsque præparata et
in pharmacopolio Orphano-
trophei, quod in suburbio Glaucha
ad Halam nostram est, dispensata, mul-
tis ægris hominibus, qui ea ad ductum
libri, qui *Cognitio hominis secundum cor-
pus et vitam naturalem considerati* inscri-
bitur, adhibuerunt, per diuinam be-
nedictionem optatum vsum præstite-
runt: ea tamen ipsa non solum identi-
dem corrigere satëgimus, sed operam
etiam dedimus, vt adhuc nonnulla
alia adinueniremus, quorum applica-
tione illis succurrere possemus, qui-
bus supra memorata ad curandos eo-
rum morbos non suffecerint. Cui
nostro proposito quando Deus O. M.
pro sua clementia felicem successum
impertire dignatus est: ægrotantibus,
F 2 qui-

quibus ope nostra vti placuit, diuersa salubria et efficacia remedia suppeditare et in morbis chronicis, Deo bene iuuante, adhuc felicius quam quidem antea opitulari potuimus. Equidem animus nobis non est, ea velut priora illa, libere ac publice dispensanda curare: sed in nostra duntaxat praxi, vt adhuc fieri consueuit, agris consilii et auxilii nostri cupidis adhibere, et amicos quosdam ac medicos illis instruere: Attamen necessitate quadam premimur, aliquam eorum recensionem litteris consignandi illamque typographo excudendam tradendi, vt hoc modo scribendis multis ac longis epistolis, quam ad rem tempus ac otium plerumque deficit, superfedere possimus. Initium facimus ab obseruationibus de virtute, effectu et vsu *Pulueris solaris*: pluribus monitis in aliud tempus et commodam occasionem referuatis.

§. II.

Hic *Puluis solaris* pro medicamento quidem vniuersali non venditur, in
co

eo autem ad medicinam vniuersalem proxime accedit, quod in omnis generis morbis et adfectibus cum insigni effectu adhiberi potest. Operatur *resoluendo, aperiendo, roborando et confortando.*

Fuerunt sæpe, qui ad inueniendum medicamentum vniuersale adiecerunt animum. Neque vero existimandum est, in ea illos fuisse opinione, fore, vt tali medicina omnes ac singuli morbi in omnibus ac singulis ægrotis curentur: id quod esset stulte sibi persuadere, mortalitati obicem vlllo remedio poni, et legem mortis, contra diuinam voluntatem, aboleri aut certe retardari posse. Sine dubio consilium illorum eo tantum spectauit, vt eiusmodi sublimis et efficacis medicinæ compotes fierent, qua in omnis generis morbis et symptomatis idem illud, et quidem melius ac citius, efficeretur, quod alias in quouis morbo per optima quæque et præstantissima remedia vix effici atque obtineri posset. Res fere sese habet, vti cum clauē quadam principali siue generali, qua omnia ædificii alicuius conclauia aperiuntur, propriis eorum et huic negotio aptatis clauibus alias referanda; vbi vero nonnullæ feræ rubigine tanto-

pore correptæ fuerint, vt neque suis ipsarum clauibus nec generali quadam recludi queant. Quæstio interdum facta est, an sperandum sit, quod vna aliqua et sola res eiusmodi operationem vniuersalem sit præstitura? Qui id negant, illi hoc nituntur fundamento, quod, quum morbi et vel sexcenta symptomatum genera ex multis diuersisque causis oriantur, fieri nequaquam possit, vt ea omnia vno eodemque remedio releuentur ac curentur. Quisquis autem rem curatius considerauerit, is omnes morbos inde existere deprehendet, quod vel humores et particulae fluidæ, vel partes solidæ earumue motus in corpore humano non sic, vti ordinarie ac naturaliter esse debebant, comparati sint. Iam vero pro re impossibili haberi non decet, medicinam, quæ massam sanguineam depurat, non æque lympham reliquosque humores depurare, materiam viscidam incidere, particulas acres et acidas ad secretionem et excretionem aptas facere posse: quum constet, multa medicamenta in eundem finem quotidie commendari; vbi modo optandum erat, vt hoc ipsum sæpius cum sperata efficacia fieret. Quidni igitur medicina, quæ talem effectum in humoribus habet, in partibus solidis, ad quas per humores deducitur, eundem præsta-

præstare possit? Quidni impuritates, illis inhærentes, æque incidere, resolvere et abstergere; consequenter partes obstructas referare, læsas autem et vulneratas sanare ac consolidare queat? Quidni etiam motus in debitum ordinem redigantur, si ea, quæ eiusmodi motus extraordinarios excitarunt, sublata fuerint et naturæ tali modo quasi satisfactum sit?

Facile autem conici potest, medicinam vniuersalem haud crassam, acrem, fortiter in corpus agentem ac violentam, sed e contrario valde lenem, penetrantem tamen, et naturæ gratam rem esse: quæ a menstruis et humoribus in corpore facile solui, cum illisque ad omnes illius partes deduci, neque vero in natura sua mutari aut corrumpi possit, adeoque effectum, quoad in corpore aliquid eius superest, præstare, stomachum mole sua non onerare, contra autem multo nobiliorem esse, quam ut quispiam putare debeat, se cruditates, saburram et sordes in primis viis obuias ope illius expurgare posse, quippe quod per vomitoria, laxantia aliaue crassiora remedia virtute attenuandi prædita, aptius fieri potest. An igitur hic *Pulvis solaris* et quatenus cum medicamen-

ro vniuersali comparari possit, id quidem cuiusuis intelligentis hominis experientiae et iudicio relinquatur: quam ad rem obseruationes sequentes plura adminicula suppeditabunt. Vnusquisque certe, qui eo vti volet, mox deprehendet, non esse medicinam, quæ frustra sumatur.

Si quis hunc *Puluerem solarem* cum essentia dulci coniunxerit, ille duo habebit medicamenta, quibus in plerisque periculosis morbis et adfectibus chronicis tuto fidere, optatumque inde effectum, Deo bene vertente, sperare poterit. Qua in re hoc discrimen notandum est, quod essentia dulcis præcipue tonum adficiat, eique speciatim felicem effectum præstet, in omnibus adfectibus, in quibus aliquid spastici intercedit: *hic Pulvis autem solaris humores et partes solidas plus adficiat*; et maximam in illis morbis vim exferit, qui ex mala earum conditione oriuntur.

Quando hæc duo medicamenta commendamus, non eo consilio id facimus, ut cuiuspiam persuadeamus, ut sepositis reliquis medicamentis omnibus, his duobus solum insistas, sed singulares eorum virtutes ideo tantum proponuntur, ut, si cætera non suffecerint, ægri ad hæc

hæc confugere aut ea aliis in subsidium addere possint. Quid? quod consilium potius damus, vt aliorum medicamentorum, quorum de præstantia satis constat, vsus una retineatur, et in bona methodo, quam citatus liber *Cognitio hominis* præscribit, continuetur. Moneamus hoc, ne quis, quum in sequentibus aliorum medicamentorum haud multam mentionem fieri obseruauerit, ea prorsus excludi existimet.

§. III.

Speciatim massam sanguineam, *lympham* et reliquos *humores* attenuat et depurat, ac redinemque per sudorem et vrinam, aut quomodo naturæ facilitimum et commodissimum est, expellit. Hac in parte haud facile medicinam offendas, quæ hanc illius operationem et efficaciam antecellat.

Hinc *fluor albus*, *gonorrhœa virulenta*, *bubones* *aliquæ adfectus venereæ* sine salivatione vel consueta diaphoreticis perfecte curantur; vel si saluatio præmittenda videatur, vbi fortassis contagium venereum ossa inuaserit, reliquæ mali inueterati eo ipso penitus expurgari possunt. Quodsi ægroti potum, ex

salubrium lignorum radicibus, speciatim ex meliore sarsaparilla coctam, adhiberent, res succederet tanto felicius, quamquam illud absolute necessarium non est.

In *scabie, crusta lactea, ulceroso aurium fluxu*, aliisque *circumserpentibus* et *exedentibus adfectibus* bono cum successu adhibetur, tamen interdum externis etiam remediis heic simul opus est.

In omnibus etiam recensitis adfectibus bis vel ter per hebdomadem dosis de recte preparato mercurio dulci, vel de nostro puluere laxante, vtiliter fumi potest.

In *ictero nigro* pilulæ polychrestæ addendæ sunt.

In *adfectibus arthriticis, podagra, gona-gra, chiragra, malo ischiadico, bemicrania* (vehementibus capitis ab altero latere doloribus) similiter cum insigni successu ad eradicandum malum, præsertim si non sit hæreditarium, adhibetur: necesse autem est, quemadmodum facile conici potest, vltimum illius aliquamdiu continuari. Interdum medicamen leniter laxans e.g. essentia anthyphochondriaca, vel bonæ indolis mercurius dulcis dari potest.

Si

Si cui *saluatio* noxæ fraudique fuit, similiter si *saluatio non remittit*, aut si ex vsu rerum mercurialium *saluatio in-tempestiue suborta* fuit, vel si *mercurius in corpore hærens* alia *incommoda parit*: hæc medicina optatum auxilium præstabit.

Si quis ab *aspide* vel alio quodam *venerato animalculo* punctus et hoc ictu in lethalia symptomata prolapsus est, is duas doses confestim alteram post alteram summat, studeatque sudorem elicere: tunc symptomata remittent et homo læsus extra periculum futurus est. In *morfu canis rabidi* non minus efficacem se præbebit externe pariter et interne applicatus.

§. III.

In omnibus *febribus acutis, continuis, malignis, pestilentialibus, inflammatoriis, exanthematicis, petechialibus, purpura alba, cæteris*, medicamentum efficax est et reliqua *alexipharmaca* omnia virtute sua superat.

Si in principio morbi, die statim prima, homini febrili aliqua laboranti singulis quatuor vel sex horis dosis datur sudor-
que

que elicitus patienter toleratur: febris remittit ante, quam solitas vires adaequatur. Si vero ægrotus iam tum per aliquot dies decumbit, valetudo quidem non adeo celeriter reparatur: in ægrotante tamen insigne aliquod symptomatum leuamen obseruabitur, et vis morbi paullatim infringetur.

Variolas et morbillos, purpuram aliaque exanthemata, *sine sanguinis commotione* eicit. Aegrotantes non patiuntur enormes et nimios sudores, vti alias plerumque fieri solet: si vero illis antea adfecti fuerint, paullatim sedantur, et exanthemata per lenem et mediocrem transpirationem apparent, quæ ægrotos non adeo defatigant; immo tanto minus verendum est, ne exanthemata retrocedant, vti in nimiis sudoribus minima quauis occasione metuendum est; quæ res ad curandas febres periculosas non mediocre telum est.

Si ægroti *vehementibus præcordiorum anxietatibus* adfliguntur, siue quod exanthemata non satis visui se sistunt, siue quod rursus euanescent: illis quidem quater vel quinquies per singulas horas dosis porrigatur, vsque dum anxietates illæ sopiantur.

Si

Si *variola confluerint, retrocesserint, pallida ac plana facta et lapsa fuerint, ut aegroti in magnum vitae periculum adducti sint: variolae per crebrum huius medicamenti usum ex pristino deteriore statu emerferunt, atque hic morbus pro indole sua felicem exitum sortitus est. Vel si in nonnullis pallidae et lapsae manserint; etiam sine praevia suppuratione et ulceribus in corpore, aridae factae conciderunt, et aegrotantes paullo post non minus, quam si more solito suppuravissent et deinde sanatae decidissent, pristinam valetudinem recuperarunt.*

In *febris intermittibus* observatum nobis non est, per hunc pulverem multo plus quam per alia salubria et efficacia medicamenta praestitum fuisse: si vero in hominibus ex *male curatis febribus* variae, malignae ac periculosae febres coortae fuerint, hoc pulvere rursus sanari potuerunt.

§. V.

Similiter in febris hecticis et lentis alia medicamenta nota omnia antecellit.

Ne-

Necesse autem est, hanc medicinam aliquamdiu, ad minimum per quatuor hebdomades, continuari: quia harum febrium causa non statim supprimi at tolli potest. Si vero intra tres quatuorve hebdomades nullum conualescentiae initium obseruaretur, de aegrotantis restitutione in integrum non multa spes foret.

§. VI.

Habet hic puluis magnum usum in *obstructionibus viscerum, stasibus et congestionibus sanguinis, in resoluendis tumoribus et discutiendis inflammationibus internis et externis.*

Hinc adhibendus est in *atrophia, in obstructione et obduratione lienis ac hepatis, in asthma seu respirandi difficultate, in contractura siue membrorum rigore: similiter in oedemate siue tumore manuum ac pedum, in inflatione totius corporis (anasarca), in tympanite et hydrope.*

Si *sueti sanguinis fluxus obstruuntur, atque inde variae sanguinis congestiones existunt, nimirum dolores capitis vel dentium, oculi rubicundi, morbosa colla,*
erysi-

erysipelas, vertigo, pectoris angustia, respirandi difficultas, anbelatio, palpitatione cordis, flatulentia, colica, inflatio lienis, cardialgia: sanguis huius pulueris sumptione discutitur, et modo memorata symptomata cessant, imprimis si intentioni naturæ per venæ sectionem simul succurratur.

In admodum *exiguo fluxu mensium*, in eorundem *obstructione*, si non maiorem, certe haud minorem, quam alia medicamenta efficaciam exserit, præsertim si pilulæ polychrestæ vna adplicentur. Ad minimum varia inde suborta symptomata, ante memorata, insigniter remittent.

Idem hoc sentiendum est, si ex *obstructione hæmorrhoidum* varia incommoda nascuntur.

In *malo hypochondriaco* sæpius cum optato effectu adhibitus fuit.

In *inflatione pulmonum, pleuræ, hepatis, renum, diaphragmatis, stomachi, oculorum, aurium*, in *erysipelate*, non minus salutarem effectum habet.

§. VII.

Mala in corpore occulta et vlcera in liene, pulmonibus, hepate et renibus, cæt. sanat.

Hinc singulare remedium contra *pbthifin* est, quam intra quatuor hebdomades ita curauit, vt sanguinea et purulenta excretio sensim desierit, nocturni sudores cessarint, et exsiccata ægrotorum corpora vires resumferint. Quorundam ægrotantium conditio paullo plus temporis requisivit. Nonnullis quidem, quorum in corporibus hic morbus nimium increuit, præsens auxilium ferri non potuit: plurimi tamen in illius vsu infigne leuamentum senserunt.

Ad calculum in renibus et vesica dissolendum non valet quidem, (cuiusmodi medicina adhuc desideratur). Quia autem renes depurat, et collectam in vesica tenacem pituitam resoluit: nouo calculi augmento anteuertere potest.

§. VIII.

Roborat etiam *partium tonum*, necessarios motus promouet, nimios autem in debitum ordinem redigit.

In

In ebullitionibus sanguinis vna cum puluere antispasmodico notabilem effectum præstat.

Quam incertum sit, quamque periculosum, nimios sanguinis fluxus medicamentis adstringentibus et obstruentibus curare velle, illi omnium optime norunt, qui ea in re fecerunt periculum. Hoc puluere sanguinis fluxus superflui omnes, sine vlla propemodum exceptione, in ordinem redigi, et vniuersæ violentæ sanguinis profusiones, sine noxæ formidine, retardari possunt; e. g. nimia excretio sanguinis in mensibus vel hæmorrhoidibus; hæmorrhagiæ in puerperis, hæmorrhagiæ ex pulmonibus, in hæmoptysi, in vomitu cruento, mictu sanguineo, in cruento narium stillicidio. Si magnam periculum obseruatur, ægrotumque animus linquere incipit, tum singulis horis, vel per dimidium horæ interuallum, dosis illi detur, vsque dum fluxus subsistere conspiciatur: alioqui satis est, tres quotidie doses adhibere. Sin autem adfectus ille adeo esset inueteratus, vt omnino cedere recusat: ægrotanti adhuc alio modo succurrendi studium non deforet.

Tonum ventriculi et intestinorum confortat, vomitus et ructus stomachi, qui in consuetudinem degenerarunt, sedat, flatulentias

G

lentias propellit, in *dysenteria* et aliis alui profluuiis, *diarrhæis* etiam *chronicis*, utilis est.

Quando feminae in partu ita sunt defatigatae, vt *dolores* ad excludendum fœtum et eiciendas secundinas non amplius subsequantur, vna vel altera dosis magno illis subsidio esse et naturam ad resumendum laborem excitare potest.

Hunc puluerem menses et hæmorrhoides promouere, iam supra monuimus.

Diuersis mulieribus, certo grauiditatis tempore abortum facere solitis, hic puluis adiuumento fuit, vt postea sanum fœtum iusto tempore ediderint.

In mulieribus, quæ quidem consueto tempore pepererunt, quarum vero *infantes* eiusmodi *vitiis* ac *næuis* semper *infecti* fuerunt, vt paucis post natiuitatem diebus vita defuncti sint, hæc medicina optatum effectum præstitit, vt insequenti tempore infantes ex illis sine eiusmodi vitiis nati sint atque in vita manserint. Sub initium grauiditatis per tres hebdomades data illis fuit.

In *adfectibus paralyticis* magno cum emolumento sumitur: præsertim in principio, vbi morbus adhuc recens est. Quo in casu recte fit, si sub initium medelæ singulis horis aliquoties duplæ doses ægrotis porrigantur, et opera nauetur, vt corpus

pus illius insudare incipiat. Deinceps pro re nata post duarum, trium vel quatuor horarum interuallum vna dosis dari et hoc modo eo vsque res continuari potest, donec homo ægrotus se recolligat. Sæpius obseruatum est, ægros in partibus delumbatis pruritem, ardorem, siue, vt vocant, ignem persensisse.

In *asthmate conuulsivo* ægrotantibus per duarum horarum spatium dosis huius pulueris data auxilio Dei periculum repulit.

In *sudoribus colligatiuis*, corpus maxime emaciantibus, iidem insignem effectum habuit.

In *catarrhis suffocatoriis* post singulas horas dimidias duplex dosis ægrotanti danda fuerit. Si sudor in corpore promoueri posset, medela tanto felicius successura esset.

§. VIII.

Externe mala vulnera depurat inspersus: neque verendum est, ne inflammatio accedat. Nouum fundamentum ponit, vulnera exsiccet et sanationem promouet. Si simul interne adhibeatur, eo melius procedunt omnia.

Hæc obseruatio vsum suum habet, vbi ad homines, qui teneriore sensu sunt, aut

ad partes tenues cum septicis non patet tutus aditus.

In *oculos* inspersus vel inflatus excrescentiam supra illorum pupillam sensim aufert. Saccaro subtiliter contrito admistus vesperi et mane in oculos pennæ caule inflari potest. In admodum graui ophthalmia et tunicarum oculi inflammatione ac doloribus spasticis adhuc alio medicamento salutari ægrotantibus succurri potest.

§. X.

Hæc medicina in *variis infantum affectibus*, præsertim in metuendis catarrhis suffocatoriis, in diarrhœis, in vomitibus, in aluo turgida et adstricta, in petigine, crusta lactea, efflorescentia super cutem, in variolis, in morbillis, in exhauriente ardore, vbi dentes emittunt, cum emolumento adhibetur.

Si infantes ad sumendam medicinam non facile adducuntur, hic puluisculus, potui commode admistus, nec opinantibus potest dari.

§. XI.

Hoc medicamentum totum quidem corpus penetrat, operatio tamen illius maxime sentiri solet in partibus læsis: quod

quod ipsum ægrotanti mirum aut alienum videri non debet, sed vsus illius tanto diligentius continuari.

§. XII.

Per vrinam potissimum operatur eiusque ope impuritates eiicit, quippe quæ tunc copiosius et turbulentius effluit. Per *insensibilem* etiam *transpirationem* operatur, id quod ex efflorescentia et maculis, quæ sæpius sine præiis sudoribus super totius corporis cute apparent, cognoscitur; interdum vero largum sudorem expellit, aliquando diarrhœa, non numquam vnus et alter vomitus subsequitur.

§. XIII.

Qui hoc medicamentum *se præseruandi causâ* adhibere volunt, illi hoc autumnî vel veris tempore commodissime facere eumque in finem per octiduum, vel per duas tresue hebdomades diligenter continuare poterunt.

§. XIII.

Hic puluis semper in doses diuiditur. Aegrotis tres quotidie doses dantur. Si vero periculum in mora sit, post sex, quatuor, tres, duas, vel singulas etiam horas adhiberi potest. In

adfectibus soporosis, vbi natura sensus expers est, et simplices doses haud singularem effectum praestant, dosis duplicanda est, plures vero doses simul iunctas dari, necesse non est, sed sufficere eas tanto crebrius repeti.

§. XV.

Tempore matutino hic puluisculus ope aliquot cochlearium iuscule plenorum commode dari, alias autem cereuisia vel liquor alius hanc in rem adhiberi potest.

§. XVI.

Sæpius adhuc obseruatum est, quod quum salutaris cuiusdam medicinæ virtutes recensitæ fuere, eaque contra vnum et alterum morbum fuit commendata, multi hoc ipsum eo acceperint, quasi eiusmodi medicinæ tanta vis et efficacia attribuat, quæ post aliquot dierum usum sese demonstrare deberet; quando vero hoc, ex illorum quidem opinione, non ita apparuit, quod tum satietate illius capti, illam mox seposuerint. Ex quo agendi modo speratus effectus omnino non oriri potuit. Quum ergo vereamur, ne huic *Pulveri solari* idem fatum accidat, monendum duximus, diligentem

rem

tem eius vsum aliquamdiu, per vnam, duas tresue hebdomades, pro morborum ac symptomatum ratione, continuari oportere, si quis verum effectum inde expectare velit. Etsi enim in multis casibus ægrotus duabus, tribus vel quatuor dosibus statim releuari potest: regula tamen hinc præscribi nequit, quasi hoc semper fieri debeat.

§. XVII.

Facile foret, vel duas exemplorum et testimoniorum centurias de salubribus huius medicinæ effectibus in variis capitalibus morbis heic adnectere: superfluum autem et minus necessarium ducimus, quia *hic Puluis* occasione qualibet de se ipso satis testatur, nec alienis testimoniis indiget. Alias quidem testes in propria causa non multum valent: in medicamentis autem testimonium in propria causa, quod de bono effectu suo perhibent, pro verissimo et optimo habendum est.

§. XVIII.

Quid præterea in huius et reliquorum medicamentorum vfu, ratione diætæ, ab ægrotis necessario obseruari debeat, de eo in libro *Cognitio hominis*

cat. inscripto, Part. II. cap. 13. p. 888. sqq. et in illo de *Essentia dulci* cap. 8. 9. p. 67. sqq. quantum satis est, monuimus, quo lectorem linguæ germanicæ gnarum remittimus. Ante omnia animum suum ad creatorem et vitæ suæ dominum conuertere et id serio agere debet, vt ipsi reconcilietur; præsertim si meminerit, se morbum confusa ac vitiosa vitæ ratione potissimum sibi attraxisse. Deus est, qui vim medicinalem naturæ indidit: Deus est, qui ostendit, quomodo terra, exsecrationi propter peccatum subiecta, quæ in regno etiam minerali sentes et carduos procreat, ab ista infelicitate separanda sit. Deus est, qui sanationem agrotantium secundat et promouet. Huic Deo optimo maximo vnusquisque, qui se conualescere sentit, submississimas gratias agere debet. Huic fidelissimo Deo quilibet post recuperatam valetudinem corpus suum et vitam consecret, et reliquos dies peregrinationis suæ in mundo ita transigat, par est, vt de illis æternum gaudere possit. Id quod omnibus et singulis, nec minus nobis ipsis, toto pectore adprecamur.

AD.

ADDITAMENTVM
TRIPLEX
DE
VSU ET EFFECTV
RESOLVENTIS
TINCTVRAE
SALIS
ET
TINCTVRAE
CORALLINAE,
ITEMQVE
DE
FEBRI TERTIANA
PROMTE ET TVTO
CVRANDA.



ADDITAMENTVM PRIMVM
DE
TINCTVRA SALIS.

HOC MEDICAMENTVM
præstantissimum remedium ab-
sorbens est, et in primis con-
tra aciditatem et sic dictam acredinem
ventriculi pariter ac sanguinis et hinc
oriundos morbos alios valet. Stoma-
chum roborat eiusque concoctionem,
alium conseruat leniter apertam, fan-
guinem depurat et humores reliquos.
Composita est ex ingredientibus leni-
bus balsamicis: quæ quum non per
spiritum vini, sed per menstruum sa-
linum extracta sint, tantum abest, vt
vel minimum æstum excitet, vt potius
in plerisque morbis magno cum emo-
lumento, sine formidine oppositi, ad-
hiberi possit.

In

In doloribus colicis *hæc Tinctura* singularem vsum præstat, siue illi ex indigestis cibis, pituita, aciditate, felle, siue ex contracto frigore orti fuerint; neque minus in diarrhœis, dysenteriis, flatulentis, foda, nausea, vomitu, appetitu prostrato, cardialgia, anxietate, angustia pectoris, palpitatione cordis, retenta vrinæ excretionem et obstructionem alui. In his casibus omnibus ter vel quater quotidie, adhibitis simul pro ratione circumstantiarum pilulis contra obstructionem, adhiberi potest.

In calculo etiam doloribusque inde oriundis prodest, et quamuis eos non prorsus tollat, magnum tamen leuamentum ægrotis adfert, et summam in vitiis vrinæ, stranguria, ischuria et dysuria, similibusque symptomatibus vtiliter sumi potest.

Spissum sanguinem attenuat et consequenter morbos inde oriundos sanat; hinc in malo hypochondriaco et adfectibus vterinis non est, quod cum ipsa comparari possit. Inprimis sexui femineo admodum prodest in retentis et dolorosis mensibus, in fluore albo, in colica anoterica seu superiore, mi-
grana

grana seu hemicrania, in retentis puerperarum post partum lochiis siue expurgamentis, similibusque adfectibus.

Puerperæ magno cum emolumento hanc ipsam adhibent. Vterum enim expurgat, impuritatem viscidam, sentinam, humores in secundinis aliasque molas carneas ex utero eiicit, ex quarum rerum retentione mulieribus varia periculosa symptomata accidunt. Illis etiam prodest, quæ negligenter in puerperio tractatæ turgidum et tumidum uterum retinuerunt.

Si uteri depurgatio post partum inopinato terrore, frigore aliisque causis subito impedita fuerit, ut vehementes dolores colici, uterini, conuulsionesque inde suboriantur: tum post unam vel duas doses fluxus redit et symptomata vniuersa remittunt. Quo in casu *hanc Tincturam* singulis horis dimidiis dari et essentiam dulcem alternatim interponi, nec non pilulas polychrestas, modo supra præscripto, adhiberi oportet, usque dum ægrotæ restituta fuerit.

Eodem modo res se habet cum hæmorrhoidariis, quibus *hæc Tinctura* optime
me

me succedit. Quum enim massam sanguineam attenuet, in illis, qui huic naturæ operationi adsuefacti sunt, hæmorrhoidibus viam leniter aperit, doloresque connexos mitigat: vbi autem propter conditionem temperamenti aliisque de caussis hæmorrhoidum excretio exspectari non potest; sanguinem dissipat et ægrotos molestis moliminibus hæmorrhoidariis liberat.

In malo hypochondriaco, adfectibus vterinis et vitiis mensium vna cum *hac Tinctura* nostra etiam Tinctura Coralina adsumi potest,

Pituitam quoque diluit, atque hinc in catarrhis et tussi vtilis est, maxime in rheumate cerebri, nec non in doloribus capitis ex stomacho oriundis.

Quando in ventriculo multa aciditas aut pituita reperitur, remedia purgantia aluum raro penetrant, quo in casu *hac Tinctura* loco pulueris digestiui bi-duo ante istorum sumtionem adhibenda est, quo factò aciditas reprimitur et pituita attenuatur, vt medicamentum purgans postea sumtum meliori cum successu possit perrumpere.

Lienem quoque et hepar aperit, et
cum

cum aliis eo pertinentibus medicamentis in febris quartana prodest, vti etiam in variis tumoribus bonum effectum præstat, et infantibus in obduratione mesenterii, atrophia, aliisque similibus morbis magno vsui est.

Si quis vinum acidum vel medicatum hausit et postea male se habet, is vna vel duabus dosibus *huius Tincturæ* in pristinum statum sese potest reducere.

Porro in variis infantum morbis utilitatem præstat, quippe qui plerumque ex lacte, aciditate ventriculi, vel bile nutricis existunt.

Dosis *huius Tincturæ* quinquaginta vel sexaginta guttulas continet pro adultis: paruulis infantibus duæ vel quatuor, paullo autem adultioribus decem circiter aut quindecim guttulæ haustu cerevisiæ vel aquæ dantur.

Ter, quater, quinquies vel sexies quotidie *hæc Tinctura* sumi potest: quoties autem sumitur, toties vitrum cerevisia vel aqua plenum exhauriri debet. Vino etiam admista sumi potest: vbi pituitam adhuc magis resoluit, id quod in ventriculo pituitoso notandum est.

ADDI:



ADDITAMENTVM SECVNDVM

DE

TINCTVRA CORALLINA.

HAEC medicina optimo iure nomen vniuersalis Tincturæ contra adfectus vterinos meretur eoque magis, quia nihil ardoris habet, vtpote principiis salinis et blande tonicis consistens.

In passionibus hysteriis, in conuulsionibus vteri, in retentis et obstructis mensibus, in colica superiore, in flatulentis, in partu difficili, in vagis spuris que doloribus, in doloribus post partum, in dolorosis mensibus et fluore albo salutarem effectum prodit; in hoc vltimo symptomate autem pulueres polychrestos simul adhiberi oportet.

Quamuis menses mirifice promoueat, nihil tamen noxæ in abundantia illorum parit; idque inde, quod eos sine sanguinis ebullitione promouet. In hoc autem morbo, non durante fluore, sed extra illum sumenda est, at durante fluore glauci et rubri pulueres per vices sumuntur, omni violenta motione deuitata.


Porro

Porro in chlorosi siue morbo virgineo et ictero albo, in malo hypochondriaco, vertigine, retentis hæmorrhoidibus iisdemque albis, in doloribus intestini re-cti, in ineunte tympanite et hydropse: in hac vltima tamen pulueres stomachum resoluentes addendi sunt, quippe qui lympham per vrinam deducunt.

In spisso et impuro sanguine vsum præstat, in catarrhis, arthritide, calculi doloribus, præsertim in calculo renum, epilepsia tam infantum quam adultorum, in apoplexia et paralyfi, ex frigore quidem oriunda; similiter in passione iliaca, congestionibus sanguinis, adfectibus lienis et pleuritide.

In multis adfectibus, maxime in passionibus hysteriis, malo hypochondriaco, vitiis mensium et hæmorrhoidum cum tinctura salis alternatim sumi potest, adhibitis simul pilulis polychrestis sub alternas vespas: in cæcis hæmorrhoidibus pilulæ cessant.

Dosis pro adultis guttas habet triginta ad quadraginta, pro infantibus parvulis duas vel quatuor, pro paullo adultioribus decem ac quindecim, ter vel quater per diem, pro rerum conditione,
porrigendas. AD:


 ADDITAMENTVM TERTIVM

DE

FEBRI TERTIANA

PROMTE ET TVTO CVRANDA.

QVANDO anno M DCC XXXXVIII de maxime vulgaribus febrium querquerarum siue intermittentium generibus longiorem tractatum lingua germanica in lucem emisimus, in eoque ostendimus, qua bona intentione natura certos vehementiores et extraordinarios motus in sanguine excitet, variasque corporis purificationes per sudorem, vomitum vel diarrhoeam suscipiat: tum simul subiunximus, quomodo iste naturæ labor diiudicari debeat, et quænam causæ materiales ac quodnam periculum in corpore dictis extraordinariis motibus ansam dederint. Præterea demonstrauius, quoad res permisit, quomodo illi motus tam per certa remedia, quam per sapiens regimen et circumspectam diætam dirigendi sint ac gubernandi, ne vel turbentur, vel intempestiue supprimantur, nec in vagam et pertinacem consuetudinem degenerent. Quoniam autem plures amicos velle animaduertimus, in memo-

H

rato

rato tractatu institutionem datam inueniri, quemadmodum tales febres medicamentis, quæ ex officina nostra peregre mittere solemus, curari oporteat, ab extraneis etiam ægrotis identidem consilia requiruntur, quorum ad manus liber iste non peruenit; neque vero per accumulatas occupationes et multiplicatum litterarum commercium monita necessaria omnia ex eodem excerpere, et quemlibet per litteras interrogantem, qua ratione febris querquera tractari debeat, quam vellemus, docere possumus: ideo ad lucrandum tempus et amicis ex nobis suscitantibus adhuc melius commodandum, hanc breuem institutionem typis exprimendam duximus, vt vel vna cum libro de memoratis febribus, vel sine illo, medicamentis nostris addi possit. Iam vero in gratiam lectoris latini latine redditam hoc loco interponere visum est.

Vt autem scopus nobis præpositus tanto tutius ac certius obtineatur, de sola tertiana feбри agere constitutum nobis est, quia cæteræ febres propter diuersas, partim etiam valde occultas, causas suas multo intricatiores esse solent, causæ autem febris tertianæ ita comparatæ sunt,

Vt,

vt, licet sæpius ab se inuicem valde discrepent, in re tamen principali ad vnum idemque redeant, adeoque in ea curanda non facile peccari possit. Monemus igitur, si obseruata et in hominem ipso actu ingressa fuerit febris tertiana (id quod ex indubitatis criteriis et ipsa sensatione facile ad cognoscendum est) monemus, inquam, ante omnia necesse esse:

I.

Abstineri ab omnibus multum alibilibus et pinguibus escis, cuiusmodi sunt omnis generis carnes recentes, pisces, oua et casei: nec minus ab omnis generis cibis, qui tarde concoquuntur, quales sunt infumatae et muria conditae carnes, fumati et sale conditi pisces, anseres, columbae, omnis generis panificia butyro cocta, nec non cibi e farina et lacte confecti: sicut etiam vina, spiritum vini vel frumenti et fortes cereuisias sollicitè vitari oportet.

II.

Eo nitendum est, vt corpus in necessario calore teneatur, nec, vt alias fit, libero exponatur aëri.

III.

Proinde impetus febrilis, qui cum al-

H 2

gore

gore, oscitatione et membrorum distensione aliisque molestis sensationibus se prodit, satius in lecto, quam extra lectum, curatur, vt tolerabilis efficiatur.

III.

Finito iam frigore corpus calorem persentiscere incipit, quem æstus vehementior cum aliqua anxietate, inquietudine et sui coniunctus excipit. Simulac vero æstus post quamdam durationem remittit, corpus madefieri et tandem valde sudare occipit.

V.

Durante sicco æstu æque ac insequuto sudore omnis ventilatio membrorumque nudatio sollicitè fugienda est, ne febris, hoc illius labore interturbato, in acutam degeneret. Sitis numquam frigido sed temperato ac tenui potu restinguenda, nec multum vno haustu bibendum est. Si æstus nimis diu continuet et ægrotanti molestus fiat, tunc ipsi, si adultus sit, decem ac quindecim grana nitri depurati, iuniori autem pro ætatis proportionem pauciora danda fuerint, et æstus mox remittet, ac sudor in insigne ægrotantis leuamentum erumpet. Sunt, qui hunc sudorem per essentiam alexi-
phar-

pharmacam aliasue tincturas bezoardicas eliciunt; nos vero hoc prorsus inconsultum ducimus. Nam præterquam quod æstum cum eoque coniunctam anxietudinem adauget, ægros, vel durante adhuc, vel cessante feбри, in petechialem febrim siue purpuram incidisse, eaque fatis diu laborare oportuisse, obseruauimus.

VI.

Si ad oriente feбри vomitus vel diarrhœa intercedit, tum vbi desierit, ægrotus itidem quiete se gerere, sufficientem corporis calorem conseruare et liberum aërem vitare debet.

VII.

Et quia febricitantes iam tum vniuersos cibos fastidire solent, non est, quod ad sumendum vllum cibum se cogant, verentes scilicet, vt alioqui diutius sustinere possint. Natura enim cibum ad nutriendum corpus haud desiderat ante, quam omne periculum fuerit superatum. Vnde illos, qui dum feбри laborant, cibos adhuc appetunt, et feбри famelica adficiuntur, diuturna febris manet, quæ in confusam et curatu difficilem febrim degenerare solet, si in capiendo cibo se non temperent, nec in tempore ordinariam sanationem admittant.

§. VIII

Si quis igitur laborem febrilem salutaribus quibusdam medicamentis naturæ faciliorem vellet efficere, is recte faceret, si puluerem nostrum stomachicum resoluentem adhiberet, ita quidem, vt adultus, die a febris libero, circa horam septimam ac nonam antemeridianam, singulis vicibus integram dosin cum aqua ex foliis Théé cocta, vel cum aqua communi sumeret, idque hora tertia et quinta pomeridiana, et quando ad nocturnam quietem se confert, repeteret. Junioribus, annos decem vel quindecim natis, dimidia dosis, et adhuc minoribus ætate tertia dosis pars dari, atque ita continuari potest, quoad necesse fuerit. Qui debiliore sunt corpore, et quorum natura per diarrhœam sibi succurrere adnititur, satis habebunt, si hunc puluerem ter, vel ad summum quater, per diem sumserint: quum contra robustiores vsum eius sæpius repetere et sex doses per diem tuto recipere possint; præfertim si natura per vomitum vel diarrhœam adiumento esse recusaret. Quod si ægrotus, sumto hoc puluere, tormina ventris sentiat, (id quod in febribus

haud

DE FEBRI TERTIANA CVRANDA. II9

haud insolitum quid est, et certo modo conducit,) modo duas tresue patellas potionis, e foliis *Thée* vel e fabis *Caffée* paratae, vel, hac deficiente, temperatam et tenuem cereuisiam aut aquam recipiat, sic ista tormina mox cessabunt et alui apertio subsequetur.

VIII.

Quando ergo febris accedit semper lenior, ac tandem prorsus cessat, et edendi adpetitus redit, tum illi, qui ex isto morbo vix conualuit, etiam atque etiam inculcandum est, vt ne nimis prandio indulgeat aut cœnæ, ne de escis nutritoriis iusto plus sumat, ea quidem ratione, vt vires perditas tanto citius recuperet. Inopina enim recidua et multo maior virium prostratio eiusmodi malum regimen et neglectam dietam certissime insequutura esset.

X.

Præterea consultum ducimus, vt, qui febri iam sunt defuncti, ad corroborandum stomachum quotidie ante prandium essentia nostræ amaræ guttas decem ad quadraginta, pro ratione ætatis, imbibant, ad maiorem etiam præcautionem, præsertim si adpetitum augeri sentiant, alternis diebus adhuc vnum de puluere stomachum resolvente, cuius n. 8. mentio facta est, vespere sub somni tempus fumant, idque aliquoties iterent. Generatim autem conducit, vt patientes dies paroxyfmi, licet febris decesserit, nihilo minus ad tempus curate obseruent, non edant multum, nec libero aëri sese nimium exponant, frigusque contrahant.

XI.

Si quam vero pertinaciam febris ægrotus obseruauerit, ita quidem, vt tribus quatuorue paroxysmis ad præscriptam diætam et debitum regimen recte curatis, haud cedere, sed propemodum in consuetudinem abire velle videatur, necesse est, duabus ante accessum eius horis in lectum se conferre et calida potione ex *Thée*, siue viridi siue *Thée bou* vti, singulisque quadrantis horæ interuallis duas illius patellas euacuare, atque eo modo pergere, vsque dum leuis quidam sudor appareat, qui, infra etiam febris, per consuetum alias febris tempus conseruari debet. Omni ex parte obseruatum nobis est, quod, si ægrotantes ante fuerum febris tempus sudorem nacti fuerint, in eoque se conseruarint, febris omnino cessarit. Contra vero certum et exploratum est, quod, quoad aliquid materiæ febrilis restat, talem sudorem ante paroxysmum nullo modo extorqueri liceat. In isto igitur casu memoratorum puluerem vsus continuandus et corpus ad sudorem disponendum est, sic vis febris semper imminuetur et tandem prorsus conquiescet.

XII.

Quæcunque de febris tertiana speciatim heic monuimus, ea de quotidianis quoque et quartanis febribus obseruari poterunt, ita tamen, vt, pro intercurrentium caussarum ratione, medicamenta quoque varientur et disponantur.





INDEX
RERVM PRAECIPVARVM,
QVAE
IN HOC OPVSCVLO
CONTINENTVR.

A.	
<i>Abortus</i> quomodo praecauendus	pag. 38.
	61. 98
<i>Achor</i> vid. <i>Crusta lactea</i> .	
<i>Aciditas</i>	106. 107. 109
<i>Acredo</i> siue <i>Acrimonia</i> sanguinis	28. 54.
	89. 106
<i>Affectus animi</i> subitarii et concitatiores	53. 60
- - apoplectici	67
- - arthritici	65. 90
- - circumserpentes et exedentes	8. 90
- - fistulosi	4. 8. 64
- - oedematosi	25
- - foporosi	8. 22
- - ulcerosi	7
<i>Adpetitus</i> prostratus	18. 34. 107
<i>Aeris</i> asperioris incommoda quomodo praeca- venda	70
H 5	<i>Aestiuatio</i>

INDEX

<i>Aestuatío sanguinis</i>	24. 51. 54. 56. 60
<i>Alui apertió naturalis</i>	50
- - obstruções	12. 17. 27. 31. 51. 58. 74. 107
- - - - -	duriores maximeque pertinaces quomodo tollendæ
	47
- - profusiones nimie	32. 55. 64. 69
- - relaxatio	32. 74
<i>Aluus turgida et adstricta</i>	100
<i>Anasarca</i> i. e. totius corporis aut quarumdam eius partium tumor albus et mollis	33. 94
<i>Angustia pectoris</i>	95. 107
<i>Anbelatio</i>	95
<i>Animi commotiones vehementes</i>	53. 60
- - deliquium	8. 47. 67
- - pathemata feminis grauidis noxia	39
<i>Antidotum contra aeris asperitatem</i>	70
<i>Antiloemiaca essentia</i> , quænam sic dicatur	24
<i>Anxietas præcordiorum</i>	34. 57. 92. 107
<i>Apoplexia</i>	8. 14. 18. 67. 68. 112
<i>Apostemata</i>	7. 64. vid. <i>Ulceræ</i> .
<i>Ardor exhauriens in infantibus, dentes emittentibus</i>	100
<i>Ardor urinæ</i>	59
<i>Appetitus</i> vid. <i>Adpetitus</i> .	
<i>Apsidis ictus</i> , quomodo curandus	91
<i>Arthritis vaga</i>	5. 13. 59. 65. 90. 112
<i>Articularis morbus</i>	6. 8
<i>Artuum dolor spasticus</i>	51. 57. 59
- - tremor	8. 65
<i>Asthma</i>	94. 95
- - convulsivum	99
<i>Atrophia</i>	

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Atrophia</i>	pag. 94. 110
<i>Auditus</i> hebetudo	8
<i>Aurium</i> dolor	47. 67
- - fluxus	17. 90
- - inflatio	95
- - pulsatio, susurrus et tinnitus	9. 67

B.

<i>Balnea</i> quibus vtilia sint	37
<i>Balsamus cephalicus</i> prodest in morbis et doloribus capitis 67. aurium ibid. dentium 68. in impotentia partium et contractura ibid. in passione colica ibid. in profluviis ventris 69. feminis grauidis ibid. adplicatur etiam vulneribus ibid. tamquam vnguentum ad labia 70. praeseruat iter facientes ab aeris asperitate ibid.	
<i>Bilis</i> acredo	50. 51
<i>Bubones</i>	89

C.

<i>Cachexia</i>	33
<i>Calculi</i> dolores	13. 43. 59. 107. 112
- - - in renibus	96 112
- - - vesica	ibid.
<i>Calor</i> praeternaturalis in obstructione alui	17
<i>Canis</i> rabidi morsus	91
<i>Capitis</i> debilitas	67
- - dolor	24. 28. 34. 51. 57. 61. 67. 94. 109
- - frigus	34
<i>Cardialgia</i>	28. 47. 57. 95. 107
<i>Caries</i> dentium	68
<i>Casus</i>	

INDEX

<i>Casus</i> ab alto, ictu aut pondere portando	60
<i>Catarrhus</i>	109. 112
- - suffocatorius	99. 100
<i>Catarrhales</i> febres	18
<i>Cephalalgia</i>	57. vid. <i>Capitis dolor.</i>
<i>Cerebri</i> rheuma	109
<i>Chiragra</i>	6. 57. 59. 90
<i>Chlorosis</i>	112
<i>Cholera</i>	51
<i>Clysteris</i> vsus	49. 58
<i>Celiaca</i> passio	32
<i>Celi</i> nebulosi inclementia	70
<i>Colica</i> passio	17. 30. 47. 57. 68. 70. 95. 107
- - - anoterica seu superior	107. 111
<i>Colla</i> morbosa	94
<i>Commotiones</i> animi corporisque vehementiores	53. 60
<i>Compressiones</i> pectoris	47
<i>Concoctio</i> faciliior	59
- - mala	18
<i>Concreſcentiæ</i> membranofæ in vtero puerperarum	41
<i>Confortantia</i> in morbis neceſſaria	2
<i>Congestiones</i> sanguinis	60. 64. 94. 112
<i>Conſternatio</i>	53. 60
<i>Conſtrictio</i> pectoris	34. 57
<i>Contagioſi</i> morbi	21. 23
<i>Contracturæ</i>	6. 12. 60. 94
<i>Convulſivi</i> adfectus et motus	5
<i>Cordis</i> anxietas	34. 57. 95
- - palpitation	14. 24. 34. 57. 95. 107
<i>Corporis</i>	

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Corporis</i> impuritates externæ	pag. 75
- - - internæ	74
- - - languor	2. 37
<i>Coxarum</i> dolor	59. 61
<i>Cruditates</i> ventriculi	51
<i>Cruentatio</i> excrementorum	32. 57
- - - gingivæ	19
- - - vomitus	43. 58. 59
- - - urinae	43. 57. 58
<i>Crusta lactea</i>	17. 55. 75. 90. 100
<i>Cucurbitularum</i> applicatio	17. 58
- - - neglectio incommoda	57
<i>Cutis</i> immundities	76
- - - inflammatio	51. 55. 57
- - - pruritus	55

D.

<i>Deambulatio</i> in vsu pilularum necessaria	49
<i>Debilitas</i> capitis	67
- - - virium	2. 37
<i>Deliquium</i> animi	8. 47. 67
<i>Delirium</i> in febricitantibus	22
<i>Dentium</i> caries	68
- - - dolores	9. 13. 68
<i>Depuratio</i> sanguinis capitis et ventriculi	27
<i>Diæta</i> moderata in feminis gravidis	39
<i>Diarrhæa</i>	17. 32. 64. 100. 107
<i>Distensio</i> lumborum	30
<i>Dolores</i>	3. 64
- - - artuum spastici	51. 57. 59
- - - aurium	13. 47. 57. 67. 68
- - - calculi	13. 43
	<i>Dolores</i>

INDEX

<i>Dolores</i> capitis	24 28. 34. 57. 61. 67. 94. 107
- - colici	17. 30. 47. 57. 108. vid. <i>Colica</i> .
- - coxarum	59. 61
- - dentium	9. 13. 57. 94
- - dorsi	30
- - femorum	59
- - genuum	6. 57. 59
- - intestini recti	112
- - intestinorum	57. vid. <i>Colica</i> .
- - laterum	47. 57
- - lumborum	6. 59. 61
- - manuum spastici	8. 57. v. <i>Chiragra</i> .
- - oculorum	51. 57
- - circa os facrum	30
- - parturientium	6. vagi et spurii 39. 111
- - post partum	7. 39. 111
- - pedum spastici	57. vid. <i>Podagra</i> .
- - renum	7
- - ventriculi	18. 28. 47. 57
- - ventris	30. 34. 47. 55
<i>Dormientium</i> pauores	47
<i>Dysenteria</i>	17. 32. 47. 55. 64. 69. 70. 98. 107
<i>Dysuria</i>	55. 107

E.

<i>Ebrietas</i>	60
<i>Ebullitio</i> sanguinis	24. 41. 51. 55. 61
<i>Efflorescentia</i> super cutem	100
<i>Embryonis</i> debilitas	5. 6. 61
- - vehementior in utero motus	61
<i>Epilepsia</i>	5. 14. 15. 112
<i>Erysipelas</i>	7. 51. 55. 57. 95
	<i>Essentia</i>

RERVM PRAECIPVARVM.

Essentia amara, illius proprietates et usus 16.
 in adfectibus ulcerosis et madentibus 17. in
 flatulentis ibid. in adfectibus apoplecticis
 et stomachicis 18. in febribus ibid. in ad-
 fectibus pituitosis, et vitis gingivæ 19. de illius
 dosi ibid. quomodo virtus eius augeri possit

20.

Essentia anthypochondriaca, purgat et aperit
 lienem 20. utilis est valentibus 21. prodest
 in febribus tertianis 22. in petechialibus ib.
 in pestilentia 23. hinc vocata *Essentia an-
 tilamiaca* 24. in quibus febribus non ha-
 beat locum 24. usus eius in malo hypochon-
 driaco ibid. in adfectibus œdematosi 25.
 in furiosis ibid. dosis, et quid in usu illius ob-
 servandum 26

Essentia dulcis, medicamentum confortans 1.
 illius operatio 2. effectus in hæmorrhagiis 3.
 usus externus 8. prodest senibus et qui vi-
 ribus deficiuntur 2. lenit dolores 3. discutit
 congestiones ibid. utilis est in vulneribus,
 prodest feminis gravidis 4. et parturienti-
 bus ibid. fœtibus edendis 5. in morbis spa-
 sticis ibid. et 88. et arthritide 5. in contra-
 cturis, in partu difficili et doloribus post par-
 tum 6. in retentione secundinarum 7. in
 inflammationibus et morbis oculorum ibid.
 in adfectibus soporosis 8. doloribus artuum
 ibid. in doloribus dentium 9. usus eius ge-
 neralis 10. quo vehiculo sumatur ibid. do-
 sis, quoties usus iterandus 11. peculiare ob-
 servationes

12. 13 sqq.

Essentia

INDEX

<i>Essentia dulcis extenuata</i>	9.	et ad oculos	7
<i>Exanthemata</i>			55. 63. 92
<i>Excrementa cruentata</i>			32. 57

F.

<i>Faciei inflatio</i>			34
<i>Febres acuta</i>			91
- - catarrhales			18
- - contagiosæ			21
- - continuæ	18. 22. 31. 52.		91
- - exanthematicæ			91
- - hectica			93
- - inflammatoriæ			91
- - intermittentes	14. 18. 52.		93
- - lentæ			93
- - male curatæ			93
- - malignæ	22. 52. 54. 63.		91
- - pestilenciales			91
- - pe echiales	22. 52. 54. 63		
- - purpureæ	54. 63. 91		
- - quartanæ	22. 120		
- - querquera	113	sqq.	
- - quotidiane			52
- - tertianæ			22
- - quomodo prout et tuto curandæ			113
			seqq.
<i>Febrilis materia</i>			63
<i>Feminarum adfectus</i>	33. 36. 60. 61. v.	<i>Mulieres.</i>	
- - - - - iuniorum maxime			34
<i>Feminis lactantibus</i>	quid conducatur		42
- - - - - plethoricis	quid		36
<i>Femorum dolores</i>			59
			<i>Fistu-</i>

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Fistulosi</i> adfectus	pag. 4. 8. 64
<i>Flatulentia</i>	107. III
- - a concitato sanguinis motu orta	17. 24. 57. 95
- - ex ventriculo ortum habens	28. 29.
- - -	59. 68. 97
- - ab alui obstructione	47. 70
- - ab obstructo vel retento sanguinis	
- - fluxu	57
- - in sexu femineo	61
<i>Fluor</i> albus	17. 42. 64. 77. 89. 107. III
<i>Fluxus</i> alui nimius	32. vid. <i>Aluus</i> .
- - aurium	17
- - hæmorrhoidum nimius	14. 43. 58. 73
- - obstructus	24. 34
- - lochiorum excedens	40. 58
- - mensium vitiosus	24. 34. 35
- - sanguinis nimius	3. 51. 58
- - - obstructus, retentus	55. 57
- - feminis	17. 64. 77
<i>Fætor</i> oris	19
<i>Fætus</i> vehementior in vtero motus	4. 61
<i>Fætibus</i> edendis quid proffit	5
<i>Fraudes</i> in medicamentis tentatæ et detectæ	præf. §. XX.
<i>Frigus</i> in capite	34
- - læsa frigore	69. 107
<i>Furor</i>	22. 25
- - vterinus	57

INDEX

G.

<i>Gentianæ</i> radices vsus	pag. 32
<i>Gingiuæ</i> cruentata	19
<i>Gonogra</i>	6. 57. 59. 90
<i>Gonorrhœa</i>	17. 64. 77
- virulenta	89
<i>Grauedo</i>	19
<i>Grauidarum</i> adfectus et symptomata	4. 31. 60. 61. 69

H.

<i>Hæmoptysis</i>	57. 58
<i>Hæmorrhagiæ</i> deficientes	3. 13
- - - - - excedentes	3. 37. 51. 58. 64. 73
- - - - - lochiorum in puerperis	40. 57. 73
- - - - - mensium	57. 73
- - - - - narium	13. 57
- - - - - vteri	13. 57. 61. 73
<i>Hæmorrhoides</i> cæcæ	43. 57. 112
- - - - - nimia	14. 43. 57
- - - - - obstructæ	13. 24. 43. 95. 112
- - - - - illarum inflatio	57
- - - - - lenis apertio	109
<i>Hebetudo</i> auditus	8
<i>Hemierania</i>	6. 59. 90. 107. fin. 108
<i>Hepatis</i> inflatio	25. 109
- - - - - obstructio	94
- - - - - vulnera occulta	96
<i>Hydrops</i>	25. 33. 34. 98. 112
<i>Hypochondriacum</i> malum	24. 57. 95. 107. 109. 112
<i>Hystericæ</i> passiones	13. 47. 57. 111. 112

RERVM PRAECIPVARVM.

I.

Iebore madentes adfectus 75. vid. *Ulcerosi* adfectus.

Icterus pag. 33

- - albus 112

- - niger 90

Ictus venenati animalculi 91

Ignis sacer 7. vid. *Erysipelas*.

Iliaca passio 112

Impuritas biliosa 45

- - corporis 21. 74

- - intestinorum 45. 62. 64

- - lactis materni 42

- - lymphæ 63

- - sanguinis 28. 62. 77

- - venerea 77. vid. *Lues* venerea.

- - ventriculi 45

- - vteri 38. 108

Incalescentia sanguinis 55. 56

Infantium adfectus 42. 55. 69. 100

Inflammationes externæ et internæ 3. 7. 17. 34.

57. 94

- - cutis 7. 57

- - hæmorrhoidum 57

- - oculorum 47. 51. 57. 100

- - renum 13

- - tonsillarum 51

- - vuulæ 47. 51

Inflationes corporis rotius 94

- - diaphragmatis 95

- - faciei 34

- - hepatis 95. 109

- - lienis 34. 57

I 2 *Infla*

INDEX

<i>Inflationes</i> manuum	pag. 25. 33. 34
" " oculorum	95
" " pedum	25. 33. 34
" " pleuræ	95
" " pulmonum	95
" " renum	ibid.
" " stomachi	95
" " ventris	17
<i>Intestini recti</i> dolores	112
<i>Intestinorum</i> dolor colicus	17. 30. 33. 47. 57
" " impuritas mucosa	45
<i>Intumescencia</i>	17. 25
<i>Inualetudo</i> a casu ab alto vel ictu	60
" " ab onerum grauitate	53
" " cuius propria causa ignoratur	ibid.
<i>Ira</i>	40. 60. 61
<i>Irrequies</i> cum dolore	3
<i>Ischiadicum</i> malum	6. 59. 90
<i>Ischuria</i>	107

L.

<i>Labia</i> ab aëris asperitate dirupta	70
<i>Lactantium</i> feminarum adfectus	39. 40. 41. 42
<i>Lactis</i> materni vitiositas et emendatio	42
<i>Læsiones</i> externæ 69. vid. <i>Vulnera</i> .	
<i>Lassitudo</i> pedum	34
<i>Lateralium</i> dolor	47. 57
<i>Lepra</i>	75
<i>Letbargus</i>	8. 22
<i>Lienis</i> adfectus	20. 112
" " inflatio	34. 57. 95
" " obstructio	94. 109
" " ulcera occulta	69
<i>Lienteria</i>	

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Lienteria</i>	pag.	32
<i>Lipothymia</i>	8.	47. 67
<i>Lochiorum</i> fluxus deficiens et retentus	25.	38.
	57.	108
- - nimius	40.	57. 73
<i>Lues</i> venerea	17.	64. 77. 89
<i>Lumborum</i> distensio spastica		30
dolor	6.	59. 61
<i>Lymphæ</i> vitiositas et mundificatio	63.	89
M.		
<i>Malum</i> hypochondriacum	24.	107
- - ischiadicum	6.	59
<i>Mania</i>		25
<i>Manuum</i> dolor spasticus	8.	57
- - œdemata seu tumores		34
- - tremor		8
<i>Materia</i> mucosa et faniosa		80
- - viscida in vtero		108
<i>Medicamenta</i> genuina quomodo a falsis et spuris dignoscenda	præf. §.	XX.
<i>Medicamentum</i> vniuersale an derur		85
- - quomodo comparatum sit		87
<i>Melancholia</i> hypochondriaca		24
<i>Membrorum</i> dolor		6
- - læsio a frigore		69
- - aliisque caussis externis	ibid.	
- - rigor		6
<i>Memoriæ</i> debilitas		67
<i>Mensium</i> fluxus imminutus vel retentus	24.	34.
	35.	95
	I 3	<i>Mensium</i>

<i>Mensum</i> fluxus nimius	pag. 14. 37
obstructus	13. 14. 24. 33. 95. 107. III
ordinatus quomodo procurandus	35
<i>Mercurius</i> dulcis	90. 91
<i>M-senterii</i> obduratio	110
<i>Mictus</i> cruentus	44. 57. 58. 59. 97
<i>Migrana</i> corruptum ex <i>Hemicrania</i> , quod vide.	
<i>Mæror</i> lactantibus feminis noxius	42
<i>Mole</i> uterinæ	38. 41. 73. 108
<i>Morbus</i> caducus	5
<i>Morbi</i> communes et grauiores	II. 66. 72
- dolorosi et minus dolorosi	13. 14
- oculorum	7
- vitæ periculosi	66. 72
- remittentes	14
- soporosi	8
- spastici	ibid.
<i>Morbilli</i>	31. 54. 63. 92. 100
<i>Morsus</i> canis rabidi	91
<i>Motio</i> moderata necessaria et vtilis	36. 49
<i>Mucositas</i> ex capite destillans	19. 77
- intestinorum	31. 45
- in pectore	19. 21. 77
- faniosa	80
- tenax	21. 56
- ventriculi	31. 45. 75
<i>Mulierum</i> morbi seu adfectus	33. 60. 61
- abortantium	38. 61
- grauidarum	4. 31. 60. 61. 69
- lactantium	42
	<i>Mulierum</i>

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Mulierum</i> morbi menstruarum, vid. <i>Men-</i>	
	<i>sum</i> fluxus.
- - -	nondum menses expertarum
	pag. 34. 35
- - -	passiones vterinae
	57

N.

<i>Narium</i> hæmorrhagiæ	13. 57. 97
<i>Nausea</i>	34. 47. 57. 107
<i>Nebulosi cæli</i> incommoda quomodo præcauen-	
da	70
<i>Nephritis</i>	7. 17

O.

<i>Obstructiones</i> alui	12. 46. 74
- - -	duriores maximeque perti-
- - -	naces
	46. 47. 49
- - -	delirio vel lethargo laborantium
	22
- - -	hæmorrhoidum
	24. 57. 95
- - -	hepatis
	94
- - -	lienis
	ibid.
- - -	lochiorum in puerperis
	57
- - -	mensium feminis noxiæ
	35. 57
- - -	viscerum
	94
<i>Oculorum</i> affectus rubicundus	94
- - -	dolor
	7. 51. 57. 75
- - -	excreſcentia super pupillam
	100
- - -	fluxus
	75
- - -	inflammatio
	47. 51. 57. 100
- - -	inflatio
	95
<i>Odontalgia</i>	9. 57. 94
<i>Oedemata</i>	25. 33. 34. 94
	<i>Ophtbal-</i>

INDEX

<i>Ophthalmia</i>	57. 100. vid. <i>Oculorum</i> adfectus.
<i>Oris</i> fœtor	19
<i>Offis</i> facri dolores	30
<i>Otalgia</i>	9. 47. 57. vid. <i>Aurium</i> dolor.
P.	
<i>Palpitatio</i> cordis	14. 24. 34. 47. 57. 95. 107
<i>Paralysis</i>	8. 14. 18. 68. 98. 112
<i>Partium</i> tonum roborans pulvis solaris	96
<i>Parturientes</i> a quibus medicamentis abstinere debeant	39
<i>carum</i> dolores	6
<i>vagi</i> et spurii	39. III
<i>Partus</i> difficilis	6. III
<i>Passio</i> cœliaca	32
<i>colica</i>	17. 47. 57. 68. 70
<i>hysterica</i>	13. 14. 24. 34. 57. III. 112
<i>iliaca</i>	112
<i>Pathemata</i> animi subitaria	51. 60
<i>Pauores</i>	40. 61
dormientium	47
<i>Pectoris</i> anxietas seu constrictio	34. 57. 95. 107
vitia seu malæ adfectiones	79
<i>Pedilauia</i> quibus profint	37
<i>Pedum</i> dolor spasticus	5. 6. 20. 23. 57
lassitudo	34
tremor	8
tumor	34
<i>Periculum</i> vitæ metuendum	72
<i>Phtbisis</i> incipiens	65. 79. 96
<i>Pestilentia</i>	23. 24
<i>Petigo</i>	75. 100
	<i>Pilulæ</i>

RERVM PRAECIPVARVM.

Pilulae contra obstructiones; earum operatio
in morbis ab alui obstructione ortis 46. fin.
47. cur aliis purgantibus præpolleant 47.
ratio vtendi 48. quando via per clyste-
rem paranda 49. quid in vsu earum
obseruandum ibid. quot earum sumendæ

ibid.
Pilulae polychrestæ viles sunt præcipue femi-
nis 27. parturientibus 39. puerperis
post partum 40. molam gerentibus 41.
lactantibus 41 fin. infansulis 42. in fluo-
re albo ibid. in morbis ventriculi 28. in
vacuo vomendi conatu 29. in flatulentis
30. in alui fluxibus 32. in omnis generis
tumoribus 33. in adfectibus muliebribus
ibid. in reuocando mensium fluxu 35. in
nimio mensium fluxu 37. in abortu 38.
in hæmorrhoidibus 43. in cæcis et vomitu
vel mictu cruento non adhibendæ ibid.
dosis 44.

Pilulae purgantæ cur sint inuenta 45. quæ
sint earum natura et virtus ibid. quando et
quomodo sumendæ 46.

Pituita 19. 21. 77. 107. 109.

Plethora 36. 51. 56.

Pleuritis 47. 57. 112.

spuria 59.

Podagra 5. 6. 57.

Potus iusto parcioris incommoda 36. 59. 90.

Præcordiorum anxietas 34. 47. 57. 92.

Profluua ventris 32. 55. 64. 70.

Pruritus cutis 55.

- Puerperarum* symptomata 39. 40. 41. 108. 112
Puerperium quomodo fiat tolerabile 4. 6. 7
Pulmonum vitia 79. 80. 95. 96
Pulsatio aurium 67
Pulvis contra acredinem utilis in febris pe-
 rechialibus, variolis et morbillis 54. in ebulli-
 tione sanguinis 55. in febriculis infantum
 ibid. dosis ibid.
Pulvis antispasmodicus prodest præcipue
 sanguineis 56. in multis morbis 57. seqq.
 quomodo adhibendus in hæmoptysi et
 aliis adfectibus sanguineis 58. in dolori-
 bus calculi, lumborum cæt. 59. in flati-
 bus, in adfectibus spasticis et conuulsivis
 ibid. in vehementibus animi commotio-
 nibus 60. in æstuatione sanguinis ibid.
 in congestionibus illius ibid. in morbis
 mulierum, speciatim grauidarum et pariu-
 rientium 61. quantum illius sit dandum
 ibid.
Pulvis bezoardicus vsum præstat in ebulli-
 tione sanguinis 51. in febris continuis
 52. in intermittentibus ibid. in terro-
 ribus aliisque vehementibus animi commo-
 tionibus 53. quantum pro dosi capiendum
 ibid.
Pulvis laxans, laxat leuissime 74. enecat et
 eicit vermiculos 75. in scabie similibusque
 morbis virtutem suam exferit ibid. vtendi
 ratio 76. dissoluit pituitam et purgat fan-
 guinem 77. quid in vsu illius obseruandum
 ibid. dosis 78
Pulvis

RERVM PRAECIPVARVM.

Puluis niger virtutem habet roborandi incomparabilem 72. resistit immoderatis sanguinis fluxibus 73. ibid.
dosis

Puluis solaris prodest in morbis chronicis 84. in omnibus morbis adhiberi potest 85. an sit medicina vniuersalis 84. 85. 87. fqq. cum essentia dulci coniungi potest 88. extenuat et depurat sanguinem 89. in omnibus febribus acutis, variolis et morbillis utilis est 91. in febribus hecticis et lentis 93. in obstructione viscerum 94. sanat in corpore occulta mala et vlcera in liene cat. 96. roborat tonum partium ibid. externe mala vulnera depurat 99. operatur per vrinam cat.

Puluis vitalis medicamentum est roborans et securi vsus 62. operatur per sudorem ibid. efficaciam exferit in febribus acutis et petechialibus 63. in profluuiis ventris aliisque morbis pluribus 64. in phthisi 65. quale regimen vsus illius requirat ibid. quo vtendum vehiculo et in qua quantitate 66. quoties vsus illius repetendus ibid. potest etiam cum puluere laxante vtiliter sumi 76

Purgans remedium 21. 31. Si quis sibi inde incommoda contraxit 30

Purpura 54. 92
 alba 63. 91

Purulenti adfectus 4. 8. 17. 64

Putredo 17. 50. 62. 63. 80

R.

INDEX

R.

<i>Rauedo</i>	pag. 57
<i>Renum</i> inflammatio	13
inflatio	95
occulta vlcera	96
<i>Respirandi</i> difficultas	47 57. 61. 94. 95
<i>Rhabarbara</i> vsus	12. 33
<i>Rheuma</i> cerebri	109
<i>Rigor</i> membrorum	6
<i>Ructus</i>	28. 47. 59. 97

S.

<i>Salis tinctura</i> commendata	44
descripta	106 sqq.
<i>Sanguineis</i> quænam medicina proficit	51. 56
<i>Sanguinis</i> abundantia nimia	51
acrimonia	28. 54. 106
æstuario	60
congestiones	3. 5. 51. 60. 64. 94. 112
depuratio	31
ebullitio	24. 41. 51. 55. 61. 97
eictio per tussim	43. 57. 58
fluxus vitiosus	3. 12. 37. 73
nimius in puerperis	13. 97
hæmorrhoidalis defectus	13. 24. 43. 57. 73.
excessus	43. 57. 97
impuritas	28. 77.
incalescentia	55. 56
menstrui anomalici	34. 35. 73
mictus	43. 57. 58. 97
	<i>Sanguinis</i>

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Sanguinis obstructio</i>	94.	in puerperis	13
-	-	spissitudo	21. 36. 37. 107. 112
-	-	stagnationes	3
-	-	stases 65. 94.	vid. <i>Congestiones.</i>
-	-	superfluitas	3. 57
-	-	turgescentiæ	33
-	-	vomitus	43
<i>Sarsaparilla</i>			90
<i>Scabies</i>			17. 55. 76. 90
<i>Scarificationis</i>	commoda		58
-	neglectæ incommoda		12. 57
<i>Scorbutus</i>			8. 16. 64
<i>Secundinarum</i>	retentio		7. 13. 40. 98
<i>Sedentariæ vitæ</i>	mala		36
<i>Seminis</i>	fluxus		17. 64
<i>Sennæ foliorum</i>	vsus		12
<i>Sentina</i>	in vtero		108
<i>Singultus</i>			30
<i>Soda</i>			47. 55. 107
<i>Soporosi</i>	adfectus		8. 22. 102
<i>Spastici</i>	adfectus et dolores		3. 5. 51. 57
<i>Spissitudo</i>	sanguinis		21. 36. 37. 107. 112
<i>Stases</i>	sanguinis		65. 94
<i>Stomachi</i>	cruditates		18. 32. 51
-	-	debilitas ac dolor	18. 28. 57
-	-	inflatio	95
-	-	intumescencia	68
-	-	medicina	18
-	-	oblimatio mucosa	45
<i>Stranguria</i>			55. 59. 107
<i>Sudores</i>	colliquatiui		99
<i>Sudoris</i>	promotio et vilitas		50. 53. 62
			<i>Suffo.</i>

INDEX

<i>Suffocationes</i>	pag. 13. 47. 99. 100
<i>Suppuratio</i>	93
<i>Susurrus aurium</i>	67

T.

<i>Terror</i>	40. 51. 53. 60
<i>Tinctura corallina</i>	110
- - - falis	106
<i>Tinnitus aurium</i>	47. 67
<i>Tonsillarum inflammatio</i>	51
<i>Tonum partium quid roboret</i>	96
<i>Tormina ventris</i>	30. 34. 47. 55. 61. 69
<i>Tremor artuum</i>	8. 65
- - manuum pedumque	33. 34. 94
- - ventris	17
<i>Tristitia lactantium infantibus noxia</i>	42
<i>Turgescentia sanguinis</i>	39
<i>Tussis</i>	19. 34. 57. 109
- - sicca	47
<i>Tympanites</i>	94. 112

V.

<i>Variolæ</i>	31. 54. 63. 92. 93. 100
<i>Vene sectionis commoda</i>	38. 58. 95
- - neglectæ incommoda	12. 57
<i>Venenati animalculi ictus</i>	91
<i>Venenum</i>	30. 63
<i>Ventriculi acredo</i>	106
- - cruditates	18. 32. 51
- - debilitas et dolor	18. 28. 57. 68
- - dolor circa os ipsius	47
	<i>Ven.</i>

RERVM PRAECIPVARVM.

<i>Ventriculi</i> impuritas mucosa	pag. 45
- - intumescencia	68
<i>Ventris</i> flatus et tormina	30. 34. 47. 55. 61. 68
- - profluuia	32. 70
- - tumor	17
<i>Vermiculæ</i>	75
<i>Vertigo</i>	14. 24. 47. 67. 95. 112
- - idiopathica	8
<i>Vesicæ</i> calculus	96
<i>Virgineus</i> morbus	112
<i>Virium</i> debilitas	2
<i>Viscera</i> obstructa	94
- - roboranda	30
<i>Vitæ</i> periculum	72
<i>Ulcerosi</i> adfectus	4. 7. 8. 13. 17. 55. 64. 76
<i>Vomendi</i> conatus vacuus	29
<i>Vomitoria</i> si cui fuerunt noxia	30
<i>Vomitus</i> 13. 17. 29. 34. 47. 57. 69. 97. 100. 107	
- - cruentus	14
<i>Vrine</i> ardor	59
- - difficultas	ibid.
- - retentio	61. 107
<i>Vterina</i> conuulsiones	108. 111
- - hæmorrhagiæ	13. 57. 61
- - molæ	38. 41. 73
- - passiones	47. 57. 107. 109. 111
<i>Vterus</i> turgidus et tumidus vnde existat	40. 108
<i>Vulnera</i>	4. 8. 64. 69. 99
<i>Vuulæ</i> inflammatio	47. 51



RERVM FRACIVARVM

102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150



4
56 3208^a

VD 18

ULB Halle

3

004 372 867



W.C.





