

1790, 8^b Wiesant identisch mit 14^b

9
L

DE
P L A N T I S
S E G E T I I N F E S T I S
PART. II. SPECIALIS SECT. II.

1790,
Ad
Q V A M
P R A E S I D E

D. GEORGIO RVDOLPHO BOEHMERO
THERAPIAE PROF. PVBL. ORD. ACADEMIAE SENIORE
PHYS. PROVINC. SOC. OEC. LIPS. SODAL. ET
H. T. FAC. MED. DECANO

P R O G R A D V D O C T O R I S
DIE XXIII. MENSIS IVLII MDCCCLXXX
H. L. Q. C.

P U B L I C E D E F E N D E T
GOTTLIEB EBERHARD KOHLHEIM
ZITTAVIA LVSATVS
MEDICINAE CANDIDATVS,

VITEMBERGAE
LITERIS CAROLI CHRISTIANI DÜRRIT.

VIRIS
MAGNIFICIS
IVRIVM CONSULTISSIMIS AMPLISSIMIS
DOCTISSIMIS
CONSVLIBVS
SYNDICO
PRAETORIBVS
SCABINIS
RELIQVISQUE
SENATORIBVS
VRBIS ZITTAVIENSIS
PATRONIS
OMNI OBSEQVIO SVSCIPIENDIS ET COLENDIS
HANC DISSERTATIONEM IN AVGVRALEM
RELIGIOSO MENTIS CVLTV
D. D.

ADDICTISSIMVS CLIENS
GOTTLIEB EBERHARDVS KOHLHEMIUS.

SECTIO II.

HERBA INFESTAE PLANTAE.

§. I.

Plantarum, segeti infestarum, secundam classem consti-
tuunt illae, quae Herba, Foliis scilicet et Caule potius,
quam radice Cerealibus detrimentum inferunt. Ha-
rum omnium quidem folia, cum et copiosa sint et succulen-
ta, magnam partem nutrimenti in se rapiunt, et sic omnes
eodem modo nocent, haec tamen sola accusare non debemus,
sed ad caulem quoque respiciendum erit, quippe qui pro di-
versa sua indole nunc cerealium incrementum impedit, nunc
messoribus molestiam creat. Has itaque plantas in tres iterum
species distingue, aliasque erecto, alias volubili, alias deni-
que parasitico caule infestas fieri, admittere possumus. Quae
caulem erectum, plus minusue ramosum et foliosum obtinent,
communi modo, foecundum scilicet agrum exhauriendo, se-
getique necessarium pabulum subducendo, nocere, nemo du-
bitabit, praeterea erectus caulis in multis crassus et lignosus
esse solet, et hinc falcem quasi eludit, messemque taediosam
atque difficultem reddit; caulis e contrario mollis et succulen-
tus ut plurimum tardius, quam cerealium culmus vegetatio-
nem absolvit, cum his messus lente exsiccatur, humidus ad-

A

huc



huc in horreum transportatur, et nunc stramen aequa ac semina corruptit. Diuersis hisce modis segeti nocuiae sunt plantae sequentes:

Saponaria Vaccaria. Wilder Waid, Kuhbasilien, Kuhkraut, Kartheuserblume, Getraideseifenkraut, Erdweich, Lydweich. Inter hordeum et secale abunde saepius crescit, floretque Iul. Aug. Radix annua, caulis cubitalis saepe et firmus.

Papauer Rhoes. Vielblümichter Mohn, wilder Mohn, Kornmohn, rother Mohn, Klapperrosen, Flietschrosen, Klietschrosen, Kornrosen, Maggsamen, Grindmaggen, Hirnschale, Schnallen, rothe Kornblume. Annua inter secale, hordeum aliasque fruges copiose prouenit et belle colorati flores cum Cyano Mai. et Iun. aliquam pulchritudinis gratiam aruis conciliant, semina Aug. Sept. maturant. Caulis erectus, saepe cubitalis, hispidus, ramosus. De Papauere Cel. Poeta COVLEIVS quidem scripsit:

*Si quis inuisum Cereri benignae
Me putat germen, vehementer errat,
Ille me in partem recipit libenter
fertilis agri.*

Vid. Eius Poemata Libr. IV. p. 234. et licet huius flores a Medicis aestimentur et semina alaudis grata admodum esse, GVNNERVS Fl. Norw. Part. II. p. 136 monuerit, tamen odiosa est agricolis planta. Semina per plures annos quasi sepulta progerminasse vidit DV HAMEL, vom Ackerbau p. 85. plantamque ouibus maximopere nocuam esse, legimus in Oekon. Nachricht. Vol. IV. p. 58.

Delphinium Consolida. Rittersporn, Spornblume, Lerchenklaue, Hornkümmel, St. Otilienkraut. Annua, inter secale in primis Flor. Iun. Iul. semina Sept. matura. Caulis pedalis, altior, ramosus.

Mox

*Mox quoque sponte sua Cyani et Delphinia totos
Incipient textu vario frondere per agros.*

RAPINVS Hort. Libr. I.

BOERHAVIVS atque LINNAEVS propter affinitatem cum
Aconito ad suspectas plantas hanc retulerunt.

Nigella arvensis. Wilder oder Ackerschwarzkümmel, Le-
dichtblume. Annua, Flor. Iul. Aug. Caulis pedalis, altior.
Semina nigra Nigellae satiuae substituuntur, acri indole facile
nocia.

Galeopsis Ladanum. Ackerandorn, brauner Andorn, klei-
ne Hansnessel, klein Berufkraut, kleiner Hohlzahn, Kornwuth,
roth Alyssenkraut, roth Feldsenenkraut, blaue Taubnessel.
Annua, cum Delphinio frequens. Flor. Iul. Aug. Caulis pe-
dalisch, altior, geniculatus, rami oppositi.

Galeopsis Tetrahit. Iisdem nominibus germanicis insig-
natur. Flor. Iul. Aug. Radix annua fibrosa, caulis erectus, fe-
re cubitalis, ramolus, internodia caulina incrassata.

Stachys arvensis. Kleiner Feldandorn. Flor. Iul. Aug.
Radix annua, fibrosa, caulis erectus, aut decumbens, saepe
pedalis, tetragonus, rami oppositi.

Myagrum satium. Dort, Dotter, Flachs: oder Leindot-
ter, Finkensaamen, kleiner Oelsaame. Flor. Mai. Iul. Radix
annua, tenuis, caulis pedalisch, cubitalis, pilosus, rami alter-
ni. Ob oleum, ex seminibus parandum, colitur hinc inde
planta, spontanea agris, Lino praecipue consitis, infesta. Aues
seminibus delectantur.

Erysimum cheiranthoides. Schotendotter, langschötiger Lein-
dotter, Leucoien, Hederich. Fl. Mai. Jun. Radix annua fi-
brosa, caulis saepe cubitalis, inferne ramosus.

A 2

Braff-



Braffica campestris. Wilder Durchwachs, gelber Durchwachs, Feldkohl, Waldkohl, Knützen. Copiose inter annum frumentum. Flor. Mai. Jun. Radix annua, caulis pedalis, altior. Junior planta ab ouibus comeditur, adulta acrior fit et intacta relinquitur.

Sinapis arvensis. Hederich, falscher Hederich, wilder Senf, Ackersenf, schwarzer Feldsenf, Schüttensenf, Ackerkohl, Rüdig, Roedick, Triller. Omnium fere copiosissime in agris humidis, apricis, Hordeo in primis constitutis, prouenit ita, ut arua circa Fesum Diui Iohannis saepissime flava et quasi Napo constita apparent. Inter frumentum perenne fere nunquam occurrit, licet enim satis eiusmodi cerealibus huius quoque semina cito progerminent, hyeme tamen destruuntur et sequenti vere nullum restat vestigium. Inter annuas autem primo statim Vere prouenit, celerrime vegetationem absolut et saepe autumno reddit. Radix fibrosa, caulis pedalis, altior, hispidus, ramosus. Cum sequenti, florendi in primis tempore, facile confunditur, hinc addamus: Folia ovata, sinuata, denticulata, leuiter pilosa, basi non auriculata, calicis foliola ex viridi flauicantia, expansa, petala flava, testaria quatuor intra stamina quatuor maiora, siliqua polysperma, cornu breuiori terminata. Semen acre, loco sinalpis nigrae et folia in cultu adhiberi possent. Culinarem herbae vsum maximopere commendauit RÜNZ, et script: Am besten schmeckt es mit Schinkenbrühe abgekocht. Man hat gar nicht nöthig, das erste Wasser abzuwiegien. Es hält im Geschmack zwischen Spinat und Kohl das Mittel, und ist zugleich ein recht gesundes Essen. Vid. Oec. Eneycl. Vol. XXII. p. 657. Magis adhuc huius herbae vsum laudauit GERMERSHAVSEN, retulitque: daß in seinem Dorfe arme Leute beständig diesen Hederich kochen, und so wenig Brodt dazu essen, daß sie die ganze Woche mit etwa vier Pfund Brodt

Brodt zum Hederich durchkommen; statt des Fettes röhren sie ein wenig Mehl unter den Hederich. Vid. Wittenb. Wochenbl. 1771. p. 80, et 1772. p. 205. Iunior planta ouibus, adultior etiam Equis gratum est pabulum, ex floribus melleam materiam copiolam apes colligunt.

Raphanus Raphanistrum. Hederich, Heiderich, Heidenrettig, Ackerrettig, Ackerkohl, wilder Senf, Schnödesenf. Annua planta, in apricis non crescens, modo inter segetes, in agris potissimum arenosis ita luxuriat, ut meliorem frugem saepe omnem excludat maximamque messis partem efficiat; laete viget inter Hordeum et Auenam, parce inter Secale, vix inter Triticum. Floret Maio ac per totam aestatem. Radix fibrosa; tota planta subhispida; caulis erectus, pedalis, altior, ab inferiori parte ramosus, pilis reflexis albis hispidus; folia caulina alterna, petiolata, auriculata, inferiora non raro pinnatifida, superiora oblongo lanceolata, dentata; spicae terminales et axillares solitariae erectae; calicis foliola quatuor conniventia, decidua, basi gibba; petala vel lutea, vel alba, venis coeruleis picta; glandulae duae intra bina stamina breviora et pistillum, atque duae inter stamina quatuor longiora et calicem; hae duae autem variant, et modo adsunt, modo absunt; in Varietate flore albo has duas nunquam vidit CRANZVS vid. Classis Cruciformium p. 55. Siliqua teres articulata, articulis quatuor ad sex sulcatis, unilocularibus et a se inuicem secedentibus; siliqua in origine sua bilocularis est, semina autem sensim maiora redditia septum obliterant, ut unilocularis videatur; Semina subrotunda, articulis inclusa, decidunt et rarissime in horreum transportantur. Planta iunior et recens an ab omnibus pecoribus sine noxa deuoretur, dubium videtur. Eandem ouibus gratum esse pabulum contra ELLISIVM notauit MATTVSCHKA Flor. Siles. To. II. p. 110. Conf. et Wittenb. Wochenbl. Vol. V. p. 201.

A 3

ab



ab Ouiibus et Bobus repudiari, ab Equis autem deuorari, tradidit GVNNERVS Fl. Norweg. II. p. 27. eius vsu perenii Oues retulit SCHREBERVS in der Sammlung Vol. XIII. 51. Bobus et praecipue Vaccis egregie conduceere exsiccatam plantam docuit Cel. KRÜNITZ, et scriptit: *Wenn die Pflanze jung noch vor der Blüthe getrocknet wird, giebt sie zur Winterszeit dem Rindvieh eine Nahrung, die weit über alle beste Arten des Kees hinaus zu setzen ist. Und wenn die Kühe im Winter kalben, brühet man ihnen diesen Hederich unter anderes Gemenge von Heu, oder Häckerling auf, sie fressen dieses Futter gerne und die Milch wird dabey vermehret; kann man mit dieser Wintersütterung anhalten, so bekommt man eine Winterbutter, welche an Farbe und Geschmack aller andern vorzuziehen.* Vid. Eius Oecon. Encyclop. Vol. XXII. p. 670 sq. Hominibus certe innocuum alimentum praebuit herba; iisdem autem semina fortassis damnum inferunt. LINNAEVS enim morbum spasmodicum, qui articulorum spastica contractione cum agitatione conuulsua se prodit, quemque multi a clavis fecaliniis deriuare solent, a Raphanistro seminibus deducere, et ideo hunc morbum Raphaniam appellare voluit, sequentibus permotus rationibus: 1) morbus non ante incepit, quam nouum autumno agricolae e novo frumento panem comederint, sensimque vere appropinquante definit; 2) obseruarunt aegrotantes panem huius frumenti sibi nocuisse recentem praecipue et clibano calentem; 3) rustici et pauperes vexati sunt hoc morbo, numquam vero homines melioris sortis vel diuites; qua in re diaetam regionis et consuetudinis cognouisse iuuabit; nempe rustici et vilioris conditionis plebecula panem ex solo Hordeo conficiunt, vt Secali vendendo parcatur; hinc recte concluditur, causam morbi Hordeo contineri; in australiori Suecia vero, vbicunque obseruatus fuerit morbus, duobus in primis laborant agri vitiis, Brassica campestris scilicet, et Raphano Raphanistro, quorum illa in agris fecaliniis vel Hordeo consitis: haec autem

non



non nisi in agris Hordeum ferentibus crescit. 4) Infantes lactantes mali exsortes extiterunt. 5) Qui frumento vni sunt impuro et granis, inter segetes ingerendum, per tribularii arcam elapsis, huic malo magis fuerunt obnoxii; quam ob rem, subsequenti anno, frumenta curatius qui purgarunt, immunes evaserunt. 6) a pane comesti saepe vomitum, et haemorrhagiam ante ingruentem morbum spasmodicum passi sunt. 7) LINNAEI Frater praeter alia animalia, hoc morbo defuncta, Meleagridem diffecuit, cuius in ingluuii nihil aliud se inuenisse, quam siliquas aliquas articulatas, retulit et Ipse Archiater LINNAEVs Gallo Pauonum maximo siliquas Raphanistri deglutiendas praebuit, indeque eius pedes contractos suis vidit. Conf. Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 430 sqq. Praeter ea Sues atque aues ex esu horum seminum oedemate ac conuulsionibus in collo, pedibus atque alis laborasse obseruavit BAECKIVS. Vid. Eius oratio de morbis contagiosis translata im Schwed. Magazin Vol. I. p. 381. Multa ex hac oratione repetit FRANCKIVS in Syst. der medicin. Policey Vol. III. pag. 234 sqq. Trifissimos autem eiusmodi effectus ab assumptis feminibus haudquaquam obseruabant alii. Cl. WAHLIN eadem variis animalibus dedit, maioribus et minoribus, sola et frumentis admixta, item panem et alia ex iis parata, animalia libenter illa comedenter nullumque damnum inde perpessa fuerunt; infantibus quoque multum panis exhibuit, cui admixta erant illa semina, quibus ille nihil nocuit. Vid. Schwed. Akad. Abhandl. Vol. XXXIII. p. 30. Eiusmodi morbum minus bene plantae innocentia adscribi, afferit SPIELMANNVS Diff. de Plantis Venenatis Alsat. p. 66. VOGEL in Praelect. de curandis C. H. affectibus p. 397. aliisque. In Holstia semina Raphanistri Auenae admiscentur et ab hoc pabulo Equi egregie roborantur, teste KRÜNTZIO Libr. cit. p. 670. Acredinem seminis, forsitan et ipsius herbae, insigniter augeri, si plan-

ta



ta in humido loco crescit, probabili ratione coniicimus. De extirpatione plantae vid. GERMERSHAUSENII Hausvater Vol. II. p. 7 et 645 Wittenb. Wochenbl. Vol. IV. p. 180 et Vol. V. p. 201. Braunsch. Lüneb. Gesellsch. Nachr. Vol. I. p. 309. GMELIN Unkraut p. 165. Berlin. Samml. Vol. VI. p. 505. et in primis KRÜNITZ Libr. cit. p. 660 et 672. Herba suffossa, vti aliae succulentae plantae, foecundiorem omnino reddunt agrum, propterea vero illam intactam relinquendam esse, nemo serio affirmabit.

Fumaria officinalis. Feldraute, Ackerkraut, Alpraute, wilde Raute, Erdrauch, Taubenkropf, Taubenkörbel, Katzenkörbel, Krätzheit, Grindkraut, Nunnenkraut, Fimstern. Flor. Mai. Iun. annua, radix tenuis fibrosa; caulis erectus aut decumbens, angulosus, ramosus; palmaris, altior; planta admodum succulenta, virtute medicata notissima, recens ouibus grata et modice assumpta ipsis salutaris.

Nomen Fumariae a fumo deriuatur; idque inde factum plurimi existimant, quia succus eius, oculis instillatus, fumi ad instar ardeat et delacrymationem inducat; vid. PLINIVS Libr. XXV. cap. 99. CAESALPINVS Libr. VI. c. 77; alii autem, rectius forte, statuunt, Fumariam appellari, quia, cum primo e terra erumpit, ramis tenuissimis, vndique sparsis, foliisque copiosissimis, per ipsam se ita diffundit, vt quasi fumus circa eandem appareat, hinc et planta ab aliis Fumus terre et germanico recepto nomine Erdrauch appellari solet. Conf. BOERHAVII Hist. Plant. Lond. 1738. p. 389. Addamus, quae de singulari proprietate, Fumariae adscripta, monuit Cel. Poeta RAPINVS Hortor. Libr. I.

*Ipsa etiam primo glacilis Fumaria vere
Offendet varios per Norica Saxa colores.
At non horrendos coeli perferre tonantis,*

*Vt perhibent, poterit, laeso non flore fragores:
Cum vel fulmineo Fumaria tacta vapore
Deficit et lapſa infelix ceruice decumbit.*

Sonchus oleraceus. Gänsedistel, Saudistel, Milchdistel, Leberdistel, Dudistel, Hasenkohl, Hafensalat, Seuchenkraut, Saumelke, Gänse- oder Milch-Wachtelwaizen. Flor. Iun. et per totam aestatem. Radix fusiformis, fibrosa, annua; caulis erectus, tres quatuorque pedes altus, glaber, vel asper, ita et folia plus minusue spinosa; Iunior succulenta herba loco oleris et in acetariis usurpatatur; Vaccis, ouibus et passeribus canariensis gratum est pabulum; si Lepores eandem copiose assument, caro eorum ingratum obtinet saporem.

Carduus crispus. Krausdistel, Kratzdistel, Wegdistel, Flor. Iul. Aug. Radix annua, caulis tripedalis, altior, sulcatus, alatus, spinosus, ramosus. Seminibus, pappo sessili coronatis, haec et congeneres plantae vndique luxuriant, vt que hinc in Gallia lege publica sanctum fuit, vt omni industria et apto tempore eradicentur Cardui, et negligentiae reus a vicino accusari et poena affligi debeat. Vid. Schlesische Landwirthsch. Vol. I. p. 123.

Senecio vulgaris. Kreuzkraut, Kreuzwurzel, Grindkraut, Grimmkraut, Grindwurzel, Goldkraut, Beruskraut, Saukraut, Baldgreyse, Speykraut, Ohmkraut, Würgekraut. Floret per totum fere annum. Radix fibrosa, annua; caulis erectus, palmaris, pedalis, ramosus; folia succulenta. Oues intactam relinquent; apes ex floribus melleum succum copiose colligunt, felis et floribus Passeres aliaeque aues delectantur.

Matricaria Chamomilla. Chamillen, Kamillen, Gamillen, Ricmerry, Roëmerry, Romey, Hermigen, Hermel, Helmeringen, Hermünzel, Kammelblume, Laugenblume. Flor. Iun. Iul.



Iul. saepe in autumno inter Rapas refloret. Radix fibrosa annua, caulis erectus pedalis, altior, ramosus. Vulgo Chamaelum dici solet planta et licet hoc nomen a χαμαιλη humi et μηλον malum deriuetur et teste PLINIO L. XXII. c. 26. odorem mali habeat planta, multifaria tamen et egregia virtute pollet. Conf. MVRAY Appar. Medicam. To. I. p. 143 sqq. Herbam teneram et succulentam in agris requietis vere et autumno Oues lubenter appetunt.

Anthemis arvensis. Kuhdille, Hundsdille, Ackerkamille, falsche Kamille, geruchlose Kamille, Hundskamille, wilde Hermel, Ochsenauge, Rindsauge, Mayankraut. Cum priori frequenter occurrit. Flor. I. n. Iul. Radix duriuscula, fibrosa, perennis, caulis fesquipedalis, a bafi ramosus. Flores dito triti odorem quodammodo foetidum excitant; folia iuniora ab Ouibus comeduntur.

Anthemis Cotula. Hundskamille, Stinkkamille, Hundsdille, Kuhdille, Krötendille, Gänsekropf. Floret cum praecedente. Radix annua, tenuis, fibrosa, caulis erectus, pedalis, altior, ramosus. Planta digitis trita omni in parte foetidum odorem spirat, et hinc quandoque a Medicis in vsum vocatur; ab Apibus auersatur, Pauonibus frequenter praebet domicilium.

Calendula arvensis. Ringelblume, Ackerringelblume, Goldblume, Warzenkraut, Gilken, Butterblume, Dotterblume, Sonnenwende, Haussonnenwirbel. Flor. a Iul. ad autumnum. Radix fibrosa annua, caulis palmaris, procumbens et erectus, ramosus, multiflorus. Planta acris a veteribus Medicis aestimata, a recentioribus neglecta.

Vicia vrens. Eiternessel, Eidernessel, Heiternessel, kleine Brennessel, Habernesel. Fl. Iul. Aug. Radix annua, fibrosa, caulis erectus, pedalis, altior, rami oppositi. Oues intactam relinquunt.

§. II.

§. II.

Diuerso ab his modo Segeti infestae sunt plantae, quae caule volubili, vel capreolis instructae sunt, quaeque, si solae in aliquo loco crescunt, se inuicem amplectuntur et humiliores manent, si autem aliae proxime adstant, iisdem, tanquam fulcro, alliguntur, earumque auxilio ascendunt et elongantur; magno sane ipsarum commodo, est maximo illarum, cum quibus coniunctim crescunt, detimento. Prout enim scandentes et volubiles plantae eum frequenter in finem coluntur, ut aliae sponte natae et erraticae in incremento impedianter, penitusque destruantur, ita etiam cereales plantae ab earum societate ingens experiri debent damnum. Hi enim agricolis invisi fatorum alumni culmos cerealium, eorumque spicas atque paniculas arripiunt, in fasciculos colligunt, in terram depriment, erectionem nouam non permittunt, in ulteriori vegetazione retardant, ad putrefactionem disponunt eorumque exsiccationem, peracta messe, impediunt. Eundem certe praestant volubiles plantae effectum, qualem a copiosa pluvia experiuntur Segetes, et de qua egregie scriptit OVIDIUS Metamorph. I. vers. 272.

*Sternuntur Segetes et deplorata Coloni
Vota iacent; longique labor perit irritus anni.*

Inde etiam frequenter accedit, ut bene florentes cereales plantae semina nulla ferant, solosque culmos, vacuasque spicas exhibeant, et ita prognosticum fertilitatis, ab OVIDIO Fast. Libr. V. vers. 263. notatum,

Si bene floruerint Segetes, erit area diues,

fallacissimum reddant. Conuoluulus minor et Lathyrus tuberosus, quae radice repente ac tuberosa segeti damnum inferunt, et Sectione priori adductae fuerunt, huc quoque pertinent.



nen, cum prioris caulinuli non semper humi repant, sed etiam, simulac in vicinia constitutas plantas inueniunt, easdem arripiant crebrisque circumvolutionibus reuinciant; Lathyrus vero, caule volubili foliorumque clauiculis instructus, eundem semper crescendi modum tenere, aliasque comprehendere plantas soleat. Praeter has autem frequenter inter segetes habitant sequentes scandentes plantae:

Galium Aparine. Klebkraut, Kleber, Klieue, Tingelkraut, Zungenpeitsche, Nabelsaamen, Bettlersläuse, Zaunreiss. Flor. Iun. et femina per totam aëstatem maturant. Radix fibrosa, annua, caulis tripedalis, altior et ramuli tenues, tetragoni, eorumque anguli spinis retrorsum directis obseSSI, folia verticillata, aequo in margine et dorso spinosa, hinc tota planta aspera, atque scabritie sua non tantum praetereuntium vestimentis adhaeret, eademque retinet, quasi hominem amabili cinculo vincire vellet, Philodelphus et propterea a DIOSCORIDE Mat. Med. Libr. III. c. 104. PLINIO Libr. XXVII. cap. 15. aliisque Philanthropos appellata fuit, sed etiam plantas proximas comprehendit, aculeis firmiter tenet, detrahit et suffocat. Planta hac pastores coli vice vti ad eximendos et lacte pilos, DIOSCORIDES I. c. idemque in Suecia consuetum esse LINNAEVS Fl. Suec. ed. II. p. 45. et Semina Coffeae succedanea esse in Hibernia RYTTY Beschreib. von Dublin Vol. I. pag. 38. retulerunt, Herba concisa pullorum anserinorum esca est in Anglia et hinc nominatur Goose-Gras. Vid. RIEGERI Introd. ad Hist. Nat. To. I. p. 710.

Polygonum Convolvulus. Das kletternde gestreifte Heidekorn, Buchwinde, Schwarzwinde, Heidelwinde, Vogelzunge. Flor. Iul. Aug. Radix annua, fibrosa, caulis debilis, angulosus, striatus, alternatim ramosus, altissime scandens et circa frumenta sese conuoluens. Herba pabularis est, oves eandem luben-

Iubenter deglutire legimus in Acl. Stockholm. 1750, in nostris agris eam respuant. Semina aunculis, et loco Polygoni Fagopyri hominibus quoque esculenta.

Lathyrus Aphaca. Platoser Lathyrus, Ackerplatterbse. Fl. Aug. Radix annua, caules tetragonii, ramosi, decumbentes aut erecti; cirrhis, quibus costa finitur, plantis adhaeret; costa saepe nuda, quandoque foliolis cincta.

Pisum aruense. Felderbse, wilde Stockerbse. Flor. aestate. Radix annua, fibrosa, caulis tenuis, ramosus, cirrhorum auxilio volubilis; ab aliis speciebus facile distinguitur dupliciti foliolorum pare, stipulis emarginatis et floribus solitarie positis.

Vicia Cracca. Vogelwicke, Vogelheu, Krake, Krok. Flor. Jun. Iul. Semina maturat Aug. Sept. Radix perennis, fibrosa, caulis tetragonius, sulcatus, ramosus, inter fruges erigitur, cubitalis, altior euadit et claviculis costae ramosis cerealibus maxime infesta est. De hac et Arachi scribit DODONAEVS: *Prouenit vtrumque vitium una cum segetibus, quibus coeli statu humido admodum perniciosum est, tunc enim cito incrementum sumens confessim segetem praeoccupat, teneramque pertinaci vindicta crebrisque circumvolutionibus deorsim trahit ac calamitosam eam efficit.* Vid Hist. Frumentor. p. 163. Equi a semine cito pinguescunt LINN. Amoen. Acad. Vol. V. p. 360. a bobus et ouibus non deuoratur, nisi fame coactis GVNNERI Fl. Norw. To. II. pag. 12. Semina nigra, cum secale mixta, in annonae caritate panem praebent nullo modo nocuum.

Vicia sativa. Schwarze Futterwicke, Rosswicke, Saamwicke, Kornwicke, Feldwicke, zweyblümige Wicke. Floret Iun. Semina maturat Iul. Aug. Radix annua fibrosa, caulis cubitalis, altior, tetragonius, sulcatus, ramosus, debilis, inter fruges erigitur capreolis ut plurimum tripartitis. Inter Aue-



nam frequenter habitat, et utriusque semina, inter se mixta, saepe in horreum transportantur. Colitur quoque seorsim, et pabulum Equorum constituit utilissimum. Iunior planta etiam ab Oribus deuoratur. Seminibus delectantur Columbae.

Eruum tetraspermum. Kleine Linsenwicke, kleine Feldwicke, kleine Vogelwicke, vierfaamige Linse. Flor. Iun. Iul. Radix annua, caulis debilis, tetragonus, claviculorum ope erectus, et frumenta inter se colligens; planta autem recens et exsiccata gratum praebet omnibus fere pecudibus pabulum.

§. III.

Quo rarius inter Segetes nostrates radice parasitica planta, Orobanche, inuenitur, eo frequentius occurrit alia, quae caule aliis plantis non modo adhaeret, easdemque, ut antea recentiae, amplectitur et strangulat, sed etiam easdem alimento fraudat, illudque in sui incrementum impedit. Est haec *Cuscuta Europaea*, quae omnibus fere plantis herbaceis parasitico nexus copulari atque iungi se solet. Agricolis etiam ingrata est hospes, et licet ipsis cerealium culmis, vtpote siccioribus, rarissime agglutinetur, interpositas tamen erraticas plantas occupat, easdemque cum cerealibus mutuo amplexa coniungit, et quemadmodum illas, quibus affixa est, exhaustit atque depascit, ita cerealium culmos secum rapit, deprimit, suffocat, immo tandem occidit. Crescendi et nocendi hunc modum egregie descripsit DODONAEVS sequentibus: plurimis hystrorum fidibus similibus longis repit cirrhis, qui statim ab ipso exortu herbarum ramulis ac solitis se implicant atque crebris voluminibus prospentes comas complectuntur, tam spissò non raro contextu, ut et proprium parentem subinde laqueis suis strangulent, sic, ut mole oneratae flirpes procumbant, aut nativo alimento destitutae contabescant. Vid. Frumentor. Hist. p. 185. Insigne incrementum et multiplicatio ramulo-

mulorum huius plantae in exemplo, quod commemorauit SE-
 GUER Plant. Veronens. To. I. p. 194. clarissime elucescit; vidit
 scilicet ille vuae racemum, in quo longissimae Cuscutae clau-
 culae dependent, ita, ut non inepte barbam repraesentent,
 vuamque barbatam efforment; eiusmodi spectaculum quoque
 vidit et delineauit LICETVS de Monstris L. I. c. 5. p. 25. Illam
 autem ingens aliis plantis adferre damnum, immo frequenter
 interitum, diuersa plantae imposita nomina satis superque
 comprobant. Ita enim eandem agricolae in Britannia exe-
 crantur, et inuidiosis nominibus Helliveed et Devilsguts, id est;
 Herbam inferni et Diaboli intestina appellari solet, notante RAO
 in Synopsi Stirp. Britannic. ed. 3. Lond. 1724. p. 28. eamque Ver-
 tumnum, Proteum aut Polypum herbarum non inepte appella-
 ri posse, scribit SIM. PAVLI in Quadripart. Botanico p. 310.
 Etymologia quoque graecae vocis Cuscutae, vel, vti alii scri-
 bunt, Casythae improbam eius virtutem declarat. Exposuit
 eandem WEDELIVS, et potius cum THEOPHRASTO de Caul.
 Plant. Libr. I. c. 32. Καδύτας, quam cum SALMASIO in Pli-
 nian. Exercit. To. II. c. 46. p. 682. aliisque καδύτας scribendum
 esse docuit, καδύτας enim, addit, nomen et omen haber $\alpha\pi\delta\tau\epsilon$ τε
 καδύνη, quo neruose indigitatur, plantam hanc vicinas non so-
 lum subire et abscondere, sed penitus etiam ingredi, demerge-
 re, immo tandem occidere. Vid. Eius Diff. de Cuscuta p. 7 sq.
 in qua et alia multa, quae ad huius plantae historiam pertinent,
 exposuit et speciatim quoque inquisiuit, an THEOPHRASTI Oro-
 banche Cuscutae speciem constituat. De qua re vid. Orobanche.
 Alii a voce Καρτίω, consuo, quia quasi filis herbas implicat, de-
 riuare voluerunt. Vid. COULEII Poemata L. I. p. 21. Aliae quo-
 que denominations, a plantis desumptae, quibus increscit, vir-
 tutis nocuiae indices erunt, e. gr. Αινοδέσμος, Vinculum, Podagra
 Lini et s. p. De insigni damno, quod in certa quadam regione
 Segetes a Cuscuta expertae fuerunt, vid. EHRHARTI Oek. Pflan-
 zen-



zenhistorie Vol. VIII. p. 126. Planta haec, quae germanice dicitur Saite, Seide, Seidenkraut, Flachsfeide, Thymfeide, Hopfensfeide, Flachsdotter, Filzkraut, Frauenhaar, Teufelszwirn, Range, Klete, Kleise, Leithaar, Stolzkraut, annua est, eiusque semen in terra germinat, radicem in eandem non dimitit, sed caulinus, qui in semine conuolutus iam praeexistit, cochleatim ascendit, plantasque vicinas statim arripit, atque in tenues, filiformes, nudos, varioque modo conuolutos ramulos dispescitur, qui papillis vndique erumpentibus, a G VETTARDO in Mem. de l'Acad. Roy. a Paris 1744. accurate descriptis, aliarum cortici sese insinuant, illisque succum, fortasse etiam virtutem detrahunt. De priori nemo dubitat. Existimat quidem OLDENDORPIVS Parasiticas, dum aridas quoque et exsuccas plantas inhabitent, et ex illis nutrimentum accipere non possint, ex aere tantummodo fluida insugere, ideoque si etiam succulentas occupent, nullum iisdem detrimentum inferre, vid. Eius Geschichte der Mission auf den Caraibischen Inseln Vol. I. p. 208. quod vero de omnibus, et de Cuscuta certe, affirmari haudquaquam potest. Valet omnino de his CATONIS monitum: *Amicus Domini eos sibi habeat amicos — parasiticum ne quem habeat*, de Villico Cap. 5. p. 12 sq. et quae addidit KEMTER: *parasiti enim mensas detergunt et velut mures semper edunt alienum cibum, non duratura longius, ac dum olla feruet, amicitia*; in Libro de Veterum disciplina de Re Rustica To. I. Mediol. 1777. p. 169. Cum succo etiam virtutem illarum plantarum, quibus adhaeret Cuscuta, transplantari ideoque eandem, pro illarum diuersitate, diuersis quoque in morbis vitilem esse, multi contendunt, verum relictissime scribit MVRAY: *nolo pluribus inhaerere spiri, nostro tempore exoleta, et quantum plerisque criterius eiuscet, infirmae.* Siccatam plantam praestans esse pecudum pubulum monuit GVNNER Flor. cit. To. II. p. 71. fortasse autem subest fallacia, et potius plantae, a Cuscuta inuolutae, pubulum

1193

lum



lum constituunt. Haec certe non, nisi magno cum labore se-
paratim collegi poterit, et post exficationem, parum admo-
dum remanebit.

De Plantis Semine infestis proxima occasione differe-
mus.

T H E S E S

A

CL. CANDIDATO AD DISPUTANDVM

PROPOSITAE.

Vti Bilis praeparationi chyli inseruit, ita et Chylus praepa-
rationi bilis.

Arteriae cerebri non pulsant.

Monstra non ab imaginatione materna oriri, vel plantae
docent.

Non omnia, quae reficiunt, nutriunt, contra vero omnia,
quae nutriunt, reficiunt.

Podagrī podagra magis deficiente, quam affigente mo-
riuntur.

Natam febrēm facile distinguimus, ortum eius et causam
saepe non satis assequimur.

C

A Vo-



A Vomitoris maxime febrium intermittentium auspicanda curatio.

Variolae speciem morbi inflammatorii constituant, ergo etiam easdem, methodo resolutoria adhibita, resolui posse, haud impossibile videtur.



Wittenberg Diss. 1790

f

ULB Halle
003 769 283

3



sb.

Farbkarte #13



B.I.G.

Black

White

3/Color

Red

Magenta

Yellow

Green

Cyan

Blue

Centimetres

DE

PLANTIS SEGETI INFESTIS

PART. II. SPECIALIS SECT. II.

Q V A M

P R A E S I D E

D. GEORGIO RVDOLPHO BOEHMERO

THERAPIAE PROF. PVBL. ORD. ACADEMIAE SENIORE

PHYS. PROVINC. SOC. OEC. LIPS. SODAL. ET

H. T. FAC. MED. DECANO

P R O G R A D V D O C T O R I S

DIE XXIII. MENSIS IULII MDCCCLXXXIX

H. L. Q. C.

P V B L I C E D E F E N D E T

GOTTLIEB EBERHARD KOHLHEIM

ZITTAVIA LVSATVS

MEDICINAE CANDIDATVS.

VITEMBERGAE

LITERIS CAROLI CHRISTIANI DÜRRIT.