



Sub Auspiciis summi Numinis 8

DISSERTATIONUM MEDICARUM

DE

CONNUBIO ASTRÆÆ

CUM APOLLINE,

CIRCA MEDICINAM FORENSEM

TERTIA.

1715-2

DE

VULNERIBUS

LETHALIBUS,

IN SPECIE,

Von tödtlichen Wunden.

Quam

AMPLISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,  
IN ACADEMIA PATRIA

Publico Eruditorum Examine submitunt

PRÆSES

GEORGIUS EMMERICH,

Med. Doct. & Prof. Ord. Sec. Pro-Consul. it. Lœbnic.

ac RESPONDENS

CHRISTIANUS LUDOVICUS CHARISIUS,

Reg. Boruss. Medic. Studiosus.

IN AUDITORIO MAXIMO,

Die August. Anni MDCCXV.

REGIO MONTI, Typis REUSNERIANIS.

*ILLUSTRISSIMO, GENEROSISSIMO ATQUE  
EXCELLENTISSIMO DOMINO,*  
**DN. MARQUARDO LUDOVICO  
L. B. à PRINTZEN,**

**SACRÆ REG. MAJEST. IN BORUSSIA,**  
Ministro Status Intimo, Supremo Aulæ Mareschallo, Borussici  
Aquilæ Nigræ Ordinis Equiti, Berolinensis Regiæ Præfecto, Con-  
sistorii Præsidi, Rerum Feudalium, Ecclesiasticarum & Illustris  
Gymnasii Joachimici Directori, Societatis Scientiarum Regiæ  
Protectori, Magdeburgensis Basilicæ Canonico, Ruppincensium &  
Bellinensium Districtuum Præfecto, Moscovitici St. Andreae  
Ordinis Equiti, Hæreditario Domino in Caro,  
&c. &c.

*Maximo Musarum Protectori, ac Domino suo Clementi.*

*Nec non*

*PER-ILLUSTRI, GENEROSISSIMO ATQUE  
EXCELLENTISSIMO DOMINO,*  
**DN. THEOD. CHRISTOPHORO  
CHARISII de NIDDA,**

**SACRÆ REG. MAJEST. IN BORUSSIA,**  
Consiliario Intimo, pariter & Erarii, Redituumq; Regionum  
Gravissimo, Fodinarum Metallicarum Directori supremo,  
ac Archiatro Primario, Illustris Collegii Medici  
Berolinensis Decano &c.

*Literarum Patrono summo, & Mæcenati suo gratiosissimo,*

*Dissertationem hæc in perpetuum humillimæ submissionis inonu-  
mentum, sui studiorumq; suorum levitensium qualemcunq;  
commendationem, ac Clientelæ Patrociniiq; gratiosissimi in-  
citamentum, cum voto consummatissimæ felicitatis ac peren-  
nantis prosperitatis,*

*devotissimo animo consecrat servus obsequiosissimus*

**CHRISTIANUS LUDOVICUS CHARISIUS.**

# De Vulneribus Lethalibus in specie <sup>69</sup>

& quidem

## I. De Vulneribus Capitis lethalibus.

s. I.



Um in Dissertatione antecedenti de vulnere lethali in genere locuti sumus, jam in specie vulnera partium corporis humani considerabimus, brevemque eorum delineationem, impr. ex clariss. Bohnio de Renunc. Vulnere, & ex celeberr. Valentini Pandectis Med. Legal. dabimus, utpote quos optimos Antesignanos hac in parte veneramus & quidem omnium primò Capitis, dein Pectoris, postea Abdominis, tandem artuum & vasorum sanguiferorum aliorumq; vulnera inspicemus. De capitis quidem læsionibus omnibus dicendum, quod naturâ suâ non sint tutæ, sec. fidele *Fidelis l. 4. sect. 2. c. 6. p. 555.* monitum, hinc leviuseculæ non habendæ sec. *Hippocr. in proem. libr. de vulner. Capit.* cum à frigidiusculo alioue ipsis adversante incongruè aëre mox alterari & in pejus conjici possint; sapius tamen observatur, quod gravissimæ capitis contusiones, feliciter curatæ fuerint, quales miras curationes DEI potissimum gratia Valleriola *l. 4. Obs. 10. l. 5. Obs. 9. l. 6. Obs. 4.* Hildanus *Cent. 4. obs. 1. 2. 3. 4.* recenset, item Paræus *Oper. l. 9. c. 9.* desperatorum quorundam casuum ac historiarum felicem eventum enarrat, ac concludit: Multos ab exiguis vulneribus mortem oppetere, alios, ex ingentibus & penitus magnis desperatisque convalescere. Conf. *Diemerbræck Anat. l. 3. c. 5. p. 507.* Sennertus, Ammannus in *Medic. Crit. Hippocr. Epidem. lib. 7. XXXVIII. num. 7.* Leviores autem nonnullarum partium læsiones, ut flebilis ad hæc usq; tempora experientia dedit, perniciosæ existiterunt Vid. *Hippocrat. l. 7. Epid. XXIII 6 XIX.* Hildanus *Cent. 1. obs. 21. 19. Cent. 5. obs. 2.* Forestus *l. 6. obs. med. 49. 50.* Sic Dolæus *Encyclop. Chirurg. l. 6. c. 5. p. m. 1435.* refert, quod quis duorum digitorum ungvibus comprehenderit mammæ cujusdam foeminae partem & fortiter compresserit, à qua pressione tumor urgens exortus & tandem exulceratus est cum metu ne cancer ipsam corripiat;

K

Sic

Sic de Balneatore quodam Idem narrat, qui venam fecaturus nervum tetigit, unde atrocissima symptomata, gangrana, sphacelus & ipsa mors subsequuta est. Sic vulnus acufactum lethale in Ephem. germ. anno 3. obs. 319. Sic alapa lethum attulit. Vid. Novellas Clar. Valentini p. 832. Cautè itaqve tam in curatione vulnerum procedendum est, quam in Renunciatione Virum prudentem se prastare Medicum oportet. Sed ad rem cum DEO.

## §. II.

Quæst. I. Quænam Capitis vulnera per se lethalia existunt?

Resp. Quæ Cerebrum valide commovent, aut profundè in Cerebri interiora penetrant, aut Sangvini Circulanti vel Spiritibus viam intercipiunt, aut Medici vel Chirurgi opem proflus excludunt, illa vulnera Cerebri sunt per se, interdum absolute lethalia appellanda. *Hinc 1. Magna Cerebri Commotio, Concussio, Conquassatio ac tubulorum ejus Contorsio ac Complicatio est per se lethalis. Oculorum acies equidem eandem non discernit, eò curatius mentis acumine indaganda tremorifica ejusmodi cerebri vibratio, hæc enim si contingit, Primus artis nostræ Parens Com 7. aph 58. III. Coicæ. Prænot. 370. & 1. de Morb. III 34. Item ex Primo Primus, Pergameus scil. in Hippocr. Aphor. scil. 7. aphor. 58 p. m. 40. dicit; quod egri obmutescant, sine sensu & motu concidant, imò nec apertis oculis videant, & ferè seu uspl. moviantur. Rumpuntur autem plerumqve sub ejusmodi concussionè vasa interiora sangvisiva cerebri, & tunc non mirum est, quod ex cruore extravasato nimio, imò putrefactio, circulus ejus turbetur, Spiritibus libera via præcludatur, ac maligna diathesis illis imprimatur, sicque tetra symptomata imò mors subsequatur; interdum tamen absque ruptis vasis, à solâ dislocatione quasi ac situ partium cerebri mutato funesta illa dramata insequuntur. Quâ ratione hæc contingant eleganter exposita vid. in Bobnii tr. de Renunc. p. 235. & seq. Inprimis pag. 246. & 251. docet, quod aliquando illa commotio cerebri cum lymphæ s. feri extravasatione ad interiora contingat & hinc eò magis lethalis concussio illa evadat.*

## §. III.

II. *Contrafissura Cranii est per se lethalis.* Vocatur aliàs Resonitum, s. Infortunium, quia hoc affecti infortunium habent, quod ipsi nesciant, quò loco sint læsi, nec Medicus aut Chirurgus eos certiores potest reddere, nisi jam res desperata sit. Describit autem Contrafissuram Cœsus noster de vuln. capit. IX. hòc modò: *Si os vulneratur aliò capitis locò, quam quo ulcus habet homo; quod infortunium ubi accidit, nullà re juvare valebis, non enim scire potes, ubi nam malum hereat, imò num eger vulneratus sit, aut quàmnam capitis parte; etiamsi maximè queras, haud certior fies.* Proferunt equidem nonnulli signa quædam ejusmodi lethalitatis, scil. quod locus mollior sit & tumeat in adversâ parte, Vid. Celsum lib. 8. c. 4 p. m. 516. vel quod eger manum admoveat parti fauciatæ, vid. Paræus l. 9. cap. 8. p. 280. Infida tamen esse ista signa & insufficientia, experientia testatur, nam sæpius lamina interna cranii finditur, illasâ externa, & hinc externè etiam nihil reperiri potest. Putant autem nonnulli, Resonitum saltem in parte oppositâ ipsius percussione fieri, sed experientia teste sæpius illè & in eadem vel vicinâ parte contingit, vid. Pareus lib. 9. c. 8. p. 280. Sculet. obs. 14. Hinc Bohnius de Renunciat. p. 195. ait: *Non in parte percussione semper oppositâ sed in vicinâ quoque, aliquando contrafissura sit, imò in eadem, non laminâ externâ sed internâ fissâ:* probat hoc etiam certo quòdam casu ibidem, quod idem facit Borellus obs. Cent. 2. obs. 20. p. m. 125. Infert autem mortem Contrafissura vel sanguine extravasato ex ruptis vasis, quæ etiam aliquando rupta conspiciuntur, & sanguinem largè fundunt, integrò planè cranio, vel fragmentis internè à cranio divullis, quæ aculeis suis ac mole membranæ & cerebro perniciem pariunt, & tamen nec explorare ritè, nec eximere festucas possumus.

## S. IV.

III. *Fracture insignes cranii cum fragmentis, membranæ cerebri aut ipsi cerebro infixis, vel cum magnâ depressione ac laceratione cerebri vel cum largâ effusione sanguinis, sunt per se lethales, si medela eis adhiberi nequit, i. e. si sanguis extravasatus ex illò loco educi vel festucæ eximi nequeant.* Hæc multis casibus, plerisque ex Ammanni Prax. Vuln. leth. desumptis in Valentini Pand. Med.

72  
*legalibus Part. 2. sect. 2. cas. 24. 25. 26. ad 31. reperibilibus demonstrari*  
possunt. IV. *Fissura* i. e. fracturæ minores, si capillares fuerint &  
cæcæ, i. e. adeo parvæ, ut oculis vix subjici queant, hinc indagari,  
omni operâ adhibitâ non possint, lethales per se veniunt renunciân-  
dæ; cum malum non sit evidens & Medicina hinc adhiberi ne-  
queat, præsertim si in futurarum aliquam inciderint fissuræ hæ & sic  
oculum fallant, *sec. Hippocr. de vuln. capit. XVI.* Fallunt mentem &  
visum Medici hæ futuræ, fissuræ speciem referentes & reliquò ossè  
asperiores existentes, nisi vehementer dissectæ fuerint ac dissolutæ.  
Modum fracturas & fissuras latentes mediante Cataplasmate detegendi  
vid. in *Borell. obs. Cent. 2. obs. 20. p. 124.*

S. V.

V. Vasorum sangviferorum in cerebro ruptiones ac dilace-  
rationes impr. plexus choroidei, ut & sinuum duræ matris vulnera-  
tiones insignem hæmorrhagiam inducentes, sunt per se lethales, vid.  
*Pandect. Valentin. part. 2. sect. 2. cas. 12. & 13.* Aut enim sanguis ille  
extravasatus in enormi copia pondere suo deprimit cerebrum, ac  
sæpius apoplexiam concitat, aut corrumpitur ac putrescit, & hinc  
sphacelosum reddens cerebrum, convulsiones ac deliria parit, & nisi  
tempestivè ac commodè educitur, mortis proxima causâ dici meretur.  
Præsertim sanguis in substantia cerebri, ejus plicis ac ventriculis, vel  
circâ cerebellum ac medullam oblongatam collectus, cum ad interio-  
ra hæc cerebri rejectus nullo instrumento, nullâ arte educi queat, ut  
immediata mortis causa, lethalitatem per se parit. Cum autem  
multi objiciant, quod mediante Trepano sanguis educi potuisset,  
hoc autem neglecto vulnus ex insigni hæmorrhagiâ per accidens lethale  
ob neglectam scil. curam sit censendum, optimus in hoc causarum  
genere interpres existit *Bohnus l. c. p. 206. & seqq.* quatuor modos  
inutilis applicationis Trepani proponens 1. si symptomatum gravitas  
& mortis celeritas obstet, 2. si extravasationis sanguinis signa suf-  
ficientia deficient, 3. si infra vel intra cerebri plicas ac concameratio-  
nes, vel intra cerebrum ac cerebellum, vel sub durâ matre suprâ piam  
hæreat & mox defluat. 4. Si sanguis duræ matri, licet immediate sub  
calvariâ tenacius agglutinetur. Ut mentio jam non fiat loci incongrui  
in



in cerebro, cui Trepanum commodè applicari nequit, e. g. anteriori cranii parti quæ superciliis propinquior, vel posteriori, ubi nervorum patria id prohibet.

§. VI.

VI. *Cerebri, imprimis Cerebelli substantiam penetrantia magna ac profunda vulnera*, cum non nisi cum magnâ vasorum sangviferorum dilaceratione ac nervulorum præcisione contingere queant, & sæpissimè commotionem sui nimiam comitem habeant, lethalitytem per se causantur. *Interdum & Exilitas vel parvitas, imprimis Profunditas vulneris*, quæ in causa sunt, ut sangvis extravasatus in apicum prodire non possit, efficiunt, ut mortaliter vulneratus sit dicendus interfectus. Quæ hic objici possent de curationibus cerebri prodigiosis, ubi ad Os basilare usque quidam fuerint vulnerati, hæ certè, ad miracula, & singularia DEI opera erunt referenda, non ad regulam ordinariam artis.

§. VII.

Ex priori paragrapho inter alia sequitur, si vulnera Cerebri tanta fuerint, ut partes ejus maximè internas tetigerint, imprimis *ex quibus surculi nervi prodeunt, & quæ nervorum patriam ac Spirituum officinam constituunt*, lethalitas absoluta læsionibus ejusmodi ascribenda veniat; *hinc corporis callosi, fornicis, corporum striatorum, Medullæ oblongatæ, Cerebelli vulnerationes per se sunt lethales.*

§. VIII.

VII. *Medulla spinali ut Cerebro prolongato ac continuato inflatum Vultus* lethalitytem per se talem infert, cum Spirituum habitacula nervi admodum ibidem diruantur, præsertim si vultus sit factum circa originem spinalis Medullæ; quamobrem venatores ad cervos jugulandos norunt *den Genick-Fang*; imò Boves facillimè necari possunt, si commissuræ cervicis, & quidem illius articuli, qui caput & collum committit, tenue ferrum immittatur, Sennertus Prax. L. V. Part. IV. cap. 3. p. 864. sicque opima eorum corpora exiguò concidere possunt vulnere. *In collum si altè à posteriori penetraverit*

*verit vulnus*, ut vertebræ ejus vel diflocentur, vel comminuantur, hinc nervi quoque lædantur, vel ab anteriori arteriæ Carotides vel Venæ jugulares incidantur, aut planè Oesophagus vel arteria aspera difsecetur, per se lethales evadunt vulnerationes *vid. Valent. Pand. part. 2. sect. 2. cas. 39. 40. 41. p. m. 347. & seqv.* In extremitate tamen spinalis Medullæ circa os sacrum tanta, experientiâ teste, non observatur lethalitas. Referendi hûc erunt nervi ex Cerebro, Cerebello & spinali medulla prodeuntes, quorum propagines majores læsæ ob cerebri consensum in lethales convulsiones conjiciunt sauciatos, dum nulla illis medela fieri, nec consui, nec sanari aut coadunari possunt, hinc symptomata ex disciliis eis vel alio modo insigniter lætis nullâ arte aut consilio compesci poterunt: e. g. inter costalium, paris vagi, phrenicorum nervorum læsiones organa vitalia, cor ac instrumenta pneumatica activitate suâ privant & actiones vitales inhibent, sicque lethaltatem per se causantur.

## §. IX.

Hæc modò dicta Casui nostro pag. 33. recensito si applicentur, lethaltatem absolutam eidem denegabunt; *non enim tanta cerebri commotio aut concussio ex plagis fuit facta, ut percussus confestim obmutuerit, sensu ac motu privatus conciderit, moxque demortuus fuerit*, quamvis enim in terram prostratus, sine motu ac sensu ferè in adjacentem domum deportatus fuerit, recuperavit tamen mox loquelam, ac integre absque imminutione judicii est locutus; Dein neque Contrahissura Cranii est reperta, neque fracturæ, fragmenta aut fissuræ tantæ fuerunt in cranio conspicuæ, ut medela iisdem adhiberi nequiverit; Vasorum sangviferorum ruptiones equidem, ac sanguinis extravasationem tantam, ut notabiliter depresserit cerebrum, adfuisse diximus, hinc summè periculosas vulnerationes istas, nominavimus, his tamen obvenire ac medelam præstare Chirurgus potuisset, si ipse Æger permisisset. Cerebelli insuper ac cerebri prolongati substantiæ intactæ ac illasæ sunt deprehensæ. Quamobrem rectè de casu nostro superius Disputationis primæ pag. 33. iudicavimus, quod summè periculosa quidem contusio illa fuerit, non tamen per se ac simpliciter lethalis, quam sententiam Amplissima Facultas Medica Regiomont: etiam confirmavit. Vide Responsum Ejusdem in fine hujus dissertationis sub signo ☩.

§. X.

§. X. **Quæstio II. Quænam Capitis vulnera per se lethalia non existunt?**

Resp. Superficialia & in Cortice quasi hærentia capitis vulnera, quibus medela parari & quo manus chirurgi devenire potest, pro lethalibus non sunt habenda, cum sæpius curata illa fuisse multijuga attestetur experientia. Quamobrem si exteriora integumenta capitis, ut Cutis vel musculi cuti substrati lædantur, læsio non per se lethalis exinde oritur, hinc Facultas Gissena ap. Valent. *Pand. Med. Leg. part. 2. sect. 2. cas. 1. p. 143.* respondit: *Internis capitis partibus planè illæsis, vulnus capitis, etsi satis longum, tamen non nisi cutem dividens mortem per se non infert*, quemadmodum ejusmodi vulnera sæpissimè inflicta & facillè rursus consolidata fuerunt. De Musculò tamen Temporum Crotaphite dictò erroneam ex Hippocrate sententiam quidam hauriunt, præf. nostrates Chirurghi, ejus dissectionem grandioremm lethalem existere sibi persuadentes, cum arteriâ & venâ quodammodò insigniori gaudeat; sed, cum pars sit, quæ oculis patet, hinc medela eidem etiam fieri, & hæmorrhagia, quam metuunt, compefcis potest, Imò ejus consolidationem non solum *Scultetus Armam. Chir. obs. 3. p. 105. Bohn, l. c. p. 178.* adstruunt: sed & in casu necessitatis manu chirurgicâ sectionem ejus inter alios *Bovellus Cent. 2. obs. 20. p. 124.* probat hisce: *Fissura magna in medio Crotaphite musculi apparuit, in quo D. le Juif contra tamen Doctrinam Authorum, sectionem instituit nulla fibrarum ratione habita, quod sæpius se illud feliciter fecisse asseveravit. &c.* Cattierius itidem incisionem temporalis musculi cum Euphoriâ factam *obs. 9. p. 39.* observat. Quamobrem Temporalis musculi læsio non per se lethalis censenda.

§. XI.

*Fracturas Cranii ejusque vulnera in se spectata non esse simpliciter lethalia; sive cœsim sive punctum sive contundendo, licet etiam cum sanguine extravasato sub cranio, vel inter utramque Meningem fiant, Responsis Facultatatum Valentinus l. cit. cas. 2 3. 4. 5. 6 probat, additur ratio, quia sanguis per trepanationem, incisionem, Venæ sectionem, aliaque chirurgica Remedia commodè educi potest; Bohn:*

etiam

etiam *l. c. p. 181* Calvaria fracturas haud per se lethales arguit. Nisi forsan aut Contractura aut Cæca & non perceptibilis rima in craniò lædens interiora adsit, vel ipse sanguis, qui educi debet, tenacissimè membranæ vel interiori cranii parti adhæreat. *Cranium etiam depressum* cum per vectes & elevatoria attolli ac restitui possit, licet etiam in fragmenta & festucas fuerit comminutum, cum festuca illa aliaque heterogenea vulnere adhuc in hærentia forcipibus aliisque instrumentis eximi ac removeri possunt, lethalityatem absolutam aut per se talem non infert, *ut cas. 7. & 8. apud Valent. l. c. p. m. 168. & 178.* demonstrant, idem censente *Bohnio l. c. p. 189.* Nisi forsan educi planè non possint heterogenea aut enormius lædant interiora, quod ex symptomatibus patet. Ipse *Plinius H. N. lib. II. c. 37 p. 169.* capitis ossa perfracta non possunt solidari, sed modicè exempta non sunt lethalia, ait.

## §. XII.

*Dura ac pia Matris Vulnerationes vel Dilacerationes* nisi sinus duræ Matris aut Processus falciformis unà perforati fuerint, aut in piâ matre contraruptura insignis orta, quæ secundùm Responsum *Lip-siensium sub cas. 14. Valent. p. m. 233.* lethalis existit, per se lethales non judicantur *sec. cas. 9. 10. & 11. Valentini, confer. etiam Boh. l. c. p. 198.* licèt *Plinius lib. II. c. 37.* Mortiferum esse, si alterutra membranarum cerebrum involventium rumpatur; cum Chirurgi periti duram matrem integram incidere ac aperire non vereantur, si sanguinem vel sanie[m] educere volunt.

## §. XIII.

Cerebri substantiam quæ penetrant vulnera, si corticalem faltem tetigerint, per accidens, si medullarem dissecaverint, per se lethalia habentur à plurimis, sed ut taceam, ipsam substantiam medullarem sæpius fuisse læsam, imò effluxisse eandem, & tamen vulnus feliciter fuisse curatum, læsumque inter vivos permanisse, dummodo manus satis perita accesserit, hinc licèt medullaris substantia dissecta fuerit, cum aliquali etiam deperditione ejus, dummodo ex symptomatum vehementiorum absentia dignoscatur, nec validam concussionem seu commotionem cerebri, nec functiones vitales ac animales interceptas aut validè læsas esse, non statim pro per se, sed  
per

per accidens lethaliſſimis, quibus Medicina & auxiliariſſima manu adhiberi poteſt, vulnerationes iſtae ſunt habendae. Excell. hinc Valentinus eodem ſere modo mentem ſuam exponit in *Pandect. Med. Leg. Parte Altera ſect. 2. p. 135. & 136. his verbis: Vulnera, quae non adeo profunde in medullam penetrant, ut in Caſ. 18. & 19. per accidens: Quae vero altius & in ventriculos uſq; deſcendant, ſimpliciter lethalia eſſe pronuntiant. Verum & haec ita ſimpliciter aſſeri non poſſunt, cum haud pauca praerudicia proſent, in quibus vulnera cerebri ſatis profunda, & in ventriculos anteriores penetrantia non tam pro vulneribus abſolute lethaliſſimis, quam per accidens talibus habitaverunt, ſive jam ex errore chirurgorum in Caſ. 20. ſive vitioſa vulneratorum Diarta, in caſ. 21. & 22. mortifera evaſerint, perinde eſt. Adeoq; hoc in loco non tantum ad vulnerum magnitudinem & profunditatem, ſed & partium vicinarum vaſorumq; leſionem, functionum animalium vitaliumq; interceptionem & ſimilia cum Sennerto reſpiciendum eſſe Celeberr. Bohnius in *Renunc. Vuln. leth. ſect. 2. cap. 1. p. 225. obſervat.**

## S. XIV.

Antequam pectoris vulnera diſpiciamus, quid de interſtitiis capitis & pectoris, ſeu Collis, ejuſque leſionibus ſentiendum, paucis erit notandum. Si collum, ſeu jugulum cum adjacentibus vaſis ſangviferis plane diſcindatur, ut in infantididiis ſaepius videre eſt, vel cui peſo pro capite, lethale ſimpliciter id exclamabit; aſt ſi tantum arteria aſpera incifa fuerit, non ſtatim id lethale eſſe, laryngotomia docet, ſub lethali angina prudenter adminiſtrata; imò vulnera aſperae arteriae plurima curata ex variis autoribus Bohnius p. 278. proponit. *Conf. Parvus l. 9. c. 29.* Notabile exemplum Laryngotomiae hic Regiomonti ante biennium habuimus, ubi ancilla quaedam alterius mulieris infantem aſtu ac blanditiis allectum enecare ac collum praerſcindere, in arce & quidem loco ab hominum frequentia remoto tentavit, inciderat etiam aſperam arteriam in ſuperiore parte, ut praeter vulnus ſatis magnum aer cum ſibilo erumperet, imò oſophagi aliqualis pars laesa eſſet: cum lac ſuctum ex vulnere interdum proſiliret, feliciter tamen Cura, cui ſaepius adſtiti, per Chirurgum Rackmanum, praerſentibus & aliis peracta fuit, ac parvula ad hunc uſque diem ſanavit, proprio exemplo incifionem aſperae arteriae

non lethalem per se esse docens. *Distinctione itaque opus est, si pars externa superior extra thoracem in Trachæâ aspera fuerit fauciata, curabilis est; si pars inferior in pectore abscondita plagam fuerit perpessa, omnis ars ac vis consolidationis cessat.* Par ferè ratio est in discissione Gulæ seu Oesophagi, si inferior pars læsa, quod absque læsione vasorum aliarumque partium insigni fieri nequit, nulla spes reconvalescentiæ; si superior pars non transversum, sed superficiarie fauciata, ob carneas fibras coalescere ac curari potest. De posteriori Colli parte, jam §. 8. mentem nostram exposuimus.

## §. XV.

## II. De Vulneribus Pectoris lethalibus.

Quæstio III. Quænam Pectoris Vulnera per se lethalia habentur?

Resp. 1. Quodsi pectus tantoperè vulneretur, ut musculis difficilis, vel costis diffractis planè dehiscat, & aër pectori inclusus quâ datâ portâ ruat, externus verò irruat, hic necessariò pulmones concidere faciet, hominemque respiratione & consequenter vitâ privabit, ejusmodi hinc læsio meritò per se lethalis erit habenda; quamobrem plurium costarum fractiones, cum illæ nec reponi nec restauratæ debitè contineri queant, sed modo dictum hiatum efficere possint, uti & musculorum pectoris intercostalium insignes percussiones, aëris externi insignem & violentam irruptionem permittentes, lethalitatis per se primi ac præcipui erunt Autores. *Confer. quæ celeb. Bobn. de Rennunc. Vuln. à p. 288. ad 296. docet hæc de re differit.*

## §. XVI.

2. Vasa pectoris sangvifera insigniora læsa, ut vena pulmonalis, arteria venosa aliàs dicta, arteria pulmonalis, Vena arteriosa nuncupata, Vena subelavia, Vena *axillaris* s. sine pari, Mammaria, aut majores & insigniores eorum vasorum Rami disseci vel pertusi, incompefibilem hæmorrhagiam, destructionem actionis organicæ pulmonum, adeò, ut ob continuum horum motum, sangvis aëris loco regurgitet, vel vasculis aërifera illabatur, suffocationem & letha-

non

tha-

thalitatem simpliciter vel per se talem secum vehunt. Multò magis absoluta lethali- tatis causa evadent insignes pertusiones vasorum sang- viferorum ex cordis auriculis prodeuntium , ut trunci ascenden- tis vel descendens arteria magna vel vena cava læsiones, hæc enim omnium vasorum tum maxima, tum Parentes eorum censentur, quæ iis sangvine prospiciunt, eumque iterum recipiunt in alveum suum; horum igitur pertusio impr. arteria magna, quæ pulsu suo conti- nuò, continuam sangvinis effusionem efficit, hincque perutilis succi usu hominem privat, vitam ejus cum morte mox permutabit.

s. XVII.

3. *Cordis Vulnera*, si substantiam ejus insigniùs læserint, vel ven- triculos penetraverint, vel Vasa coronaria dissecuerint, vel majora ex eo prodeuntia tetigerint, vitalium functio num officinam pever- tunt, vitamque cum purpureâ corporis animâ effundunt, hinc nun- quam non pro simpliciter lethalibus meritò sunt censenda. Rectè hinc Ovidius l. r. de Pont. eleg. 4.

Afferat ipse licet sacras Epidaurius herbas:

Sanabit nullâ vulnera cordis ope.

Cur tamen quidam post vulnera cordis non statim moriantur, vid- rationes in Bohn. loc. cit. p. 303. ad 306. *Involucri Cordis* seu Capsulæ, Pericardii dictæ, vulnera ab *Aquapendente equidem Chi- rurg. l. 2. c. 21, p. 356.* pro lethalibus ac desperatis habentur, cum in eò concursus tendinum, à musculosis fibris, texturam cordis con- stituentibus ortorum, observetur, hinc ob magnam sensibilitatem convulsionem, imò mortem efficiant. Verùm enim verò, cum teste Cardanò, Beniveniò, Sennertò, Sebiziò sapius felicissimè curata fuerint pericardii vulnera, imò planè absque ejus noxâ ablatum fue- rit, imò paucis venis, arteriis, & nervis sit præditum, pertusiones ejus neutiquam per se lethales habentur *sec. Casum 6. sect. 3. part. 2. pandell. Valent. p. m. 369.* Causas tamen vulnerum pericardii interdum lethaliū, vel continuitatem ejus cum parte tendineâ Diaphrag- matis, hincque respirationem turbatam; vel inflammationem ejus, vel aeris externi appulsū, cordi minus proportionatū *Bohn. l. c. p. 309.* enumerat.

L. 2.

s. XVIII.

4. *Spinae dorsii fractura aut luxatio*, adeo ut Medulla spinalis, in vertebra thoracis contenta, prorsus comprimatur, hinc Spiritibus animalibus via intercipiatur, aut si latius vel per transversum incidatur spinalis Medulla, imò si interdum ad summitatem ejus, Nucham versus, saltem pungatur, lethaliatem causantur per se talem. *Celsus hinc lib. 5. c. 26. p. 283.* Spinalis Medullæ vulnera insanabilibus accensuit, & ex quibus homo servari nequit. Quæ tamen de supremâ spinalis Medullæ parte læsa erunt intelligenda, ut in cervicis ac vicinioribus vertebra, ubi præsertim nervi phrenici ex 5<sup>to</sup> & 6<sup>to</sup> pari nervorum inter quartam & quintam cervicis vertebra procedentes, Diaphragmati inserviunt, vel ubi sextum par ventriculo ejusque plexui implantatur, consentientibus plurimis Medicorum *Galeno l. 4. de loc. affect. c. 3. Foresto lib. 6. obs. chirurg. c. 6. Sennert. lib. 5. prax. part. 4. c. 3. p. 864.* Inferius autem spinalis medulla si læsa fuerit, per se lethalis non existit. *Vid. cas. 9. p. m. 373. in Pandectis cit. Valent.* Benè tamen ruminanda erunt, quæ de Spina ad anteriora præsertim luxatione, item fracturâ ejus, rupturâ vasorum sanguiferorum, & medullæ vulneribus ejusque puncturâ *pag. 255. ad 266. Bohnius loc. cit.* in medium affert.

Quæstio IV. *Quanam Pectoris vulnera per se lethalia non censentur?*

Resp. Musculorum Pectoralium, costæ unius vel alterius ac externorum integumentorum pectoris vulnera, imò pulmonum læsiones, illæsis vas sanguiferis pluribus, vel majoribus, aut tracheæ ramis inferioribus; Plevræ, Mediastini, Pericardii, externæ partis superficialis Cordis, læsiones pro non seu per accidens lethalius habentur, cum curationes dictarum partium sapissimè observentur, & ad vitam simpliciter necessarium quid in iisdem non lædatur, & læsiones tales cum morte rarissimè sint conjunctæ; excipimus tamen modos læsionis, quos in præcedenti quæstione jam attulimus, ex quibus lethalitas & harum accessenda venit, illis autem absentibus per accidens saltem lethalia earum vulnera habentur, quanquam cum ærumnosa sæpius vitæ læsiones earum sint conjunctæ, c. g. ubi à læsione



sione pleuræ, mediastini, pulmonum, inflammationes, respirationes difficiles, diurnæ & ad mortem durantes tusses, phthisis etiam oriuntur ac lentam tandem mortem pedissequam habent.

s. XX.

### III. De Vulneribus lethalis abdominis.

Quæstio V. Quænam Abdominis Vulnera sunt per se lethalia?

Resp. *De singulis hic seorsim.* Inimi Ventris Patella seu quod Abdomen & Thoracem per medium ventrem separat, *Diaphragma est, seu septum transversum*; Hujus Galenus in Hippocr. 6. aph. 18. & 5. Meth. Med. c. 9. dicit: *Vulnera in carnosis partibus subinde coalescere sunt visa, ejus motu non obstante, quæ verò in nervosis ejus herent, insanabilia sunt*; alio tamen in locò idem Galenus Diaphragmatis etiam parte nervosâ semper non esse lethalia asseverat: Verùm enim verò in & circa partem nervosâ Diaphragmatis unanimitas Medicorum consensus vulnera per se lethalia enunciat, cum nervosus ille circulus læsus inflammationem, dolorem exquisitum, spasmum, convulsiones, ac funesta symptomata concitet, quorum finis est ultima linea rerum. In & circa partem carnosam autem Diaphragmatis vulnera multi pro periculosis quidem, non autem simpliciter lethalis habent. Quibus eatenus consentimus, quatenus læso fuerit partis carnosæ minor & exigua, indè apud *Diemerbræck. Anat. l. 2. c. 3. p. 366. Glandorp. Specul. Chirurg. obs. 27. p. 145.* eandem curatam reperimus: alit si magnum foramen in eo oboriatur, itidem ob inflammationem ejus subitanam, irruptionem aëris in pectus, suffocationis periculum, per se lethalis existit vulneratio, quanquam etiam non adeò citò mors obveniat, cum plerumq; in foramen aut hiatus factum vel ventriculus vel intestina se infinient, & suffocationem ac per consequens mortem ipsam retardent, sed remotis ac relapsis tandem illis, mors est præ foribus, qualis Domino à Görtz Generali Vigilum Præfecto in Obsidione Rheinfeßianâ sec. Valentinum obtigit. *Confer. Sennert. Prax. l. 2. part. 2. c. 8, Blancard. Anat. præct. obs. 1. Paræus lib. 9. c. 30. Bohm. p. 327.*

L 3

p. 327. l. c. utriusque inquit Diaphragmatis substantia vulnera per se lethalia sunt; quia nervæ semper & necessariæ, carneæ frequentius seu ut plurimum talia observantur. Externè interdum Hypochondria & imprimis Regio Epigastrica ex improvise percussur, ut Diaphragmatis concussio ac lethalis contusio oriatur, ob inhibitum à vehementi concussione motum ejus, ac concitatum spasmus compressivum, qui respirationem ac vitam ipsam intercipit; an tamen ex ejusmodi causâ illatam mortem poena ordinaria insequi debeat, dubitare fas erit, interim Astræ Ministris id relinquendum.

## §. XXI.

Hepatis, vesicula fellea, & Lienis Vulnera profunda, ob multa vel majora vasa lassa, nunquam non per se lethalia reperiuntur, Sennert. Prax. L. V. Part. IV. c. 3. p. 867. quibus accersenda sunt Vulnera Venæ Cavæ ac Arteriæ Magnæ, aut Ramorum ejus majorum, venarum it. emulgentium aliarumque, quarum trunci ac dissecatæ partes manu comprehendi nequeunt, aut hæmorrhagia earum externis adstringentibus compefci, hinc effluente maximo vitalitatis Nestare, vitam ipsam mox effluere debere, in propatulo est. Quamquam enim lienem eximi posse illasâ vitâ in cursoribus multi existiment, attamen præter hoc quod dubitem, an in homine id fieri queat, maximâ cum præcautione & vasorum sangviferorum deligatione sangvinisque artificiosâ inhibitione id fieri debet. Veritatem assertionis paragraphi hujus demonstrant Responsa Facult. Lips. ap. Amman. in Prax. Vuln. leth. decad 3. Hist. 1. p. 216. Hist. 10. p. 252. Decad. 5. hist. 4. p. 355. & ex eo Valentin. in Pandect. part. 2. p. m. 402. & sequ. Bohnius l. c. de Epatis vuln. leth. p. 364. & sequ. cur quidam ex Epatis plagâ evadant ibid. p. 370. de Lienis. p. 379. de folliculi fellis p. 373. de pori Epatici & cholodochi p. 377. agit.

## §. XXII.

Circa ventriculi vulnera contentionis adhuc serra reciprocatur, quænam ejus vulnera per se lethalia sint dicenda nec ne? Galenus, Marcellus, Donatus, Albucasa lib. 2. Meth. Med. c. 203. Christ. à Veiga in Comment. Aph. Hipp. 18. l. 6. Fallopius lib. de Vuln. c. 12. Schenck l. 3. obs. 122. Matthæus Cent. 6. quæst. Med. 21. allegante eos Beckhero

in

in *tr. de Cultriv. Pruss. quest. 8.* non lethalia enunciant, aut Hippocrates lib. 6. aph. 18. Celsus l. 5. c. 26. p. 283. Forest. l. 6. obs. Chirurg. 5. p. 11. *Valeioli* l. 3. *Enarr. Med.* p. 442. *Tagault. lib. 1. Inst. Chir.* 3. utique lethalia putant. Sæpius laudatus *Valentin.* libr. cit. p. 382. Ventriculi vulnera inquit ob insequentes vomitus & convulsiones nunquam non lethalia observantur, imprimis sclopetario ictu inflicta in *cas. 9. p. m. 411.* aliaque profundiora, ut è *cas. X. p. 413.* in utramque partem fusè ventilato haurire licet. Sed distinctione hæc opus erit, in superiori enim parte ventriculi, ubi plexus nervosus est, & circa orificia ut & in jugo inflicta vulnera symptomata pessima ac lethaliorem necessariam secum vehent. Fundo ejus illata læsio enormior itidem, cum cibi indigesti in cavum abdominis prolabantur, per se lethalis evadet; Aut si ad latera ventriculas fuerit læsus, dummodò non nimis enormiter, curari interdum poterit, & simpliciter lethalis enunciarì nequit. Hoc igitur in passu ceteræ circumstantiæ probè pensandæ erunt, quodsi tamen nec fauciatius, nec Chirurgus erroris in hoc genere læsionis ventriculi convinci potest, utique & lateralia vulnera ventriculi ut ut plurimum, hinc per se lethalia æstimanda, dum deligari aut balsamica illis applicari nequeant, cibum etiam transmittant, & gravia symptomata, vomitus, convulsiones excitent; quod autem ejusmodi ventriculi vulnera interdum sint curata, sex rationes præstantes affert *Bobnius l. c. p. 343.* hinc ab rarò vel interdum vel singulari naturæ beneficio curatis ad universale non valet consequentia, atque sic omnes ventriculi læsiones erunt per se lethales, nisi singularis circumstantia inhibuerit.

## S. XXIII.

*Tennium intestinorum* ad unum omnium lethales habentur perturbationes 1. cum chylosæ partes in nutrimentum corporis non distribui possint, sed in cavitatem abdominis, locum planè incongruum defluant ibique putrescant. 2. Ob præsentiam plurimum vasorum, sanguineorum, lacteorum, nerveorum, ob quorum facile corruptionem, inflammationem, gangrænam & sphacelum incurrunt. 3. Ob fibrarum carnearum circularium crispaturam, magnus in labiis vulnecum oritur hiatus. 4. Ob situm ac profunditatem intestino-  
rum

rum tenuium, undē ligari aut consui non possunt; *De crassis intestinis lēssis* dubitant plurimi, an per se lethales eorum lēssiones sint habendā, cum ob carneas fibras crassiores facile coire possint, nec tam profundē sint sita, imō sapius eorum curationes felicissime sint peracta, hinc & *Celsus l. 5. c. 26.* crassum consui ac sanari posse, hinc non lethale iudicat, imō *Facult. Medica Lips. referente Zittm. Medic. Forens. cent. 1. cas. 4.* respondit de vulneribus crassorum intestinorum: **Demnach in beschehener Verwundung uns nicht mehr benennet wird / als der durch und durch gestochene Mastdarm / so bezeugen nicht allein alte und neue beyderseits berühmte Scribenten der Arzeneu nebenst der Erfahrung / sondern auch die Vernunft selbst / quod in genere crassorum intestinorum vulnera minus periculosa sint (præcipue si non adeo magna) & saepe feliciter quoque curata fuerint, wie dergleichen Observationes Schenckius, Forestus, Hildanus, und andere glaubwürdige Autores mehr häufig colligiret haben.** So nun Intestinum Colon, oder der grosse Darm keine Lethalität so schlechterdings mit sich bringet / wie viel weniger wird das Intestinum rectum, quod intestinorum crassorum omnium est crassissimum & maximē carnosum, oder dessen Vulnera solches verursachen / und hindert auch nicht / daß der Unflath in hohlen Leib gegangen / alldieweil derselbe per debita subsidia hätte evacuiret / und also die Wunde geheylet werden mögen. Attamen & crassorum intestinorum vulnerationes si validæ ac insignes fuerint ob motum eorum continuum peristalticum, ob sensibilitatem, dolorem ac hæmorrhagiam, imprimis curandi adynamiam, fecum quoque clapsarum corruptionem ac putrefactionem æque lethales sunt dijudicandæ adstipulante clar. *Bohno l. c. p. 351.* rationes etiam cur è contrario quædam intestinorum plagæ salutares & non lethales *vid. ibid. p. 353. 355.* *Vulnera autem mediante globulo majori plumbeo aut plurimis granulis plumbeis è sclopeto seu bombardâ emissis periculosiora & eò citius lethalia erunt dijudicanda, non quidem ob adustionem imaginariam, sed ob impetum explosionis contentorum & dilacerationem partium laesarum.* Aliquando nobis obtigit inspectio pueri, qui obturamento chartaceo durissimo è sclopeto minori emissio mit einer Propff aus der Pistoh! interfectus erat, cuius vulnus intestinum Colon afficiens simpliciter lethale enunciamus. De vulnere

nere

nere intestinali globulo facto periculoso feliciter curato. vid. M. A. N. C. Decur. 2. anni 1. observat. XX. p. m. 45. De lethaliitate absoluta tenuium intestinorum vid. *cas. 14. 15. 16. & 17. part. 2. sect. 4. Pand. Valent.* De illethaliitate autem crasforum *cas. 11. 12. & 13. ibidem.*

## §. XXIV.

*De Renibus Celsus lib. 5. c. 26. dicit,* illum servari non posse, cui Renes vulnerati sunt, scil. si profundum ac latum fuerit vulnus in substantiâ carnosâ ad pelvim penetrans, vel vasa emulgentia pertusa, vel ipsi Ureteres discissi fuerint. Nam vel sanguinis profluvium nimium, vel serum urinosum ad cavum abdominis rejectum, vel alia funesta symptomata, ut Ichuria, inflammatio &c. vel conditio loci affecti commodam remediorum applicationem denegans causas lethaliitati tribuunt. *Vid. Bohm. p. 384.* Ast superficialis in parte carnosâ renum læsio non lethalis habetur.

## §. XXV.

*Vesica urinariae vulnus* in parte membranosa seu fundo per se lethale, in carnosa & collò minus tale censetur *jx. cas. 18. part. 2. sect. 4. p. 458. Pand. Valent.* Cum enim fundus Vesicæ sit membranaceus ac nerveus, non coalescit, sed inflammationem ac dolorem insignem gignit, de fundo itaque lethalitas vesicæ *jx. Hippocr. Galenum, Celsum imò Aristotelem* est intelligenda, quorum ultimus 3. hist. anal. c. 15. *nec vesica pertusa coire potest, nisi ad ipsum exordium sue cervicis.* Neque futurâ aut vinculis constringi potest, sed desluit ad abdomen urina. Collum autem carneum promptius consolidatur, dummodò non valdè sit contusum ac laceratum.

## §. XXVI.

Uteri læsiones, cum absque vasorum sangviferorum læsione insigni contingere nequeant, præsertim cum ille fœtum gestat, imò plerumque convulsiones ac tetra symptomata superveniant eisdem, lethales per se merito judicantur, licet vulgo

R. C. P.

M

uterus

uterus non simpliciter ad vitam, sed ad propagationem & conservationem sobolis saltem necessarius sit, ex ejus enim percussione, & matri & proli subtrahitur admodum eisdem necessarium Nectar vitale, imò si Uterus etiam extra vasorum majorum dilacerationes ictum experitur, ille *ix. Bohn. p. 395.* & Matri pariter & proli lethiferus, ex rationibus ibidem additis, existit.

§. XXVII.

Quæstio VI. Quænam abdominis vulnera non per se lethalia censentur?

Resp. Omnes minores, superficialiæ, & minus penetrantes, nec multa aut majora vasa sangvifera afficientes læsiones partium in abdomine contentarum illethales pronunciantur; Sic partis carnosæ Diaphragmatis minor & exigua percussio, hepatis & lienis superficialia ac minor læsio, *Senn. Prax. L V. P. IV. cap. 3. p. 367.* vasis majoribus vel plurimis illæsis, ventriculi partis mediæ parva pertusio, crassorum item intestinorum, partis carnosæ renuum ac colli vesicæ urinariæ non magna discissio, cum musculosæ illæ partes facillè iterum consolidari queant; Pancreatis demum & Mesenterii vulnera, nisi vasa sangvifera vel chylifera aut plexus nervosi in Mesenterio, hæmorrhagiam enormem, convulsionesque mortemque necessariò inferant; Omenti itidem discissio, cujus ex abdomine propensio ac refrigeratio sine periculo abscissionem svalet, pro non per se lethalius vulnerationibus meritò censentur, quibus & externarum Abdominis partium læsiones, illæsis vasibus ac visceribus intus contentis, jure meritò annumerare licet.

IV. De Vulneribus reliquarum corporis Partium?

§. XXVIII.

Quæstio VII. Ecquid tandem de Artuum, Vasorum it. Nervorum ac Tendinum læsionibus sentiendum?

Resp.

Resp. Detruncatio artuum ex. gr. Brachii aut Cruris, cum in sphacelo sæpe fieri opus sit, ac feliciter peragatur, imò & in bellò sæpius eveniat, si forti & violento modo ad adversario quopiam contingat, non per se lethalis est censenda; at si mori inde læsum obveniat, & nullâ arte compescibilis hæmorrhagia in causâ fuerit, utique per se lethalis censenda, sed si tempestivæ curationis omissioni mors ascribenda venit, per accidens lethalis facta erit læsio. Sic & vulnere externè artubus cæsim aut punctim inflicta, si hæmorrhagiæ eorum obviam ire licet ligaturis, stipticis aliisque, per se lethalia non habentur, ut in vulncribus cubitorum, femorum, surarum & Tibiarum Facultates Medicæ *sec. Cas. 3. 4. 5. 6. & 10. part. 2. Pand. Valent.* pronunciarunt. Altam autem Femoris vulnerationem cum læsione majorum ramorum venarum ac arteriarum, ob insignem mox hæmorrhagiam simpliciter lethalem factam *cas 7. & 8. ibid.* l. c. comprobat. Genuum tamen vulnere etiam minora ab concursum tendinum, præsertim si explosione sclopeti infligatur, ex facile accidenti sphacelo per se esse lethalia Lipsienses *cas. 9. libr. cit. deciderunt.* Contusiones autem, Plagæ, Flagellationes mediante scuticâ, aliæque externæ non adeo graves percussiones, vel pluribus membris illatæ, pro simpliciter lethali non habentur, censente hoc & *Pandect. cit. l. cas. 2. unde & Delinquentes seu Percussores, si forte fortunâ mortuus fuerit percussus, non ordinariâ sed mitiori solent affligi pœnâ sec. L. 1. §. Divus Hadrianus ff. ad leg. Cornel. de Sicar. cum animus occidendi non præsumatur in eis. Si autem flagellatio cum validò instrumento à robustò teneriori personæ contigerit, hæcquæ inde mortua fuerit, per se lethales erunt istæ plagæ, affirmante hoc Responso Facult. Gissenæ Anno 1698. d. 2. Decembr. vid. Valent. cit. l. p. m. 655. ad 660.*

§. XXIX. De lethalibus vasorum læsionibus jam superius sæpius mentionem injecimus, hic brevibus repetimus; eorum lethalitas à magnitudine vasis læsi vel situ ejus incongruò applican-

M 2

di remedium, vel effusione plurimâ nectaris vitalis dependet, hinc si venarum sanguiferarum maxime ut Vena Cava aut Arteria magna, vel Rami earum Majores it. Axillares, Carotides, Cervicales jugularis interna, Vertebrales, Pulmonales, Vasa brevia, Gastrica, Mesenterica, Portæ, Splenica, Emulgentes, Spermatica, Iliacæ, Crurales vulnerata fuerint, ita ut vel hæmorrhagia inde insignis, vel incompefcibilis, ob aditum præclusum & situationem absconditam exorta fuerit, læsiones ejusmodi pro lethalibus per se merito habentur. Exempla vid. in Valent. Pand. part. 2. sect. 6. p. m. 519. ad 544. De jugularibus externis nitiùs judicandum censet. Bohnius l. c. p. 272. Vasorum lymphaticorum læsiones, si unus aut alter eorum ramus lædatur, non statim lethalitatem important, cum exin nutritio quidem, non statim vita periclitetur, quodsi tamen truncus inter aortam & cavam ascendens, aut plurimi ramuli circa portæ sub hepate confinium fuerint læsi, eas utique lethales probat Bohnius l. c. p. m. 398. quod & cœnet p. 321. de ductu Thoracico, ejusque lethalitate.

## §. XXX.

De Nervorum dissectionibus lethalibus parum aut nihil equidem apud Autores reperimus, clariss. tamen Bohnius l. c. p. 160. plura nervorum vulnera, imprimis Paris Octavi, Phrenici, plexuum majorum in abdomine &c. rectè inter per se lethalia numerat, coalitionem enim eorum nemo perficere aut restitutionem procurare, multo minus futurâ eisdem opitulari aut inde provenientia pessima symptomata tollere potest; Conf. Bohnius p. 265. 266. Cum tamen vix fieri possit, quin sub nervorum adeò profundâ læsione & aliæ majores partes insigniter & ad lethalitatem læsæ fuerint, hinc cum vulneratio ipsorum nervorum adeò accuratè ob teneritudinem & tenuitatem eorum inquiri ac disquiri nequeat, lethalitas autem ex aliis partibus fauciatas satis appareat, hinc de his adeò raro mentio fit ab Anatomico inspiciente. Quod tamen Nervi incisi vel præcisi insignes dolores concitent, & gravia inferant symptomata, scil. convul-



vulSIONES ac spasmos, vel ex puncturâ nervi, imprudentis Chirurgi manu factâ, sub phlebotomiâ satis superque apparet; Vid. Novellas Clar. Valentini p. 654. 657. hic monendum, quod aliquando nervus planè discissus pro inciso vel puncto præter, hic enim intolerabilem dolorem, ille verò nullum ferè, interdum secum vchit, quod imprimis *Paræus lib. 2. c. 37. p. 323.* observavit

## §. XXXI.

*De Tendinibus*, cum nervosis fibris maximè consent, idem judicium ut de Nervis erit formandum. Hinc Contusionem Tendinum suprâ Genu, quæ tamen plumbeis granulis è sclopeto ejectis facta erat, Facult. Med. Lips. anno 1617. d. 1. Aug. lethalem pronunciat, simulque affirmat daß Die Experiens weist / daß oft durch eine geringe Wunde über dem Knie propter concursum tendinum plößlicher Todt erfolge referent *Amman. Medic. Critic. Cas. 8. p. m. 60.* Adducitur ibidem *Baubinus etiam in Theatr. Anat. de Muscul. Tibiæ* dicens: Læso tendine suprâ genu mors communiter sequitur, quanquam hæc in ipso Bauhino invenire nequiverimus. *Paræus l. 9. c. 17.* Contusionem Nervorum aut tendinum gangrænâ & spacelum, à quo sæpè mors, inferre dicit, præsertim propter Aponeuroses & tendines membrancas, articularum vulnera ut plurimum, lethalia enunciat

cap. 39. lib. 9. p. m. 325.

TANTUM.

Bols

**Wol-Ede/ Wolbenahmte und Wolweise/  
insonders Hochgeehrte Herren!**

**A**ls dieselbe zwey Attestata derer eines  
Hr. D. Emmerich, das andere Chirurgus  
N.N. gefertiget uns zugesandt / danebst  
in ihrem an uns gerichteten Schreiben  
zu wissen begehret: Ob der im vorigen  
Jahre/ den 20. Decembr. bey gehabtten Händeln mit  
einigen Brettchneidern umbs Leben gekommene  
Schuster-Gesell/ Niclas Buchholz/ nach Verwandtniß  
der erlittenen Schläge/ habe können curiret werden  
oder nicht? So berichten wir darauf; daß wir solche  
Frage Collegialiter, und mit Fleiß überleget/ und da  
wir aus denen uns zugeschickten Attestatis ersehen/ daß  
bey dem Verwundeten (1.) unterschiedene offenbahre  
Fissuren und aliqualis depressio in Cranio bemercket  
worden/ so daß eine Fissur ins os bregmatis, futuram co-  
ronalem querdurch/ wiewol nicht über die futuram co-  
ronalem, durchgegangen / zwey das os frontis lædiret  
und nach der futura coronali gegangen / und eine nach  
unten das os temporum beschädigt gehabt; (2.) Einige  
Löffel voll gerinnenes Blutes so wol über als unter  
dem Cranio sich gehäuffet gehabt / welches die duram  
matrem in jeho beschriebener Gegend des lædirten  
Cranii bedecket / und des cerebrum (3) sehr mercklich  
deprimiret gehabt/ von welchem auch meist ein Löffel  
voll inwendig in der Cavität des ossis temporum und  
Iphenoidis gelegen (4) ein schwarzes Blutkrünstiges  
stigma auf der linken Seiten/ oben auf der dura ma-  
tre,

tre, welches auch der cineritiæ parti cerebri communici-  
ret gewesen/ angetroffen worden. (5) Eine kleine Spi-  
tze des ossis sphenoidis, vom osse frontis (allwo sie per  
futuram combiniret werden) sich los gegeben gehabt.  
(6) Der Geschlagene bald nach empfangenen Schlä-  
gen/ zu zweymahlen sich gebrochen/ folgenden Tages  
auch etwa 24 Stunden nach empfangenen Schlägen/  
hefftig mit der Brust zu arbeiten und zu roecheln an-  
gefangen/ aphonos und epilepticus geworden/ und in  
stertore bis an seinen Todt verblieben/ welcher 30.  
Stunden nach empfangenen Schlägen darauf erfol-  
get: So können wir zwar nicht in Abrede seyn/ daß  
durch diese erlittene Schläge selbiger Schuster-Gesell  
sehr schwer und höchst gefährlich lædiret worden/ je-  
dennoch aber das allhier lethalitas absoluta, per se, &  
simpliciter talis, oder eine Verletzung/ die keine Cur zu-  
lässet/ und ganz incurabel zu halten/ gewesen/ können  
wir so schlecht hin auch nicht bejahen; angemerket  
Cranii fissuræ, fragmenta, fracturæ, festucæ, oder Split-  
ter mit trepanis, forcipibus und andern Instrumentis  
Chirurgicis, süglich heraus genommen/ die depressio-  
nes Cranii mit Elevatoriis und vectibus wieder aufge-  
hoben/ und das geronnene Blut über und unter dem  
Cranio, und auf denen meningibus durch fomenta, inci-  
sionem, venæ sectionem, Trepana &c. gar wol herauf-  
ser gebracht werden kan/ deswegen weitläufftig hier-  
von zu berichten/ ganz unnöthig zu sein erachtet wird;  
Gleiche Bewandnuß hat es auch mit dem in ventricu-  
lis cerebri gefundenen Liquore, und dem in dem Ohr-  
geronnenen Blut/ wenn solches/ der Chirurgus ansüh-  
ren wolte; Denn jener Liquor wol in statu naturali  
sein

sein kan/ und in dem gestorbenen Schuster-Gesellen/  
 ex temperamento bilioso sich kan gefunden haben; Die-  
 ses Blut aber in dem Ohr/ allen Anzeigungen nach/  
 nur eusserlich aus denen über der Calvariâ verletzten  
 vasis herabgeflossen; Die vornehmste Consideration  
 würde das meist einen Löffel voll/ inwendig in der  
 Cavitât des ossis temporum & sphenoidis gefundene  
 Blut erfordern: Allein auch dieses kan keine Lethali-  
 tât probiren/den solches durch eine verständige Cur wol  
 hätte herausser gebracht werden können/ und ist nie-  
 manden unter uns unwissend/wie in statu præternatu-  
 rali & morbosâ, die Natur wieder alles Vermuthen  
 und Wissen oftmahls ganz neue und unbekandte  
 Wege machet/durch welche sie die corruptam und præ-  
 ternaturalem materiam heraus führet/ und sich von sel-  
 biger befreyet. So gestalten Sachen nach/sein die  
 erlittene Schläge / bey diesem gestorbenen Schuster-  
 Gesellen wol nicht pro absolute & simpliciter lethali-  
 bus zu halten / dergestalt / daß er nicht hätte können  
 curiret werden. Zu diesem kömmt herzu / daß keines  
 von denen innerlichen Theilen bey dem Verstorbenen  
 vitios oder schadhafft befunden worden/ daherö augen-  
 scheinlich zu bemercken/ daß dieser Mensch gutter ge-  
 sunder Constitution gewesen sein muß/ welches zur  
 glücklichen Cur gar viel geholffen hätte / wenn solche  
 rempestivè mit gutem Verstande wäre angestellet  
 worden. Da aber selbtige fort von Anfang von dem  
 Patienten selbst recusiret/ und also verâmmet worden/  
 der Patient auch ohne einige Hülffs-Mittel/ ohn ver-  
 bunden/ und zwar in einer kalten Kammer bis auf den  
 andern Tag gelegen/ da bekant / wie die Kälte allen/  
 und

93

und insonderheit denen Hauptes Wunden höchst schädlich  
sey/ist offenbahr/ daß die Verwundung und das übele  
Tractament, grossen theils zum Tode dieses geschlagenen  
Menschen geholffen / und Ursach gegeben habe. Es  
möchte noch die Kürze der Zeit/ welche dieser Schuster-  
Gesell nach erlittenen Schlägen / gelebet/ einige Ge-  
dancken/ von der unumbgänglichen Lethalität erregen.  
Aber hiebey ist zu wissen/ daß ganze Facultäten in der-  
gleichen casibus decidiret / wie keine lethalitas absoluta  
hieraus zu adstruiren sey. Wie solches aus unterschiede-  
nen Casibus, so mit diesem Casu sehr genau überein-  
stimmen/ unter andern aus des Valentini Pandectis Me-  
dico-Legalibus Part. 2. pag. 157. & seqq. zur Gnüge zu  
erschen ist; Möchte also Chirurgus N. zu weit sein gegan-  
gen/ indem er wieder des Herrn D. Emmerichs/ als ei-  
nes erfahrenen glaubwürdigen Medici, und Professoris ge-  
gebenen Obduction-Zettel/ so zugleich von einem alten  
Chirurgo unterschrieben/ und von adstante Medico & Pro-  
fessore bekräftiget gewesen/ ein niedriges Attestatum zu  
extradiren/ und über der Lethalität zu raisonniren/ sich  
unterstanden / welches ihme doch/ wenn ein Medicus zur  
Obduction beruffen/ keinesweges zukommt: Man mag  
es seiner Uebercilung beymessen/ welche auch ohne Zweis-  
fel verursacht/ daß seine ausgegebene Attestata sehr  
schlechte Erfahrung in Anatomicis darthun/ und daß die  
zwey Attestata (eines vom 7. das andere vom 27. Janua-  
rii) gar nicht übereinstimmen/ indem in dem Letzteren  
unterschiedenes vom vorigen ausgelassen/ auch in unter-  
schiedenem contrair ist/ und widerspricht; in dem Let-  
ztern auch sind unterschiedene Sätze/ welche in der ana-  
tomischen Wissenschaft nicht toleriret werden können.

N

Miß-

Müssen demnach theils aus unser eigenen Erfahrung /  
 noch mehr / aus glaubwürdigen Historien / als auch aus Er-  
 fahrung der berühmtesten Medicorum und Chirurgorum,  
 wie auch aus gründlicher Wissenschaft der Anatomie,  
 welche wir nicht oben hin aus übel vertirten Lateinschen  
 oder Französichen Büchern / sondern aus häufigen Sectio-  
 nibus und Examinibus dessen / was von andern geschrieben /  
 erlernet / und in originali aus denen Autoribus angemer-  
 cket / bekräftigen / das dieser Schuster-Gesell Nielas  
 Buchholz / nach Bewandnis der erlittenen Schlä-  
 gen / hätte können curiret werden.

Dieses ist / was wir unseren Hochgeehrten Herren  
 auff dero Gesuch und vorgelegte Frage / wol gegründet  
 zur Antwort ertheilen wollen. Verbleiben dieselbe  
 Göttlicher Obhut treulich befehlend.

Unser ꝛ.

Königsberg den 20. Febr.

1706.

Dienstwillige

DECANUS, SENIOR, PROFESSORES  
 und DOCTORES der Medicinschen  
 Facultät Königsberg.

(ab extra)

Denen WolEdlen / Wolbenahmten und Wol-  
 weisen Herren / Herren Richtern und Schöp-  
 pen / der Königl. Stadt Löbenicht ꝛ.

Unsern insonders ꝛ.

(L. S.)

SS (o) SS

Königsberg, Diss., 1774/19

ULB Halle 3  
001 856 294




*St*









B.I.G.

Farbkarte #13

Sub Auspiciis summi Numinis 8  
DISSERTATIONUM MEDICARUM  
DE  
CONNUBIO ASTRÆÆ  
CUM APOLLINE,  
CIRCA MEDICINAM FORENSEM  
TERTIA. 1715  
VULNERIBUS  
LETHALIBUS,  
IN SPECIE,  
Von tödtlichen Wunden.  
Quam  
AMPLISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,  
IN ACADEMIA PATRIA  
Publico Eruditorum Examine submitunt  
PRÆSES  
GEORGIUS EMMERICH,  
Med. Doct. & Prof. Ord. Sec. Pro-Consul. it. Lœbnic.  
ac RESPONDENS  
CHRISTIANUS LUDOVICUS CHARISIUS,  
Reg. Boruff. Medic. Studiosus,  
IN AUDITORIO MAXIMO,  
Die August. Anni MDCCXV.  
REGIO MONTI, Typis REUSNERIANIS.

