



Ob.
221



A. Müller

06
221

CATALOGUE
DES ARBRES
A FRUITS

Les plus excellens, les plus rares
& les plus estimés qui se culti-
vent dans les Pépinières des
Révérends Peres CHARTREUX
de Paris.

*Avec la description tant des Arbres que
des Fruits, & le temps le plus ordinaire
de leur maturité.*

Il y a aussi différens autres Arbustes
& Plantes étrangères.



A PARIS,

De l'Imprimerie de PH.-D. PIERRES,
Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, &c.

M. DCC. LXXXV.

AVEC PERMISSION.


117 442



22
1818

CATALOGUE
DES
FRUITS

Les fruits exotiques, les fruits
de la zone tempérée et les fruits
de la zone boréale sont réunis
dans les pages suivantes.



De Halle
Le Directeur de l'Institut
L. D. C. L. X. V.
L'Imprimerie de la Mission





CATALOGUE
DES ARBRES
A FRUITS

Les plus excellens, les plus rares
& les plus estimés, qui se culti-
vent dans les Pépinières des
Révérends Peres CHARTREUX
de Paris.

PÊCHER. *PERSICA.*

LA fleur du Pêcher est formée de
cinq pétales disposés en roses, & insérés
par leurs onglets sur un calice d'une
seule piece en godet, découpé à moitié
en cinq segmens. On apperçoit au cen-
tre de la fleur l'embrion du fruit sur-
monté d'un pistil & entouré d'une tren-

taine d'étamines. Le calice tombe avant la maturité du fruit.

La Pêche est un fruit charnu, succulent, divisé suivant sa longueur par une gouttière, & renfermant un noyau gravé de sillons profonds, peu réguliers. Ce noyau contient une amande composée de deux lobes.

Aux environs de Paris, on ne cultive les Pêchers qu'en espaliers, pour les garantir, autant qu'il est possible, des gelées du Printemps.

Les terres douces, mais un peu sèches, leur conviennent singulièrement.

Il faut avoir beaucoup d'attention à tailler les Pêchers dans les temps convenables, sans quoi ils pousseroient quantité de gourmands, qui épuiseroient toute la sève, & feroient périr les branches à fruit.

Il faut remarquer que les Pêches ne viennent pas si grosses ni si bonnes sur les jeunes Pêchers, que sur de vieux arbres vigoureux.

Les Pêches sont de tous les fruits les plus exquis ; *ambrosios præbent succos.* Virg.

La plupart des Pêches ont la peau velue, quelques-unes l'ont très-lisse, & on appelle celles-ci Pêches violettes.

La plupart des Pêches quittent d'elles-mêmes le noyau ; c'est-à-dire , qu'en ouvrant ces Pêches à maturité , leur noyau se détache de lui-même de leur pulpe charnue ; quelques-unes ont le noyau constamment adhérent à la chair , quoique parfaitement mûres. On donne le nom de Pavies aux Pêches velues qui ne quittent point le noyau , & on donne le nom de Brugnons aux Pêches lisses qui ne quittent point le noyau.

On a rangé dans ce Catalogue les différentes sortes de Pêches , à peu près suivant l'ordre des saisons où elles mûrissent le plus communément.

On observe que le Teton-de Vénus , la Bourdine , la petite & grosse Violette , la Royale , & la Madeleine à petite fleur , sont les especes de Pêchers qui réussissent le mieux en plein vent. La Pêche de Malthe , la Pêche Cerise , tous les Pavies , la Transparente ronde , la Belle-Beauce , la grosse-Mignonne , la Rosane , la Chevreuse hâtive , la Pouprée hâtive , & la Sanguinole y viennent également bien ; mais les printemps froids , leur sont contraires , font manquer le fruit & périr l'arbre.

P Ê C H E S.

Au commencement de Juillet.

L'Avant-Pêche blanche est petite ; longuette , ne prend point de rouge ; elle est un peu musquée , & l'eau en est très-sucrée ; elle est estimée à cause de sa primeur : elle se mange au commencement de Juillet. Ce Pêcher fleurit à grandes fleurs ; ses feuilles sont dentées.

A la fin de Juillet.

L'Avant-Pêche de Troyes , ou Avant-Pêche rouge , est plus grosse que l'Avant-Pêche blanche ; elle est un peu ronde ; elle est rouge comme le vermillon ; son goût est relevé & musqué : elle mûrit à la fin de Juillet , & fleurit à grandes fleurs.

La Double de Troyes , ou Petite-Mignonne , est de moyenne grosseur , assez ronde ; elle prend beaucoup de rouge ; elle a le goût relevé , pareil à celui de l'Avant-Pêche de Troyes ; sa maturité est à la fin de Juillet & au commencement d'Août : elle fleurit à petites fleurs.

Au commencement d'Août.

L'Alberge jaune ou la Rouffanne, a la chair jaune; elle est d'une médiocre grosseur, un peu plus longue que ronde, d'un goût excellent, quand on la laisse mûrir parfaitement; elle prend assez de couleur: elle se mange au commencement d'Août; elle fleurit à petites fleurs.

La Madeleine blanche est ronde; d'une bonne grosseur; elle ne prend presque point de rouge; son noyau est petit; son eau est sucrée & vineuse; elle fleurit à grandes fleurs; elle a ses feuilles dentées: son bois a toujours la moëlle noirâtre.

La Pourprée hâtive est grosse, ronde, d'un beau rouge; son goût est très-fin & délicieux; c'est une excellente Pêche; elle fleurit à grandes fleurs.

A la mi-Août.

La Grosse-Mignonne est un peu plus longue que ronde; elle a ordinairement un côté plus élevé que l'autre; elle est d'une belle couleur, son eau est très-sucrée; c'est une des meilleures Pêches: elle a le noyau assez petit, se mange à

la mi-Août, & fleurit à grandes fleurs.

La Chevreuse hâtive, ou Belle-Chevreuse, est d'une bonne grosseur, plus longue que ronde; elle prend un rouge vif; elle a l'eau douce & sucrée: l'arbre fleurit à petites fleurs & charge beaucoup.

A la fin d'Août.

La véritable Madeleine rouge, ou Madeleine de Courson, est grosse, assez ronde, d'un beau rouge; son eau est sucrée & relevée; c'est une excellente Pêche; sa maturité est à la fin d'Août: elle fleurit à grandes fleurs; ses feuilles sont dentées profondément.

Le Pavie-Blanc, ou Pavie-Madeleine, est ainsi nommé à raison de sa ressemblance à la Madeleine blanche, par son fruit, ses fleurs & ses feuilles. Il ne quitte point le noyau; il a cela de commun avec tous les Pavies & les Brugnons.

La Pêche de Malthe ressemble beaucoup aux Madeleines, par son fruit, ses fleurs & ses feuilles; elle prend assez de rouge: elle est très-estimée en Normandie.

La Chanceliere ressemble beaucoup

à la belle Chevreuse pour sa grosseur ; sa couleur & son goût ; elle est un peu plus ronde , sa peau est très-fine ; elle se mange à la fin d'Août & au commencement de Septembre : elle fleurit à petites fleurs.

La Pêche cerise est petite , ronde , d'une couleur blanche , claire , & d'un rouge vif du côté du Soleil ; sa peau est lisse , sans poils ; sa chair est un peu sèche : elle fleurit à petites fleurs.

La Belle-Garde , ou Galande , ou Belle-Tillemond , est une Pêche fort grosse , assez ronde , d'un rouge très-foncé , tirant sur le pourpre ; sa chair est très-fine & sucrée ; c'est une des plus excellentes Pêches : elle fleurit à petites fleurs. Elle n'est pas encore fort commune.

La Madeleine à petite fleur ressemble à la Galande , ne lui cède en rien en bonté ; mais est plus petite , & charge beaucoup.

La Cardinale-Furstemberg est très-grosse , brune en dehors , rouge en dedans , remplie de jus , petit noyau , petites fleurs.

La Transparente ronde est rouge d'un côté , a la chair ferme , très-délicate ; elle fleurit à grandes fleurs.

La Vineuse de Fromentin est très-grosse; d'un rouge brun, plus longue que ronde; elle fleurit à grandes fleurs, ses fleurs ne sont point sujettes au mauvais vent.

Au commencement de Septembre.

La Petite-Violette hâtive est lisse, de moyenne grosseur, assez ronde; sa couleur est d'un beau violet du côté du Soleil; sa chair est très-fondante & très-vineuse; elle fleurit à petites fleurs: elle mûrit au commencement de Septembre.

La Grosse-Violette hâtive est tout-à-fait semblable à la moyenne par ses fleurs & sa couleur; elle est une fois plus grosse: c'est une bonne Pêche; elle est aussi fondante, mais pas si vineuse.

La Bourdine est d'une bonne grosseur, assez ronde, d'un beau rouge; elle est vineuse, & estimée pour une excellente Pêche: l'arbre en plein vent charge beaucoup, & fleurit à petites fleurs.

L'Admirable ou la Belle de Vitry, est grosse & ronde, prend assez de rouge; sa chair est délicate, l'eau en

est sucrée ; elle est très-estimée : elle fleurit à petites fleurs.

En Septembre.

Le Brugnon violet, musqué, est lisse ; il ressemble par sa figure à la Grosse-Violette hâtive, mais il est un peu plus rond ; il ne quitte pas le noyau ; il devient excellent quand on le laisse mûrir jusqu'à ce qu'il se détache de l'arbre : il se mange en Septembre ; il fleurit à grandes fleurs.

L'Incomparable en beauté est très-grosse, ferme ; son eau vineuse ; elle est élevée de noyau, & fleurit à grandes fleurs.

La Belle-Bauce, excellente Pêche, est d'un beau rouge écarlate ; fleurit à grandes fleurs.

A la fin de Septembre.

La Pêche Teint-doux est grosse, assez ronde, prend un rouge tendre ; son eau est délicate ; elle se mange à la fin de Septembre ; elle fleurit à petites fleurs, & n'est pas fort connue.

Le Teton-de-Vénus, (ainsi nommée, parce qu'elle est terminée par

une tête plus longue & plus grosse qu'aucune autre Pêche,) ressemble beaucoup à l'Admirable; elle n'est pas si grosse ni si ronde; sa chair est excellente: elle fleurit à petites fleurs.

La Chevreuse tardive, qu'on appelle aussi Pourprée, est grosse, & plus longue que ronde: elle prend un très-beau rouge, ce qui la fait nommer Pourprée; son eau & sa chair sont excellentes: elle fleurit à petites-fleurs.

La Nivette véritable est d'une belle grosseur, un peu plus longue que ronde, prend du rouge; elle a le noyau petit; son goût est relevé, son eau est sucrée; c'est une des meilleurs Pêches: elle fleurit à petites fleurs.

La Royale est grosse, ronde, prend beaucoup de rouge; elle ressemble beaucoup à l'Admirable, mais elle est plus tardive; son goût est relevé, & son eau sucrée: elle fleurit à petites fleurs.

La Monfrin est une Pêche lisse, jaune en dedans, chair ferme, ayant peu d'eau, très-sucrée; elle fleurit à grandes fleurs.

La Pourprée tardive est grosse, ronde, prend un beau rouge, le noyau est assez petit, le rouge est relevé, l'eau douce, la fleur est petite, le bois

gros, la feuille très-grande, mal unie.

La Persique est très-grosse, plus longue que ronde, d'un beau rouge; elle a de petites bosses & un morceau de chair à la queue; elle est d'un goût délicat; elle vient moins grosse sur les jeunes arbres. La plupart des Jardiniers la confondent avec la Nivette. Ce Pêcher charge beaucoup, fait un bel arbre très-vigoureux, & fleurit à petites fleurs.

Le Pavie rouge de Pomponne, ou monstrueux, est rond, d'un rouge incarnat; il ne quitte pas le noyau qu'il est assez petit pour la grosseur de son fruit, qui est ordinairement de quatorze pouces de circonférence; son goût est musqué, son eau sucrée: il fleurit à grandes fleurs.

Le Pavie Sainte-Catherine est d'un beau velouté, & d'un beau rouge & incarnat: il nous a été envoyé d'Angleterre sous le nom de Belle-Catherine.

Au commencement d'Octobre.

La Violette tardive, ou Marbrée, est de moyenne grosseur, un peu plus longue que ronde; elle est bonne dans les Automnes chaudes & sèches, & se

mange au commencement d'Octobre :
elle fleurit à petites fleurs.

A la mi-Octobre.

L'Abricotée, ou Admirable jaune, a la figure de l'Admirable ordinaire, pour sa grosseur & son rouge; sa chair est comme celle de l'Abricot; son goût est estimé; c'est une bonne Pêche pour sa saison: elle se mange à la mi-Octobre, & fleurit à grandes fleurs.

La Pêche de Pau est assez ronde assez grosse, prend du rouge; son noyau est sujet à se fendre; elle mange en Octobre, & est assez bonne pour sa saison: elle fleurit à petites fleurs.

La Sanguinole, ou Betterave, Cardinale, a la chair toute rouge; elle est excellente en compote seulement.

Le Pavie de Nevington.

AMANDIER. *AMYGDALUS*

La description que nous avons donnée des fleurs du Pêcher, est applicable en tous les points aux fleurs de l'Amandier. Les Botanistes ne peuvent plus que les Jardiniers, distinguer

les fleurs de ces divers arbres que par la couleur ou la grandeur, qui sont des attributs sujets à beaucoup de variations.

Le fruit de l'Amandier n'est pas charnu & succulent comme la Pêche, il n'est que coriace; son noyau n'est, pour ainsi dire, que pointillé, ou troué, ou rongé, & non pas fillonné si profondément que celui de la Pêche.

L'affinité entre ces deux espèces d'arbres est si grande, qu'il y a une race particulière, qu'on appelle *Pêche-Amande*, qui semble indécise entre les deux, tant son fruit a peu de chair. Cette race provient vraisemblablement de la fécondation d'un Amandier par un Pêcher voisin.

L'Amandier demande un terrain chaud & léger. Aux environs de Paris, les Amandes parviennent rarement à une parfaite maturité; mais elles sont excellentes à manger vertes.

A M A N D E S.

La grosse Amande.

La petite Amande.

L'Amande amère.

L'Amande à coque tendre. Celle-ci est la plus recherchée.

ABRICOTIER. *ARMENIACA.*

La fleur de l'Abricotier est formée de cinq pétales, disposés en rose, & inférés par leurs onglets sur un calice d'une seule piece en tuyau court, découpé à moitié en cinq segmens. On apperçoit au centre de la fleur l'embriou du fruit, surmonté d'un pistil, & entouré au moins d'une vingtaine d'étamines. Le calice tombe avant la maturité du fruit.

L'Abricot est un fruit charnu, succulent, divisé suivant sa longueur par une gouttiere, & renfermant un noyau, qui contient une amande composée de deux lobes.

L'Abricot a ordinairement la peau couverte d'un peu de duvet; sa queue est assez grosse & très-courte.

Aux environs de Paris, on élève les Abricotiers en espalier dans les jardins grands, & fort découverts; mais on les élève en buisson, ou en plein-vent, dans les jardins petits & bien abrités, & le fruit en est meilleur.

L'Abricot est bon à manger crud, & encore meilleur en compote ou en confiture; le sucre dans lequel il se confit en relève beaucoup le parfum.

ABRICOTS.

A B R I C O T S.

L'Abricot hâtif, musqué, autrement l'Abricot précoce, est petit, rond, prend beaucoup de rouge, est estimé pour sa primeur; il a les feuilles larges, dentées & d'un beau verd.

Le Gros-Abricot ordinaire est assez connu sans le décrire; c'est le meilleur de tous: sa beauté & sa grosseur dépendent du bon fonds, & du sujet sur lequel on le greffe.

L'Abricot d'Angoumois est d'une moyenne grosseur; plus long que rond; il est plus coloré que les Abricots ordinaires; sa chair est plus rouge, fondante & vineuse; il a l'amande douce comme une aveline; son bois & ses feuilles sont particulières; il n'est pas commun.

L'Abricot de Portugal.

L'Abricot de Nancy, ou Abricot-Pêche.

L'Abricot d'Hollande, ou Amande-Aveline, ressemble à l'Abricot de Provence, & ne font qu'une même espece.

L'Abricot panaché est une espece de gros Abricot, dont la feuille est panachée, & le bois également.

B

L'Abricot noir est d'une moyenne grosseur, d'un rouge foncé, il charge beaucoup, mais il est d'une médiocre qualité.

L'Albergier de Mongamet est plus gros que celui de Tours, & d'un goût très-relevé.

Il y a plusieurs autres sortes d'Abricots, qui sont presque autant de variétés qu'on sème de noyaux.

PRUNIER. PRUNUS.

La description des fleurs de l'Abricotier convient tout-à fait aux fleurs du Prunier.

La Prune a la superficie plus lisse que l'Abricot. Elle a aussi la queue plus menue & plus longue à proportion. Au reste, il n'y a pas entre ces deux especes de différences bien essentielles; & même à l'égard du goût, la Prune ne differe gueres plus de l'Abricot, que deux diverses Prunes ne different entr'elles.

Le Prunier s'accommode assez de toutes sortes de terrains.

P R U N E S.

La Jeune hâtive, ou Prune de Ca-

talogne, est petite, languette; l'eau est douce; elle est estimée à cause de sa primeur; elle mûrit au commencement de Juillet: on la met en espalier au midi.

Le gros Damas de Tours est de moyenne grosseur, assez rond, d'un beau violet; sa chair jaune, quitte le noyau; il est estimé par sa bonté: il est hâtif.

Le Perdrigon hâtif.

La Prune de Monsieur est grosse, ronde, violette, quitte le noyau; elle est assez bonne dans les terres légères & chaudes.

La Royale de Tours est une grosse Prune, de bon goût & des meilleures, qui ressemble beaucoup à celle de Monsieur pour sa grosseur; elle est d'un rouge clair, & a la queue longue.

La Mirabelle est petite, ronde, de couleur d'ambre lorsqu'elle est mûre; elle quitte le noyau; elle est bien sucrée: c'est une excellente Prune en confiture.

Le Damas violet est longuet, très-sucré, quitte bien le noyau; c'est une bonne Prune.

La Diaprée violette est languette, & très-fleurie, quitte le noyau; elle passe pour une bonne Prune.

Les Damas rouges & blancs sont ronds, quittent le noyau, sont très-sucrés & estimés.

Le Damas de Maugeron est violet, gros, rond, quitte le noyau; il est très-bon & estimé.

Le Damas d'Espagne est violet, plus long que rond; il est fort fleuri, gros & s'ouvrant net; il n'est pas si relevé que les autres Damas, mais il est admirable pour sa beauté & sa facilité à rapporter.

Le Damas d'Italie est une Prune ronde, d'un violet brun; elle est très-fleurie; elle a l'eau sucrée, quitte le noyau; c'est une des bonnes Prunes.

L'Impériale violette est grosse, longue, très-fleurie, de la figure d'un œuf de Poule; son eau est très-relevée & sucrée; elle est estimée.

Le Damas musqué est petit & plat, bien fleuri; il est musqué, & quitte le noyau.

Le Perdrigon violet est une Prune plus longue que ronde, d'un beau violet; elle est d'un goût fort relevé; elle est aussi estimée crue que confite; elle ne quitte pas le noyau.

Le Perdrigon blanc est de même figure & grosseur que le violet; il quitte

le noyau ; il est aussi excellent crud que confit.

La Royale est grosse , ronde , d'un rouge clair ; elle est bien fleurie ; elle a un goût fort relevé , semblable au Perdrigon.

Le Drap-d'Or est une espece de Damas , petit , rond ; sa peau est jaune , marquetée de rouge ; il est d'un goût très-fin & sucré : c'est une bonne Prune.

La Grosse Reine-Claude , ou Dauphine , ou Damas verd , appelée à Tours l'Abricot verd ; à Rouen , la Verte-Bonne , est grosse , assez ronde ; elle est verte & prend un peu de rouge au soleil ; son eau est très-sucrée & abondante , & c'est une des plus excellentes Prunes ; elle ne quitte point le noyau ; son bois est gros & lisse , de couleur brune , & a de gros yeux ; ses feuilles sont larges , d'un verd foncé.

La Petite Reine-Claude est blanche , ronde , plus petite que la Dauphine , quitte le noyau ; elle est un peu sèche , son eau est très-sucrée , sa chair est ferme , son bois est plus menu , verdâtre & couvert d'un petit duvet , ses feuilles d'un verd luisant. Le fruit , le bois & les feuilles de ces deux Prunes sont très-différens , néanmoins on

confond souvent l'une avec l'autre.

La Prune Virginale est une Prune blanche, qui ressemble à l'Abricotée, bonne à manger, est excellente en pruneaux, charge beaucoup & mûrit à la fin d'Août.

L'Abricotée est une Prune blanche d'un côté, & un peu rouge de l'autre, elle est plus longue que ronde, d'une bonne grosseur; elle quitte le noyau: elle est très-estimée.

L'Abricotée rouge est assez semblable à l'Impériale, mais plus en cœur; elle a le goût d'Abricots, & qui s'ouvre très-bien: c'est une bonne Prune.

Il y a une Prune qu'on nomme la Prune d'Abricots, qui a la chair comme l'Abricot; elle est plus sèche que l'Abricotée.

La Sainte-Catherine est blanche, plus longue que ronde, prend la couleur d'ambre, son eau est très-sucrée; elle est excellente crue & en confiture.

La Prune-Cerise, ou Myrobalan.

La Grosse-luisante, ou Dame-Aubert, est une Prune de la figure d'un œuf d'oye, & aussi grosse; elle ne quitte pas le noyau, & n'est pas bien bonne.

L'Impératrice, que l'on nomme en

Flandre, Prune de Princesse & d'Altesse, est petite, languette, d'un beau violet, a la chair jaune, très-tardive; on en mange encore en Novembre; elle est fort bonne pour une Prune de cette saison; elle n'est pas fort connue.

L'Isleverte est une Prune d'une bonne grosseur; elle est très-longue, assez mal-faite, mais bonne pour les confitures.

La Roche-Corbon est une Prune fort grosse, d'un rouge vif & clair; elle ne quitte pas le noyau; elle est excellente au four.

L'Impératrice blanche est une Prune de la même grosseur que la Violette; elle est plus ronde; elle est excellente au four.

La Reine-Claude violette ressemble beaucoup à la blanche par ses feuilles & son bois, est plus allongée; sa chair est verdâtre, son eau sucrée & très-agréable, & charge beaucoup: elle se mange à la mi-Septembre.

La Prune - Suisse est grosse & semblable à celle de Monsieur; elle ne quitte pas le noyau; elle se mange jusqu'à la fin de Septembre.

Le Perdrigon rouge est une Prune qui ressemble aux autres Perdrigons,

mais plus grosse, d'un très-beau rouge ; elle s'ouvre net , charge bien ; elle est excellente & tardive.

Le Damas de Septembre, Prune de Vacance ou de Retenue , est violette , un peu languette , quitte le noyau ; elle mûrit après les autres ; c'est son principal mérite : elle charge beaucoup.

La Bricette est une Prune blanche , qui est un peu plus grosse & plus longue que la Mirabelle ; elle se mange encore à la Toussaint , & est bonne pour la saison.

La Prune Saint-Martin est semblable au gros Damas de Tours , d'un beau violet ; elle n'est pas bien bonne.

La Bonne , deux fois l'an.

CERISIER. *CERASUS.*

La description des fleurs de l'Abricotier ne convient pas moins au Cerisier qu'au Prunier.

La Cerise est généralement plus petite que la Prune & l'Abricot , & a la queue plus grêle & proportionnellement plus longue ; le noyau sur-tout est plus ovale , plus lisse & plus mince.

Les Cerisiers dans un terrain gras trop

sont sujets à des épanchemens de sucsgommeux si abondans, qu'ils les rendent souvent très-malades, & peuvent même les faire périr tout-à-fait.

C E R I S E S.

La Cerise Précocce est petite, très-rouge, la chair a un peu d'acide; elle est néanmoins fort estimée par sa primeur; elle mûrit au commencement de Juin: il faut la mettre en espalier au midi.

La Cerise à courte-queue, ou de Montmorency, est grosse, ronde, d'un goût excellent; le bois est menu; les feuilles petites: il charge par bouquets.

La Courte-queue de Provence est grosse comme celle de Montmorency, mais moins douce.

La Montmorency à longue-queue est une belle Cerise, d'un beau rouge, d'une eau relevée, & charge beaucoup.

La Grosse - Cerise est ronde, très-rouge, l'eau douce; c'est une bonne Cerise; le bois est gros & les feuilles larges; l'arbre charge médiocrement.

La Griotte est une espee de Cerise, grosse, noire, fort douce; le bois gros, la feuille large & d'un verd foncé,

La Cerise Royale ancienne est grosse; assez ronde, d'un rouge noir; l'eau est douce, sans acide: c'est une excellente Cerise; elle n'est pas commune; les Anglais la nomment *Cherry-Duke*: son bois est assez gros, sa feuille large & fort dentée.

La Cerise Royale, ou la Nouvelle d'Angleterre, est une grosse Cerise, plus grosse que la Griotte, qui a la queue très-longue & la feuille très-large; l'espece en est excellente.

La Grosse-Cerise de M. le Comte de Sainte-Maure, appelée la Griotte de Chaux, est très-grosse & supérieure aux autres Cerises pour sa grosseur & sa bonté, & ressemble beaucoup aux Guindoux.

La Belle de Choisy est une très-grosse Cerise à longue-queue, d'un beau rouge, & très-bonne.

La Cerise de Varenne est très-douce, bonne, tardive & à longue-queue.

Le Guindoux d'Angoumois est une très-grosse & excellente Cerise noire.

La Cerise Blanche est plus longue que ronde, de couleur ambrée, son eau est douce & sucrée; ses feuilles ressemblent à celles du Guignier.

Le Bigareau est plus long que rond,

ic d'un côté & rouge de l'autre; il
 chair ferme & sucrée; le gros est
 meilleur.

le Cœuret, ou Cœur-de-Pigeon,
 ce de Bigareau, plus tendre, fait
 cœur, dont le goût est relevé; son
 est plus gros, & sa feuille plus

a Cerise-Morel.

a Grosse-Guigne.

Cerise tardive, ou de la Touf-
 qui fleurit toujours en poussant,
 porte qu'il y a des fleurs, du fruit
 du fruit verd & du mûr; il y en
 qu'aux gelées.

POIRIER. PYRUS.

Le fleur du Poirier est formée de
 pétales disposés en rose & insérés
 leurs onglets sur un calice d'une
 piece, en godet découpé en cinq
 dents. L'embrion est situé à la base
 du calice, sous la fleur, & surmonté
 de cinq stiles, entourés d'une vingtaine
 de mines. Le calice subsiste jusqu'à la
 maturité du fruit.

La Poire est un fruit charnu, suc-
 ré, terminé par une ombilic en
 forme de couronne, provenant des

segments du calice. Le centre de la Poire est partagé en cinq loges, dont les parois sont cartilagineuses, & renferment chacune deux pepins plats. La Poire a ordinairement une forme approchante d'une toupie, ou d'un cône.

POIRES D'ÉTÉ.

Le Petit-Muscat, ou Sept-en-Ciel, est petit, rond; il a l'odeur de nectar & le goût très-relevé; il est fort estimé à cause de sa primeur; il est demi-mûr à sa maturité est au commencement de Juillet: il vient par bouquets.

L'Aurate est presque aussi hâtive que le Petit-Muscat; elle est fix ou sepe plus grosse; elle prend du rouge sur le côté du Soleil: c'est une très-bonne Poire.

L'Amiré-Joannet, ou la Poire de Jean, est une Poire plus longue que ronde; elle prend peu de rouge; son eau est fort douce & sucrée; elle est très-bonne pour une des premières Fruits.

La Poire de Madeleine, ou celle des Carmes, est de moyenne grosseur un peu plus longue que ronde, d'un blanc jaunâtre; son eau est douce,

anne, mais elle est sujette à cotonner ;
mi-fondante : elle mûrit ensuite de
Aurate.

La Poire à deux têtes est ronde, ver-
dâtre & cassante, a beaucoup d'eau &
& douceur, se garde, & mûrit hors de
l'arbre ; elle devient grosse & belle en
mûrisson.

Le Muscat-Robert, autrement Poi-
re à la Reine, ou Poire d'Ambre, est
presqu'aussi grosse que l'Aurate, plus
tendre, sa peau lisse & jaune, sa chair
tendre, c'est-à-dire, ni beurée, ni cas-
sante, d'un goût sucré très-relevé ; son
mûrisson est jaune & sa feuille large : mi-Juillet.

La Bellissime ou Jargonelle est très-
douce, son eau est douce & agréable ;
elle est jaune dans sa maturité & à-peu-
près cassante.

La Cuisse-Madame est longue & me-
surtout vers la queue ; sa peau est jaune
rouge, l'eau très-sucrée : elle est
demi-beurée.

La Bellissime, ou Suprême, est de
grande grosseur, a la figure d'une grosse
tongue ; sa couleur est jaune, fouettée de
rouge ; sa chair est demi-beurée, de bon
suc, l'eau douce : il faut la cueillir un
peu verte, étant sujette à cotonner.

(Le Bourdon musqué est un gros Mus-

cat hâtif, qui est rond, fort relevé charge beaucoup & par bouquets.

Le Gros-Blanquet, ou Blanquet est plus long que rond, de moyen grosseur, la peau lissée, l'eau sucrée relevée, la chair cassante; le bois est gros & la feuille large: fin de Juillet.

L'Epargne, ou de Beau-Présent, de Saint-Sainson, est grosse, longue verdâtre, prend un peu de rouge sa chair est un peu âpre & cassante; et la queue longue: fin de Juillet, commencement d'Août:

L'Ognonnet, ou Amiré-Roux, Archiduc d'Eté, est ronde, plate, couleur blanchâtre, & un peu rouge la queue courte, sa chair demi-cassante & d'un goût rosat.

La Suprême est une Poire de moyenne grosseur, plus longue que ronde d'un rouge de corail, dont l'eau est douce & sans pierres.

Le Blanquet à la longue queue est plus petit que le gros, de même figure sa chair demi-cassante, son eau sucrée; il est très-estimé: commencement d'Août.

La Fleur de Guigne, ou Poire de la peau, est de la figure du Rousselet sa couleur verdâtre; sa chair est fondante

d'un goût parfumé : c'est une excellente poire ; elle a son bois long & droit ; fait mieux sur Franc que sur Coignassier.

Le Rousselet hâtif, ou Poire de Chypre, ou Perdreau, est petite, ronde, de la couleur du Rousselet, sa chair demi-beurée, l'eau parfumée; elle est sujette à mollir, si on ne la cueille un peu verte.

L'Épine-Rose, ou Poire de Rose, est une fois plus grosse que l'Ognonnet, a la même figure, la queue plus longue, le même goût ; elle est plus tendre, & demi-fondante : elle a le bois plus gros, & la feuille plus grande.

La Bergamote d'Été, ou Milan de la Beurriere, ressemble à la Bergamote d'Automne, est plus grosse; elle est bonne, demi-beurée; est sujette à cotonner, si on ne la cueille un peu verte: le bois & les feuilles sont farineux.

L'Orange-Rouge est ronde, semblable à une Orange par sa figure, d'un fond gris & d'un rouge de corail, l'eau bien sucrée, un peu cassante & musquée. Il la faut prendre un peu verte, pour qu'elle ne soit point cotonneuse : Août.

L'Orange-Musquée est de même figure que la précédente, mais moins

grosse & plus verte, ne prend presque point de rouge; elle est cassante, mais est estimée pour son musc agréable. Sa matutité est de même que la rouge.

Le Salviati est de moyenne grosseur, rond, beau & jaune, prend un peu de rouge au Soleil; est excellent; son eau est sucrée & parfumée; il est demi-beuré, sans marc. Il est bon au sucre; on en fait aussi du Ratafia. Il fait mieux sur Franc que sur Coignassier.

La Chair-à-Dame est de moyenne grosseur, assez ronde, grise, de couleur isabelle, prend un peu de rouge; sa chair n'est pas fine, elle est demi-cassante.

La Cassolette, ou Friolet, ou Muscat verd, ou Lêchefrion, est de moyenne grosseur, ni longue, ni ronde; elle est verdâtre, son eau musquée & sucrée; elle est cassante & tendre: elle se garde assez pour un fruit d'Été; l'arbre charge beaucoup.

Le Roi d'Été a la figure & la couleur du Rouffelet; mais il est quatre fois plus gros, un peu plus pointu vers la queue; sa peau est rude & marquetée de petits points gris; sa chair n'est pas fine; elle est demi-cassante; son eau est bonne un peu parfumée.

La Robine, ou Royale d'Été, est

petite, ronde, jaune; elle est très-musquée & sucrée, & estimée des Curieux, demi-cassante; elle charge par bouquets. Elle vient plus grosse sur le Coignassier que sur le Franc.

Le parfum d'Août est une Poire presque ronde, qui prend beaucoup de rouge; elle est fort musquée; elle est mûre à la mi-Août; elle charge beaucoup.

La Grise-Bonne, ou la Poire de Forest, ou la Crapaudine, ou l'Ambrétte d'Été, ou la Rude-Épée, à cause de son bois piquant; cette Poire est un peu languette & toute grise; elle est fondante & beurée.

La Poire d'Amiral est rouge, plus plate que ronde; elle a l'eau un peu sèche; elle charge bien & sans pierres.

Le Rouffelet de Reims est une excellente Poire; tout le monde la connoît: elle mûrit à la fin d'Août & au commencement de Septembre.

L'Inconnu Chêneau, ou Fondante de Brest: quoiqu'on la nomme Fondante, elle ne l'est pas; elle est cassante, plus longue que ronde, jaune d'un côté & rouge de l'autre; son eau est sucrée & relevée; elle charge beaucoup; son bois pousse gros & jamais droit.

Le Bon-Chrétien d'Été, ou Gracio-

li, est gros, long, lissé, jaune; son eau est très-sucrée; il est demi-cassant. Quoiqu'il ne soit pas généralement estimé, c'est une bonne Poire, semblable au Bon-Chrétien d'Hiver pour sa figure; elle est excellente en compote: commencement de Septembre.

Le Bon-Chrétien d'Été musqué est une Poire d'une grosseur raisonnable, longue; sa peau est jaune, lissée, fouettée de rouge quand on la découvre; sa chair est parfumée & cassante. Quoiqu'on la nomme Bon-Chrétien, ni son bois, ni ses feuilles n'en ont le caractère; la Poire en a seulement la figure: entée sur Franc.

L'Épine d'Été, ou Fondante musquée, (en Italie *Bugiarda*) est d'une bonne grosseur; longue, sa peau lissée & verdâtre, sa chair fondante, relevée & parfumée. C'est une excellente Poire. Louis XIV la nommoit la Bonne-Poire.

La Poire-d'Œuf, ainsi nommée, parce qu'elle en a la figure, est d'une bonne grosseur; sa couleur est verdâtre, marquée de points gris; elle est panachée de rouge & de verd du côté du Soleil; sa chair est tendre, demi-beurée, & d'un goût très-relevé: elle nous vient d'Allemagne, où elle est très estimée, & même assez rare. Entée sur Franc.

L'Orange-Tulipée, ou la Poire-aux-Mouches, est d'une bonne grosseur, assez ronde, verte & rouge du côté du Soleil; sa chair est demi-cassante, un peu âpre, mais d'un goût agréable.

Le Beuré d'Angleterre, ou simplement l'Angleterre, est d'une moyenne grosseur, un peu languette, de couleur grisâtre; sa chair est demi-beurée & fondante, d'un goût relevé; elle est sujette à mollir, si on la garde quelque tems. Entée sur Franc.

Le Finor est une Poire rouge, plus plate que longue, a beaucoup d'eau, est très-tendre & délicate, charge bien, & est très-estimée.

La Cramoisine est une Poire languette, qui ressemble au Blanquet, mais plus menue vers la queue, dont l'eau est fort sucrée; charge beaucoup.

POIRES D'AUTOMNE.

Le Beuré est une grosse Poire, connue de tout le monde; elle est belle à voir, il y en a de grises & de rouges, qui ne font qu'une espèce; son beuré est si fondant, qu'elle en porte le nom; elle est d'un suc & d'un fumet admirable; c'est une des plus excellentes

Poires. Elle devient toujours grise sur les arbres vigoureux & sur le Franc : fin de Septembre & commencement d'Octobre.

Le Bezi-de-Montigny est une Poire de la figure & grosseur du Doyenné, mais plus fondante & plus musquée : elle mûrit à la fin de Septembre.

La Verte-Longue, ou Mouille-Bouche ordinaire, est longue & verte, même étant mûre ; elle est très-fondante, d'une eau excellente dans les terres chaudes ; elle n'est pas si bonne dans les terres froides & humides ; l'arbre charge beaucoup : commencement d'Octobre.

La Verte-Longue panachée, ou Suisse, n'est différente de la précédente que parce qu'elle est rayée de verd, de jaune & de rouge ; elle est très-fondante & a le même goût ; sa maturité est de même ; son bois est panaché de jaune.

Le Doyenné, ou Beuré blanc, ou Saint-Michel de Bonne-Ente, est gros, jaune comme un citron lorsqu'il est mûr ; il est très-beuré, son eau sucrée ; il est bon dans les années sèches, & a un bon fumet : il le faut manger un peu vert, autrement il devient cotonneux ; l'arbre charge beaucoup.

Le Bezi-de-la-Motte est gros, ressemble pour sa figure au Doyenné; il n'est pas jaune, sa chair est fondante & douce. C'est une bonne Poire.

La Bergamote Silvange moins grosse que la Bergamote, d'une couleur verdâtre, est fondante & généralement estimée: elle mûrit à la fin de Septembre.

Le Mellire-Jean est une grosse Poire; il y en a de gris & de doré; il est d'un goût exquis, sa chair est cassante & pierreuse: son eau est très-relevée; il est fort estimé; il en est de sa variété comme de celle des Beurés.

La Bergamote-Suisse est d'une bonne grosseur, ronde, plate, lissée, panachée de verd, de jaune & de rouge; elle est beurée, fondante & sucrée; c'est une excellente Poire: le bois est panaché.

La Bergamote d'Automne est grosse, plate, lissée, jaune en mûrissant; elle est beurée & fondante; elle fait un bel arbre; l'espalier lui convient mieux que le buisson, où il devient toujours galeux.

Le Sucré-Verd est assez gros, plus rond que long, sa peau lissée & verte; il est très-beuré & très-sucré; l'arbre charge beaucoup & par bouquets, & fait un gros bois.

La Poire de Vigne, ou de Demoiselle, est petite, assez ronde, grise-brune, la queue fort longue; elle est fondante, d'un goût fort relevé; elle est sujette à mollir quand on la laisse trop mûrir.

La Bergamote d'Angleterre est presque ronde; elle est jaune, & c'est une bonne Poire, ayant beaucoup d'eau & de parfum; elle n'est pas fort connue; elle charge beaucoup. Sur Franc.

Le Besi-d'Heri est une Poire ronde, jaune, lisse, assez grosse, meilleure cuite que crue. Elle vient mieux sur le Franc que sur le Coignassier.

La Poire de Lansac, ou Dauphine, que plusieurs Auteurs nomment Satin, est ronde; sa peau est jaune & lissée, son eau est sucrée, sa chair fondante, & a un petit fumet agréable: fin d'Octobre.

Elle fut présentée pour la première fois à Louis XIV, lorsqu'il étoit Dauphin, par Madame de Lansac, pour lors sa Gouvernante.

La Franchipane, ou Dauphine, est plus longue que ronde, d'une bonne grosseur; sa peau est lissée & jaune, elle est demi-fondante & bonne; son eau est douce & sucrée; elle a le goût de Franchipane.

La Bellissime d'Automne, ou Vermillon, est de la figure de la Cuisse-Madame; elle est plus grosse & a le même goût; elle est sucrée & cassante; elle est très-bonne quand elle est bien mûre.

La Jalousie est grosse, un peu pointue vers la queue, d'une couleur grisâtre, semblable au Martin-Sec; elle a beaucoup d'eau, elle est sujette à mollir, si on ne la cueille un peu verte. Sur Franc.

Le Doyenné gris, plus excellent que le blanc; cette Poire est fondante, extrêmement sucrée, n'est point sujette à devenir cotonneuse, & se mange au commencement de Novembre. Elle ne se trouve qu'aux Pépinières des Chartroux.

La Rouffeline est longue, pointue vers la queue, qu'elle a très-longue; elle a beaucoup de rapport au Rouffelet par sa couleur: elle est sucrée, musquée & demi-beurée: Novembre, Sur Franc.

La Marquise est grosse, ressemble au Bon-Chrétien d'Hiver par sa figure; elle est un peu plus pointue vers la queue; sa peau est verte; elle devient jaune en mûrissant, elle est beurée &

fondante ; son eau est sucrée & un peu musquée ; c'est une Poire excellente ; elle fait un bel arbre.

Le Bon-Chrétien d'Espagne est de même figure que le Bon-Chrétien d'Hiver. Il est beau & rouge ; sa chair est sèche & cassante ; il est estimé pour servir sur table & pour les compotes.

La Louise-Bonne est grosse , plus longue que ronde , de couleur blanchâtre , sa peau lissée & douce ; elle est demi-beurée , son eau est douce dans les terres sèches ; elle a un fumer agréable : elle fait un bel arbre.

La Crasane , ou Bergamote-Crasane , est grosse , ronde , d'un gris verdâtre ; elle jaunit un peu en mûrissant ; elle est très-fondante ; son eau sucrée , & un peu parfumée ; elle a une âpreté qui est agréable au goût ; elle est très-estimée : c'est une bonne Poire.

La Crasane panachée , est la même que l'autre Crasane. Cela vient d'une variété qui s'est trouvée dans l'espece. Elle est d'une panache fort jolie & très-éclatante ; sa feuille étant bordée de blanc autour.

La Pastorale , ou Musette-d'Automne , est longue & d'une bonne grosseur ; sa peau est grisâtre , sa chair est
demi-

demi-fondante; un peu musquée; c'est une bonne Poire; elle se garde jusqu'en Décembre.

La Poire d'Ange est semblable au Salviati; elle prend du rouge, elle est un peu plate & beurée, sa peau est brute & mal unie, fait un bourrelet près la queue qui est enfoncée.

Le Chat-Brûlé ou Pucelle de Saintonge, est une Poire un peu longue, qui est fort bonne, & fondante.

Le Saint-Lezin, est une Poire fort longue, & jaune; est cassante, d'une eau douce & sucrée: elle est fort estimée en Anjou.

La Poire de Tonneau est aussi grosse par la queue que par la tête; elle vient grosse, & est excellente en compotes: Février & Mars.

POIRES D'HIVER.

L'Épine-d'Hiver est d'une bonne grosseur, plus longue que ronde; elle est verte, & jaunit un peu en mûrissant; elle est très-fondante, un peu musquée & beurée; elle a le goût plus fin, greffée sur le Coignassier, que sur le Franc, & dans les terres sèches & chaudes: Novembre.

La Merveille-d'Hiver, ou Petit-Oin, est d'une bonne grosseur, d'une figure inégale, n'étant ni ronde, ni longue; elle est verdâtre; sa chair est fondante & d'un beuré très-fin, & l'eau très-agréable; l'arbre réussit mieux sur le Franc que sur le Coignassier: Novembre,

Le Bezi de Queffois, venant de Bretagne, de la Forêt de Queffois, est une petite Poire presque ronde, fort brune & beurée; on l'appelle le petit Beuré d'Hiver; il mûrit en Novembre: il charge par bouquets. Sur Franc.

La Virgouleuse est grosse, longue & verte, elle jaunit en mûrissant; elle est beurée & fondante; c'est une des meilleures Paires; tout le monde la connoît par son excellente bonté: elle fait un arbre superbe, tant par son bois, que par ses feuilles: fin de Novembre, Décembre & Janvier.

L'Ambrette est de moyenne grosseur, ronde, blanchâtre dans les terres légères, & grise dans les terres fortes; elle est fondante; son eau est sucrée, relevée & exquise quand elle est greffée sur le Coignassier; son bois est toujours épineux.

La Solitaire, ou la Mansuette, ref-

semble beaucoup au Bon-Chrétien d'Hiver par son fruit, son bois & ses feuilles; elle est moins grosse du côté de l'œil, demi-cassante; son eau est douce & agréable: elle est fort estimée en Flandres.

Le Bezi-de-Chassery, ou le Chassery, est de moyenne grosseur, rond ou ovale, de couleur blanchâtre: il est beuré & fondant; son eau est sucrée & musquée. C'est une des plus excellentes Paires d'Hiver. Ses feuilles sont longues & étroites.

Le Martin-Sire, ou Poire de Romeville, est plus long que rond, d'une moyenne grosseur, verdâtre & lissé; sa chair est cassante, son eau douce: il se mange en Janvier.

La Royale-d'Hiver ou Muscat Almand, (en Italie *Spina di Carpi*) est belle, grosse, plus longue que ronde, de la figure & de la couleur de Bon-Chrétien d'Eté; elle prend du rouge; elle jaunit en mûrissant; sa chair est demi-beurée & fondante, & très-sucrée dans les terres sèches & chaudes: Janvier, Février. Le bois est gros, les feuilles larges qui font le bateau. Sa greffe fait le bourrelet sur le Coignassier.

Le Martin-Sec est plus long que rond, sa peau est grise, prend beaucoup de rouge au Soleil; sa chair est cassante; son eau est sucrée, d'un goût agréable; il est aussi estimé crud que cuit: il se garde jusqu'en Février.

Le Bezi-de-Chaumontel, qu'on nomme aussi Beuré-d'Hiver, est assez semblable au Beuré pour sa figure & sa couleur. Il est demi-beuré & fondant; l'eau en est sucrée; c'est une bonne Poire: en Février.

Le Colmart, ou Poire-Manne, ou Belle & bonne, est gros, plus long que rond, blanchâtre, prend un peu de rouge du côté du Soleil; il est Beuré & fondant; son eau est sucrée & d'un goût très-fin; c'est une des plus excellentes Poirs d'Hiver que nous ayons: elle se mange en Février, en Mars & quelquefois en Avril.

Le Saint-Germain est gros, long; il est verdâtre, il jaunît en mûrissant; est très-beuré & fondant. C'est une excellente Poire; elle se garde jusqu'en Mars & quelquefois en Avril; elle fait un bel arbre & très-vigoureux; ses feuilles sont longues, elles sont le demi-cercle, recourbées en-dessous.

L'Orange d'Hiver a la figure des

autres Oranges : elle est blanchâtre ,
demi-cassante , l'eau relevée : sa ma-
tunité est en Mars & Avril.

Le Rouffelet d'Hiver est de la même
grosseur & figure que le Rouffelet ; sa
couleur approche de celle du Martin-
Sec ; il prend du rouge ; il est demi-
cassant , d'un goût un peu relevé : sa
maturité est en Mars.

Le Bon-Chrétien d'Hiver est une
Poire ancienne , assez connue de tout
le monde sans la décrire : elle dure jus-
qu'au Printems. Il vient plus gros , plus
doré & plus rouge sur le Coignassier
que sur le Franc , & plus beau en espa-
lier qu'en buisson.

L'Angélique de Bordeaux, ou Saint-
Martial , est assez semblable au Bon-
Chrétien d'Hiver , mais plus plate &
moins grosse ; elle est cassante & su-
crée : elle se garde fort long-tems.

La Bergamote de Pâques, ou d'Hi-
ver , est la même Bergamote Bugi ou
Soulers ; elle ressemble à la Bergamote
d'Automne , mais plus longue ; elle est
demi-beurée : elle se garde long-tems ;
on en mange encore en Mars.

La Poire Sarasin est d'une moyenne
grosseur , ressemble à la Donville ; son
eau est sucrée , relevée & un peu parfu-

mée : elle est bonne même en compote ; elle se garde plus long-tems qu'aucune autre Poire.

L'Impériale à feuilles de Chêne est une Poire qui ressemble à une moyenne Virgouleuse, aussi verte. Avril & Mai. Excellente en compote.

La Poire de Saint-François est plus longue que ronde, de couleur grise, rouge du côté du Soleil ; elle est excellente cuite, son eau étant musquée & sans pierres ; elle est assez bonne crue, & se garde long-tems. Sur Franc.

La Bergamote de Hollande est assez grosse & ronde, de la figure des Bergamotes ; sa couleur est verdâtre ; sa chair est demi-beurée & tendre ; son eau relevée : c'est une bonne Poire qui se garde jusqu'en Juin : elle n'est pas fort connue.

La Poire de Malthe ou Caillot-Rofat d'Hiver, est presque ronde, d'un gris brun, a la queue grosse & courte d'une eau douce en rosate ; elle se mangé pendant long-tems.

POIRES excellentes à cuire.

Le Franc-Réal est une grosse Poire un peu longue, verdâtre, marquetée

de petits points gris : c'est une Poire excellente en compotes & à cuire dans la cloche. L'arbre chargé beaucoup ; le bois & les feuilles sont farineux.

La Catillac est une très-grosse Poire blanchâtre , & un peu plus longue que ronde , de couleur grisâtre ; elle est très-bonne cuite de toutes façons ; son bois est gros , & ses feuilles larges.

La Double-Fleur est une Poire longue , grise , rouge du côté du Soleil ; sa fleur est très-double ; elle fait plaisir à voir ; elle est excellente à cuire , & se garde très-long-tems.

La Poire-de-Livre est fort grosse , assez ronde ; elle est très-bonne cuite ; l'arbre pousse vigoureusement ; son bois est fort gros , & la feuille très-large. Sur Franc.

La Donville , ou la Poire de Provence , est assez grosse & longue , d'un jaune rouge , sans pierres ; elle n'est bonne que cuite , & est très-estimée.

Le Parfum divers ou Bouvard-Musqué , est une très-belle Poire , grosse & ronde , d'un beau rouge , qui charge bien ; & meilleure cuite que crue.

Le Giligille ou la Garde-d'Ecosse , est une très-belle Poire , grosse & ron-

de, lisse & jaune, qui n'est bonne qu'à cuire.

La Bellissime d'Hiver, est une Poire très-grosse & longue, de couleur grisâtre, qui charge beaucoup son eau, est assez douce, & des meilleures à cuire.

La Poire Targuin est longue, ressemble à l'Épargne; sa chair cassante, son goût est assez semblable à la Bergamote de Pâques, & se garde jusqu'en Avril & Mai.

Il y a encore des Poirs qui sont plus curieuses qu'excellentes; comme la Sanguinolle, qui est rouge en dedans, & qui n'est estimée que par sa singularité: sa maturité est au mois d'Août.

POMMIER. *MALUS.*

La description des fleurs du Poirier convient à tous égards aux fleurs du Pommier.

La Pomme est ordinairement d'une forme plus arrondie que la Poire, & sa queue part d'une cavité plus profonde. Cependant cette différence est si peu marquée dans quelques espèces, qu'on sçait à peine à laquelle des deux les rapporter, & qu'on les appelle des Pommes-Poirs.

Le

Le Pommier se plaît dans les terres un peu humides, & qui ont beaucoup de fond.

P O M M E S.

La Passe Pomme Rouge est la plus hâtive, veut être mangée de bonne heure, est belle à peindre, fort fleurie & fort tendre; charge beaucoup.

La Calville d'Été est un peu longue, de moyenne grosseur, rayée de blanc & de rouge; sa chair est légère & sèche; l'eau assez douce; elle n'est estimée que par sa primeur: elle se mange au commencement de Juillet.

Le Rambour-Franc est une grosse Pomme, d'une figure un peu plate, blanche, rayée d'un peu de rouge; elle est excellente cuite, principalement en compotes: elle est estimée à cause de sa primeur: elle fait un bel arbre; le bois est fort gros & la feuille très-large.

Le Fenouillet Gris, ou Pomme d'Anis, est d'une moyenne grosseur, un peu plus longue que ronde, & grisâtre; sa chair est tendre; elle a le goût d'Anis; elle est excellente quand elle est un peu fanée: le bois & les feuilles sont blanchâtres.

Le Fenouillet Rouge, ou Bardin, ou

E

Courpendue (selon M. de la Quinty-
nie) est semblable à la précédente, mais
plus grise & d'un rouge brun du côté
du Soleil; elle a le même goût, mais
plus sucré; elle est musquée dans les
terres légères & chaudes.

La Pomme-Figue, sans pepin, vient
comme la Figue sans fleur apparente;
elle est languette, d'une moyenne gros-
seur: elle est plus curieuse que bonne;
sa singularité la fait estimer.

La Passe-Pomme d'Automne, ou la
Pomme Générale, qui vient de Breta-
gne, où elle est fort estimée, est d'une mé-
diocre grosseur; sa peau est d'un rouge
vermeil; elle est rouge dedans, & est
la plus légère des Pommes: elle mû-
rit en Août.

La Couffinette est une petite Pomme,
& d'un beau rouge vif.

La Petite-Reinette jaune, hâtive, est
plus tendre que les autres Reinettes;
elle n'a pas l'eau si relevée que les au-
tres; elle dure peu: elle se mange en
Septembre.

La Reinette-Rouffe, ou Reinette des
Carmes est plus grosse & plus ferme que
la précédente: son eau est relevée, &
dure long-tems,

La Pomme de Pigeonnet est longue & fort rayée : Octobre.

La Royale d'Angleterre est une Pomme d'une grosseur extraordinaire, plus longue que ronde ; elle est tendre & légère.

La Calville blanche est une grosse Pomme, blanche dedans & dehors ; elle est par côtes ; sa chair est très-légère & le goût très-relevé, sans aucun acide ; elle est fort estimée & se garde assez de tems ; elle fait un bel arbre : son bois est gros, sa feuille large.

La Calville rouge est grosse, plus longue que ronde, d'un beau rouge ; sa chair est très-légère, son goût vineux ; c'est une excellente Pomme : les vieux arbres en produisent de rouges en dedans, pourvu qu'ils soient dans une terre forte & froide ; elle se garde longtemps.

La Reinette Franche est assez connue ; elle est grosse & belle ; elle jaunit en mûrissant ; elle est tiquetée de petits points gris ; elle a l'eau sucrée ; c'est une des plus excellentes Pommes, tant crue que cuite ; on en garde jusqu'aux nouvelles ; elle est estimée de tout le monde par sa beauté & sa bonté.

La Reinette-Grise est grosse, très-

bonne; elle a l'eau sucrée; elle ne se garde pas si long-tems que la Reinette Franche; elle est aussi estimée; elle lui ressemble, hors la couleur, qui est très-grise.

La Reinette-Rouge a la figure des Reinettes, mais plus ronde & moins grosse; elle est d'un beau rouge sur un fond blanchâtre; sa chair est ferme & l'eau sucrée; elle se garde assez long-tems, mais elle n'est pas fort commune. La plupart la confondent avec la Reinette-Franche.

La Pomme d'Or, ou Reinette d'Angleterre, (nommée par les Anglais *Gold-Pippin*) est un peu plus longue que ronde, d'une moyenne grosseur, & jaune comme de l'or; elle est tiquetée de petits points rouges; elle est sucrée, & a le goût plus relevé que la Reinette: elle est fort estimée de tous les Curieux; elle se garde assez de tems.

La Pomme Violette est assez grosse, blanchâtre & fouettée de rouge où le Soleil n'a pas donné, & fort chargée de rouge où elle a été découverte; sa chair est fort blanche & fort fine, & délicate; l'eau très-douce & sucrée: c'est une bonne Pomme, mais elle ne

pas l'année; elle a un petit goût de violette, ce qui lui en fait donner le nom.

La Pomme de Drap-d'Or est grosse; sa peau est semblable à du drap d'or, d'où lui vient son nom; son eau est bonne; sa chair est un peu cotonneuse, elle ne passe pas l'année; elle est estimée des Curieux.

La Pomme d'Api est fort connue de tout le monde sans la décrire; la petite est meilleure que la grosse, qu'on nomme Pomme de Rose, parce qu'elle en a l'odeur. La première devient plus rouge, & a un meilleur goût; elle est fort estimée: elle se garde très-long-tems.

L'Api Noir est une Pomme de la figure de l'Api ordinaire, mais plus grosse & a le même goût: son bois & ses feuilles sont presque semblables.

Le Gros Courpendu gris est une très-grosse Pomme d'un gris rouge; c'est une Pomme excellente à manger crue & en compotes.

La Pomme Nompaille est une Pomme qui est verte; elle est d'une belle grosseur, prend un peu de gris, a la queue longue; elle est fort estimée en Angleterre, se garde long-tems & est très-bonne.

Le Rambour d'Hiver est très-gros ; un peu plus long que le Rambour d'Été ; elle est toute verte & excellente pour cuire pour les Malades à cause de son eau aigrelette.

La Pomme-Poire est une espece de Reinette Grise, qui a la chair dure, assez bonne, & se garde bien.

Le petit Pommier Nain, qui demeure toujours petit, est propre à mettre en pots ou en caisses ; il donne son fruit de la grosseur d'une Reinette Blanche ; cette pomme est longue, jaune : elle est très-bonne & se garde très-long-tems.

La Pomme d'Astracan, ou la Transparente de Moscovie, est très-blanche & très-grosse, & a la peau si fine, que l'on voit presque le jour au travers : sa maturité en Janvier & Février.

Le Postophe d'Hiver est une Pomme très-grosse, d'un rouge pâle ; elle se garde long-tems.

La Reinette Grise de Champagne est une Pomme plate, cassante & sucrée, qui se garde long-tems.

Le Gros-Faros est une Pomme très-grosse & un peu plate, rayée de rouge ; elle est cassante, & a beaucoup d'eau ; elle se garde très-long-tems.

Le Gros-Capendu Rouge est une

Pomme languette, qui est très-cassante; son eau est fort douce; elle se garde long-tems.

La Passe-Rose plate est une Pomme pareille à celle d'Api, mais bien plus grosse; elle se garde long-tems.

Le Francatu est une grosse Pomme; un peu plate; elle a l'œil enfoncé; elle est tiquetée de petits points gris: Janvier.

La Princesse-Noble est une Pomme de la figure de la Reinette, un peu plus plate, qui a l'œil enfoncé, qui prend beaucoup de rouge, est une excellente Pomme.

La Calville blanche d'Eté, se mange en même-tems que la rouge, elle est de la forme, & de la grosseur de la rouge; mais toute blanche dehors & dedans.

La Pomme de Malingre d'Angleterre, est très-grosse & longue, d'un suc fort aigre; se garde long-tems; est bonne cuite pour les malades.

La Pomme de Jardi, est une très-grosse Pomme, qui a la queue très-longue & menue, qui a la chair très-jaune & ferme: & se garde bien.

Il y a encore beaucoup de sortes de Pommés, mais moins bonnes, & qui

ne sont estimées qu'en certains Pays;
pour cuire, ou pour le cidre.

AZEROLIER. AZAROLUS.

La fleur de l'Azerolier est formée de cinq pétales disposés en rose, & insérés par leurs onglets sur un calice d'une seule piece dont le bas représente une coupe & le haut est dépecé en cinq segmens comme de petites feuilles. L'embrion est situé sous la fleur, à la base du calice, & surmonté ordinairement de deux styles entourés d'une vingtaine d'étamines.

L'Azerole est une baye (ou petit fruit succulent) terminée par un ombilic provenant des segmens du calice, & renfermant dans sa pulpe deux petits noyaux.

L'Azerole est un fruit assez fade; aussi est-il peu d'usage, si ce n'est dans les desserts.

AZEROLES.

L'Azerole blanche est grosse & blanchâtre; elle ne charge bien qu'en espalier; ses feuilles sont découpées & argentées.

L'Azerole rouge est moins grosse,

elle est estimée pour les confitures; ses feuilles sont larges, sans découpures, mais dentées; elle charge par bouquets, & parfaitement en plein air.

L'Azerole de Canada.

L'Azerole de Virginie.

L'Azerolier odorant.

NEFLIER. *MESPILUS.*

La fleur de même que l'Azerolier.

Le fruit contient cinq noyaux durs.

Le Neflier s'accommode assez bien de toutes sortes de terrains, pourvu qu'ils ne soient pas trop secs.

La Nefle, ou Mêle, est un fruit assez médiocre, que l'on ne mange qu'après l'avoir laissé mollir sur la paille, ce qui en développe les sucs & en relève un peu le goût.

N E F L E S.

La grosse Nefle est fort grosse, & son bois gros; ses feuilles sont larges.

La Nefle sans pepin est petite, mais estimée par sa rareté.

EPINE-VINETTE. *BERBERIS.*

La fleur est formée de six pétales;

renfermés dans un calice de six feuilles un peu colorées. On voit au fond de la fleur un embryon entouré de six étamines.

Le fruit est une petite baye succulente, oblongue, terminée par un petit ombilic, & contenant deux pepins assez durs. Les fleurs sont rassemblées en grapes.

L'Épine-Vinette s'accommode aisément de toutes sortes de terrains; mais il porte de plus beau fruit dans une bonne terre que dans une terre maigre & sèche.

Le fruit de l'Épine-Vinette ne se mange gueres crud; mais on en fait des confitures, des gelées excellentes.

L'Épine-Vinette de Canada, à gros fruit,

VIGNE. *VITIS.*

La fleur est formée de cinq petits pétales verdâtres, (qui se réunissant assez ordinairement par leur pointe, forment comme un petit bonnet, & tombent tous à la fois,) d'un très-petit calice à cinq dents, & de cinq étamines. L'embryon est situé au centre de la fleur, & devient une baye ou grain succulent,

contenant naturellement cinq pepins ;
dont la plupart avortent souvent.

R A I S I N S.

Le Raisin précoce, ou Morillon noir hâtif, est petit, noir, sucré, & n'est estimé que par sa primeur.

La Malvoisie est un Raisin hâtif, gris, fort sucré & relevé; le grain en est petit, mais si plein de jus, qu'il passe pour le plus fondant des Raisins.

Le Chasselas blanc est un bon Raisin, qui mûrit parfaitement. Quand on a soin de le découvrir, il devient ambré & d'un goût excellent. Il se garde longtemps.

Le Chasselas-Musqué est semblable au Chasselas blanc pour la couleur, mais il est musqué; il mûrit parfaitement & de bonne heure; c'est un excellent Raisin: il n'est pas fort connu.

Le Cioutat, ou Raisin d'Autriche, est presque semblable au Chasselas pour son goût & sa couleur; sa feuille est découpée comme celle du Persil.

Le Muscat blanc est un excellent Raisin, très-musqué, d'un goût très-relevé; il a de la peine à mûrir dans les années froides; il faut l'éclaircir,

pour que les grains soient moins serrés,
pour lors il mûrit mieux.

Les Muscats rouges & les violets sont
semblables aux précédens, hors leur
couleur; ils mûrissent mieux, parce
qu'ils sont moins serrés: ils sont tres-ex-
cellens & fort estimés.

Le Muscat d'Alexandrie, ou Passe-
longue Musquée est excellent, se garde
beaucoup de tems; il a de la peine à
mûrir dans les années & dans les terres
froides.

Le Corinthe blanc est petit, rond,
sans pepin; il est très-sucré & passe vite;
c'est un excellent Raisin.

La Grosse-Perle.

Le Maroc, ou Olivet.

Le Bordelais, ou Verjus, est excel-
lent pour confire & pour le Verjus.

Le Raisin panaché de noir & de
blanc, n'est estimé que par sa singularité.

Le Cornichon violet, & le blanc ont
la peau épaisse, & leur eau est douce.

Il y a beaucoup de sortes de Raisins
qui sont curieux, & qui mûrissent dif-
ficilement, comme les Cornichons rouge
& blanc, le Grec, &c.

FIGUIER. *FICUS*.

Le Figuier n'a point de fleurs en évi-

dence ; mais les Botanistes ont découvert dans l'intérieur du fruit toutes les parties essentielles à la fleur.

La Figue est donc une espèce de calice charnu & succulent fermé de quelques petites lames écailleuses , & renfermant dans sa cavité diverses fleurètes tant mâles que femelles ; celles-là plus près de l'œil , celles-ci en plus grand nombre & plus près de la queue de la Figue.

Le Figuier s'accommode de toutes sortes de terres ; mais avec cette différence que dans un terrain gras il devient plus gros , & que dans un terrain sec , ou même entre des rochers , son fruit est plus sucré & d'un goût plus fin.

Le Figuier ne supporte pas les gelées de nos grands Hivers , si l'on ne prend beaucoup de précautions pour l'en garantir ; & si on le tient en caisse , il donne peu de fruit.

Il faut donc le tenir en pleine terre , & plutôt en buisson qu'en espalier , à une bonne exposition , c'est à-dire , au Midi , ou au Sud Est , & à l'abri d'un côteau , ou de murailles assez élevées qui le défendent de l'aspect du Nord , ou même du Couchant ; tenir l'arbre toujours bas & comme nain , en ra-

battant chaque année jusques sur la souche quelques-unes des plus grosses branches ; les médiocres continuant à donner du fruit , seront rabattues successivement ; & quand les moindres auront pris assez de force pour être dans le cas de souffrir un pareil retranchement , les nouveaux jets reproduits par la souche se trouveront en état d'y suppléer & de fructifier. Il faut en outre couvrir dans les tems froids les Figuiers nains avec de la paille , des roseaux ou des genêts.

Comme les Figues mûrissent difficilement dans nos climats , il est bon 1°. de faire paver le dessous des Figuiers , afin d'augmenter la réverbération du soleil ; 2°. de piquer l'œil de chaque Figue , lorsqu'elles commencent à grossir , avec une petite plume enduite d'huile d'olives.

F I G U E S.

La Blanche-Ronde est grosse ; elle a le grain petit , la chair très-sucrée , & le goût très-relevé ; elle charge beaucoup dans le Printems & l'Automne.

La Blanche-Longue est tout-à-fait semblable à la ronde pour sa bonté ,

mais elle charge moins dans le Printems; elle mûrit fort bien dans les Automnes chaudes.

Les Violettes sont de deux sortes. La Grosse-Longue, & la Ronde, qui est plus petite; elles sont de beaucoup inférieures aux blanches; elles chargent moins dans le Printems, & elles mûrissent difficilement dans l'Automne.

Il y a encore beaucoup de sortes de Figes qui ne réussissent point dans notre climat,

CATALOGUE DES ARBUSTES CURIEUX

ET DES PLANTES ETRANGERES.

- Pêcher à fleurs doubles.
- Amandier à fleurs doubles.
- Amandier nain du Canada, à fleurs rouges.
- Amandier blanc d'Egypte.
- Amandier panaché en blanc & en jaune.
- Prunier à fleurs doubles. Il charge peu ; les Prunes sont grosses, vertes & assez bonnes.
- Prunier du Canada. Il porte de fort jolies fleurs rouges d'un bout à l'autre des branches. Son fruit est plat & rouge comme une cerise, mais il n'est pas bien bon.
- Prunier à Prunes sans noyau. Ces Prunes sont petites, noires, & moins bonnes que curieuses.
- Cerisier à fleurs doubles.
- Merisier à fleurs doubles. Ses fleurs sont charmantes.

Bois

Bois de Sainte-Lucie. *Cerasus racemosa, sylvestris, fructu non eduli.*

Poire-Azerole.

Pomme-Azerole, ou Pommier odorant de l'Amérique.

ALISIER. *CRATÆGUS.*

Pour décrire la fleur de l'Alisier, on ne pourroit que répéter la description de celle de l'Azerolier.

L'Alise a ordinairement deux pépins cartilagineux, ou noyaux fort tendres.

Alisier, *Cratægus.*

Alisier du Mont-d'or.

Alisier, à fruit rouge.

AMELANCHIER.

Fleur, de même que celle de l'Azerolier.

Le fruit contient plusieurs pépins tendres; au moins trois, au plus dix.

AUBEPINE. *OXYACANTH.*

Fleur, de même que celle de l'Azerolier.

Le fruit contient ordinairement deux noyaux durs.

Epine à feuilles d'Erable.
 Epine à feuilles d'Arboufier,
 Epine à feuilles luisantes.
 Epine à fleurs doubles.
 Epine Royale, à fruit blanc.
 Cotonaster, (espece de Neflier.)
 Platane.

SORBIER. *SORBUS*.

La fleur est encore la même que celle de l'Azerolier.

Le fruit contient trois pepins dans autant de petites loges.

Sorbier-Cochêne. *Sorbus aucuparia*.

Sorbier-Metis. *Sorbus hybrida*.

Les Botanistes n'ont trouvé entre tous ces arbres, Azerolier, Neflier, Alifier, Amelanchier, Aubepine, Buifon-Ardent, Cotonaster, Sorbier, aucune différence générique bien essentielle & bien constante.

La plupart des Auteurs ont tiré le caractère du Sorbier de ses feuilles empennées, c'est-à-dire, de ce que chaque feuille est composée de plusieurs feuilletes disposées par paires sur une côte commune que termine une feuillette impaire : toutes ces feuilletes étroites & dentées, Le Sorbier-Metis a

céla de singulier , que toutes les feuil-
 lettes ayant plus de largeur , se rap-
 prochent tellement les unes des autres
 que les premières remplissent presqu'en-
 entier leurs intervalles , les suivantes
 se tiennent ensemble par leur base , se
 touchent presque par leur pointe ; en-
 fin les dernières se réunissent tout-à-
 fait & se confondent. Il est vraisem-
 blable que cette race produira par la
 suite de nouveaux sujets , dont les
 feuilletes s'élargissant encore davan-
 tage , deviendront tellement confluen-
 tes qu'elles ne formeront plus toutes
 ensemble qu'une feuille large , décou-
 pée , ou dentée , mais nullement com-
 posée , ou empennée. Alors des Ecri-
 vains célèbres , qui regardent cet Ar-
 bre comme un Hybride , ou Metis ,
 provenant de la fécondation d'un Sor-
 bier par un Alisier , le rapporteront
 peut-être tout-à-fait à l'Alisier , quoi-
 que dans son origine ce soit un vrai
 & pur Sorbier.

ALATERNE. *ALATERNUS.*

La fleur est formée de cinq pétales
 presqu'imperceptibles , posés sur les
 échancrures d'un calice d'une seule

pièce en entonnoir, dont le bord est découpé en cinq segmens. Au centre de la fleur on apperçoit un embrion surmonté de trois styles & entouré de cinq étamines insérées aux échancrures du calice. Le fruit est une baye molle qui contient trois semences.

Les fleurs de l'Alaterne sont rassemblées en petites grapes. Il y a ordinairement deux individus, dont l'un porte des fleurs femelles. Cependant il se trouve toujours, tant sur l'un que sur l'autre, quelques fleurs hermaphrodites.

GRENADIER. *PUNICA.*

La fleur est formée de cinq à huit pétales chiffonnés, insérés par leurs onglets sur les échancrures d'un calice d'une seule pièce, en cloche, épais, coloré, découpé à moitié en cinq à huit segmens. L'embrion est posé sous la fleur à la base du calice, & entouré d'un grand nombre d'étamines.

Le fruit est en forme de pomme, portant une espece de couronne antique qui provient des segmens du calice; la peau est coriace, l'intérieur est partagé en neuf à dix loges, dont

chacune contient plusieurs pepins succulens nichés dans une pulpe peu charnue.

GENEST. GENISTA.

La fleur formée de quatre pétales inégaux, représente en quelque sorte un papillon volant; le calice est court, d'une seule piece en tuyau, terminé par cinq dents inégales. L'embrion est au centre de la fleur, entouré de dix étamines, & devient une gouffe où les semences sont attachées à la suture supérieure par une espee de petit cordon ombilical.

Genest d'Espagne, à fleur double.
Genista juncea, flore multiplici.

TREFLE. TRIFOLIUM.

La fleur représente en quelque sorte un papillon volant. Le calice est d'une seule piece en tuyaux à cinq dents. L'embrion est au centre de la fleur, entouré de dix étamines, dont neuf sont réunies par leurs filamens. Cet embrion devient une gouffette, où les semences sont attachées à la suture supérieure par une espee de petit cordon ombilical.

Plusieurs fleurs sont rassemblées en forme de boulon, ou de petite tête.

ARBRE DE JUDÉE. GAINIER.

SILICUASTRUM.

La fleur, formée de cinq pétales irréguliers, représente en quelque sorte un papillon volant. Le calice est court, d'une seule pièce, en cloche, à cinq dents. Au centre de la fleur on voit l'embrion, entouré de dix étamines d'inégale longueur. Cet embrion devient une gousse oblongue, où les semences sont attachées à la suture supérieure par une espèce de petit cordon ombilical.

Arbre de Judée. *Silicuastrum*, à fleurs rouges & blanches.

Gainier de Virginie.

BONDUC. *GUILANDINA.*

Il y a deux individus, l'un à fleurs mâles, l'autre à fleurs femelles.

La fleur (tant mâle que femelle) a cinq pétales insérés à la gorge d'un calice d'une seule pièce, en cloche, découpé par son bord en cinq segments.

La fleur mâle a dix étamines.

La fleur femelle renferme un embryon, qui devient une gouffe contenant des semences très-dures, séparées les unes des autres par de petites cloisons transversales.

ERABLE. *ACER.*

La fleur est fondée de cinq petits pétales, renfermés dans un calice un peu coloré, découpé en cinq segmens. On voit au centre de la fleur une sorte de placenta convexe, renfermant l'embryon, & entouré de huit étamines. Le fruit est composé de deux capsules, ailées, contenant chacune une seule semence.

Erable de Virginie à large feuille.

Erable à fleurs rouges, de Virginie; mâle & femelle.

Sycomore panaché. *Acer majus, foliis eleganter variegatis.*

FUSAIN. *EVONYMUS.*

La fleur est formée de quatre à cinq pétales, entourés d'un calice plat, divisé en quatre à cinq segmens. Au centre de la fleur paroît l'embryon qui porte les pétales, & un pareil nombre d'étamines. Le fruit représente un

bonnet de Prêtre à quatre ou cinq cornes, & autant de loges, renfermant chacune un pepin coloré & un peu succulent.

MARONIER D'INDE.

HIPPOCASTANUM.

La fleur est formée de cinq pétales & d'un calice d'une seule piece, en tuyau, à cinq dents. Au centre de la fleur, on voit l'embrion entouré de sept étamines. Le fruit est une capsule ronde, coriace, hérissée d'épines tendres, & partagée en trois loges, contenant chacune deux germes, dont la plupart avortent; de sorte qu'il ne vient gueres qu'un seul Maron à maturité.

Maronier d'Inde panaché.

P A V I A.

La fleur a beaucoup de rapport à celle du Maronier d'Inde. Elle en differe singulièrement par l'irrégularité de ses pétales; elle a huit étamines. Le fruit a quatre loges, & sa peau est assez unie.

Maronier à fleurs rouges.

CHEVREFEUILLE

CHEVREFEUILLE

CAPRIFOLIUM.

La fleur est formée d'un seul pétale, dont le tube est fort long, & le pavillon est découpé en cinq lanieres, d'un calice très-petit, & divisé en cinq segmens, & de cinq étamines. L'embrion est posé sous la fleur, & devient une baye à deux loges, terminé par un petit ombilic.

LILAS. LILAC.

La fleur est formée d'un seul pétale en entonnoir, dont le tube est très-long, & le limbe découpé en quatre; d'un calice d'une seule piece en tuyau à quatre dents, & de deux étamines. L'embrion situé au fond de la fleur, devient une capsule à deux loges, dont la cloison est perpendiculaire aux panneaux. Les fleurs sont rassemblées en forme de grappes.

VIORNE. VIBURNUM.

La fleur est formée d'un seul pétale en cloche, divisé à moitié en cinq

G

segmens ; d'un calice fort petit, d'une seule piece à cinq dents, & de cinq étamines. L'embrion est posé sous la fleur, & devient une baye charnue, qui renferme un seul noyau.

Les fleurs sont rassemblées en cimeter, ou fausse ombelle.

CLEMATITE. CLEMATITIS.

La fleur est formée de quatre pétales sans calice : on voit au centre de la fleur plusieurs embrions surmontés de longs styles en plumes, & entourés de quantité d'étamines.

Clematite à fleurs doubles. *Clematitis caerulea, flore pleno.*

ORME, ULMUS.

La fleur est formée d'un calice d'une seule piece en cloche, coloré en dedans, verd en dehors, divisé par son bord en cinq segmens. Au centre de la fleur, on voit un embrion surmonté de deux styles, avec des stigmates velus, & entouré de cinq étamines. Le fruit est une capsule simple bordée d'un feuillet membraneux.

Orme panaché.

ARBRE DE VIE. THUAY.

Il y a sur le même individu deux sortes de fleurs, les unes mâles & les autres femelles.

Les fleurs mâles sont disposées en minets & opposées trois à trois à chaque dent de la rape ou filet commun. Chaque fleur a pour calice un chaton ou petite écaille, qui couvre quatre étamines peu apparentes.

Les fleurs femelles sont disposées en forme de cônes, en opposite les unes aux autres; chaque chaton, ou écaille oblongue, servant de calice, couvre deux petits embrions. Les semences qui en proviennent sont bordées d'ailerons membraneux.

PEUPLIER. POPULUS.

Il y a deux individus, l'un mâle & l'autre femelle.

Les fleurs, tant de l'un que de l'autre, sont disposées en minets cylindriques, chaque fleurette ayant pour calice un petit chaton écailleux, frangé, couvrant un petit nectaire en forme de godet.

La fleur mâle renferme dans son nectaire huit très petites étamines.

La fleur femelle renferme dans son nectaire un embryon, d'où provient une petite capsule à deux loges, dont les panneaux se renversent, & qui contient quantité de semences aigrettées.

Ebénier.

Frênes de plusieurs différentes especes.

Orme.

Noyer.

Plant d'Asperges d'Hollande.

Sumac.

Genest de Portugal.

Acacia-Rose. *Robinia*. *Pseudo-Acacia*, *floribus roseis*.

Différentes especes de Rosiers.

Rose de Provins doubles.

Rose à cent feuilles.

Arbre au vernis, du Japon. *Rhus*.

Vernix.

Mûrier de la Chine.

Chaque fleur a un petit chaton écailleux, qui se couvre au petit nectaire en forme de

On prie les Particuliers qui demanderont des Arbres aux Chartreux, de bien spécifier les especes & les hauteurs des Arbres.

Tous les Arbres fruitiers de toutes especes, en tige, sont à 1 liv. 10 sols.

Tous les Arbres fruitiers de toutes especes, en demi-tige, sont à 1 liv. 5 s.

Les Arbres nains, ou de basse-tige, de toutes especes, à 15 sols; hors les Pommiers entés sur Paradis, qui sont à 10 sols.

Tiges, ou au vent, c'est la même chose de toutes especes, 1 liv. 10 s.

Demi-tige de toutes especes, 1 liv. 5 sols.

Basse tige, ou nain, de toutes especes, 15 sols.

Les Pommiers sur Paradis, 10 sols.

On prie aussi de bien donner les adresses pour les mettre dessus les paquets d'arbres, afin qu'ils arrivent bien à leurs destinations; il s'en perd quelquefois par des adresses mal données.

Il seroit encore mieux que les Particuliers chargeassent quelqu'un à Pa-

ris de faire expédier leurs arbres, leur faire passer, & les payer comptant; il n'en coûteroit pas plus aux Particuliers, & bien moins d'embaras pour nous, sans compter les pertes qui nous arrivent par des mauvais payeurs, qui se moquent de nous quand ils ont la marchandise. Pour obvier à cela, on exigera le paiement comptant, de tous ceux qui ne seront pas connus, & c'est une impolitesse qu'on est obligé de faire pour s'assurer des deniers; il n'y aura que les mal-intentionnés qui s'en trouveront scandalisés.

Il est même bon que les personnes de Province aient à Paris des correspondans qui se chargent de faire expédier les arbres, & acquiter les mémoires: ce qui nous épargneroit les désagrémens de solliciter le paiement des personnes très-empressées d'avoir de bons arbres & peu exacts à les payer.

Cette observation ne regarde point les personnes avec lesquelles nous sommes en correspondance & qui connoissent nos usages.

Lu & approuvé, ce 24. Novembre 1775.
CRÉBILLON.

Vu l'Approbation, permis d'imprimer, ce
25. Novembre 1775. ALBERT.

*Registré la présente Permission sur le Registre
des Permissions de Police de la Communauté des
Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 5033,
conformément aux anciens Réglemens, confirmés
par celui du 28 Février 1723. A Paris, ce
28. Novembre 1775.*

HUMBLLOT, Adjoint.

In der ...
CHRISTOPH ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...





O
2



06
221
D

Les


Ave
d
d

Il

De
P

1868

42



Centimetres

Farbkarte #13

Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/C

