

X 898626

RAR A 202

ORNITHOLOGISCHER

A T L A S

der

aussereuropäischen Vögel

nach

Dr. C. W. Hahn's Werken

fortgesetzt

von

H. C. Küster.

Neuntes Heft.

PAPAGEIEN.

8.

Mit acht fein colorirten Tafeln.

NÜRNBERG,

C. H. Zeh'sche Buchhandlung.

1836.

u +




ABB 8570



Nr. 57.

Psittacus pileatus Scopoli. ♂ et ♀

Psittacula pileata.

Rothscheiteliger Sittich.

Grün, Scheitel, Zügel und Augenrand roth; Flügelrand, Aussenfahnen der kleineren Schwungfedern und der Schwanzfedern blau. Schnabel graubläulich, gegen die Spitze gelblichweiss. Iris graubraun. Beine grau.

Länge $7\frac{1}{2}$ Zoll.

- Psittacus pileatus Scopoli* Annus I. historico-naturalis p. 33. n. 32.
 „ „ *Neuwied* Beitr. IV. 1. p. 247. n. 21.
 „ „ *Latham* Uebersicht übersetzt von Bechstein I. p. 256. n. 113.
 „ „ *erythrocephalus Vieillot* Nov. Dict. t. 25. p. 372.
 „ *mitratus Neuwied* Reise. B. 1. p. 262.
 „ „ *Kuhl* consp. ps. p. 70. n. 122.
 „ „ *Temmink* planches color. 41. 207.
 „ *maitaca Spix* Av. Bras. t. 29. f. 1. ♂ tab. 30. ♀
Psittacula pileata Wagler mon. ps. p. 615. n. 1.
Buffon ois. VI. p. 253. — pl. enlum 744.

Weibchen. Ihm fehlt bis auf ein kleines Stirnfläckchen alles Rothe, der Kopf ist bis über die Augen blau.

Dieser Sittich ist in Cajenne und Brasilien zu Hause und in den dortigen Wäldern keine Seltenheit. Man fängt ihn häufig in Schlingen, auch an Leimruthen werden viele gefangen, wobei ein gezähmter als Lockvogel dient. Sie leben gewöhnlich paarweise zusammen, vereinigen sich jedoch in der kälteren Jahreszeit in grosse Flüge und streichen dann in die offenen Gegenden bis an die Küste.

Nach Exemplaren der Erlanger Sammlung abgebildet.

Nr. 58.

Psittacus Jendaya Linné.

Sittace Jendaya.

Orangeköpfiger Sittich.

Grün, Kopf, Hals und Brust orangegelb, etwas roth gesprenkelt, kleinere innere Deckfedern und Unterleib röthlich; Schwungfedern blau; Schwanz oben gelblichgrün, mit blauer Spitze. Schnabel schwarz, Iris grau, Beine schwärzlich.

Länge 12 Zoll.

Psittacus Jendaya Linn. Gmel. Latham.

Sittace Jendaya Wagler mon. psitt. p. 653. n. 22.

Aratinga chrysocephala Spix Av. Bras. I. tab. 12.

Junger Vogel: Hinterhaupt, Wangen, Hals und Brust

grün; Stirn und Zügel roth, Scheitel orange gelb, Ohrgegend gelb; Unterleib und Bürzel blass scharlachroth.

Psittacus chrysocephalus *Hahn* ausländische Vögel. 14
Lief. t. 1.

„ *auricapillus* *Illiger*. *Lichtenstein*. Berl. Catal.
S. 6.

„ „ *Kuhl* consp. ps. p. 20. n. 12.

„ „ *Newied* Beitr. IV. 1. p. 178. n. 8.

Aratinga aurifrons *Spix* Av. Bras. I. t. 16. f. 1.

Buffon ois. VI. p. 262.

Brisson orn IV. p. 399. n. 91.

Vaterland Brasilien. Sie leben in Gesellschaften von 12—20 beisammen und richten in den Maispflanzungen vielen Schaden an.

Abgebildet nach einem Exemplar der Erlanger Sammlung.

Nr. 59.

Psittacus senilis *Spix*.

Pionus senilis.

Blaubrüstiger Sittich.

Dunkel gelblichgrün, Brust und Mittelbauch violett; Steiss roth; Kopf und Hals blau; Stirn, Kinn und Schnabel weiss, Schwungfedern grösstentheils

wie die Schwanzfedern blau, letztere an der innern Seite roth, Schultern gelblich. Beine blassroth.

Länge 10 Zoll.

Psittacus senilis *Spix* Av. Bras. I. t. 31. f. 1,
 „ *leucorhynchus* *Swainson* Philosof. Magaz. 1827
 p. 438.

Pionus senilis *Wagler* mon. psitt. p. 604. n. 3.

Vaterland Mexico. Münchner Sammlung.

Nr. 60.

***Psittacus acuticaudatus* Vieillot.**

Sittace acuticaudata.

Pfeilschwänziger Sittich.

Grün, Stirne blau; Schwanzfedern am Ende spitzig zulaufend, Innenfahne derselben oben und unten kupferroth, der Schwungfedern grünlichgoldgelb; Schnabel weiss, Iris aussen isabell gelb, innen bräunlich. Beine fleischfarben.

Länge 14 Zoll.

Psittacus acuticaudatus *Vieillot* Nov. Dict. tom. 25. p. 369.

Aratinga haemorrhous *Spix* Aves Bras. I. t. 13.

Sittace acuticaudata *Wagler* mon. ps. p. 30.

Azara *Voy.* n. 278.

Junger Vogel. Dem alten ähnlich, die Stirn heller, die kleinern innern Deckfedern mit röthlichen Federchen gemischt.

Vaterland Brasilien und Paraguay.

Nach einem Original aus der Sammlung zu München.

Nr. 61.

Psittacus haematodus *Linn.*

Trichoglossus haematodus.

Grünbäuchiger Sittich.

Schnabel wachsgelb, schmal. Stirn und Wangen violett, Kehle und Augengegend grün, im Nacken ein gelbes Halsband; Oberleib Flügel und Schwanz grün, Unterleib hochgelb, undeutlich scharlachroth gewellt, Mittelbauch grasgrün, Schenkel und Steiss gelb, grün gemischt. Innere Flügeldeckfedern zinnoberroth, Unterseite der Schwanzfedern gelblich, innen gelb gerandet. Beine dunkel bleigrau, Klauen schwarz.

Länge 11 Zoll.

Psittacus haematodus *Linn. Gmel. Latham* (ohne die Varietäten β . γ . δ .)

„ *capistratus* *Bechstein* in *Latham* Uebers. der Vögel. s. 68. n. 17.

„ „ *Kuhl* *consp. ps.* p. 35. u. 44.

Trichoglossus haematodus *Wagler* *mon ps.* p. 550. n. 7.

Buffon ois. VI. p. 150. — pl. enlum 61.

Le Vaillant p. 96. t. 47.

Brisson ornith. IV. p. 364. n. 72.

Edwards t. 232.

Junger Vogel. Nackenband gelbgrün; Brust gelb, innere Flügeldeckfedern gelb, roth gescheckt; vorletzte Schwungfedern innen ganz schwarz.

Sehr häufig auf den molukkischen Inseln.

Aus der Sammlung zu Erlangen.

Nr. 62.

Psittacus Maximiliani Kuhl.

Pionus Maximiliani.

Prinz Max von Wieds Papagei.

Schnabel gelb, Oberkiefer gegen die Basis schwärzlich, Iris braun. Federn des Hinterkopfs und des Oberhalses rund, schuppenartig, an der Basis weiss, die Spitze grün, Vorderhals und Oberbrust violett. Körper grün, Steiss dunkelrosenroth, Schwanz lebhaft grün, die Aussenfahnen der vier äussern Federn jederseits herrlich ultramarinblau, Innenfahne der äus-

sersten mit einem rothen Fleckchen. Beine dunkelgrau.

Länge 11 — 11 $\frac{1}{4}$ Zoll.

Psittacus Maximiliani Kuhl consp. ps. p. 72.

„ *flavirostris Spix* Av. Bras. I. t. 31. f. 2.

„ „ *Newied Beitr.* IV. 1. p. 243. n. 20.

Pionus Maximiliani Wagler mon ps. p. 603. n. 2.

Azara Voy. 4. n. 287.

Vaterland Brasilien.

Erlanger Sammlung.

Nr. 63.

Psittacus melanotus Lichtenstein.

Psittacula melanota.

Schwarzrückiger Papagei.

Schnabel hornweiss, an der Basis graubrünlich, nackte Augengegend mennigroth, Iris bräunlichgrau; Körper grün, Rücken und Schultern rüschwarz, Weichen wasserblau, vorderer Flügelrand blassroth. Schwanzfedern: äussere roth, mit schwarzem Rand und grünem Endflecken, mittlere grün, vor der Spitze ein schwarzer, herzförmiger Flecken. Beine gelblichgrau.

Länge 5 Zoll 10 Linien.

- Psittacus melanotus* *Lichtenstein* Berliner Museum.
" " *Kuhl* consp. psitt. p. 59. n. 97.
" " *Newwied* Beitrage IV. 1. p. 256. n. 23.
Psittacula melanota *Wagler* mon. psitt. p. 620. n. 6.

Dieser schöne Papagei lebt in südlichen Amerika und ist vorzüglich in Brasilien nicht selten. Er ist gesellig, zieht herum und nährt sich vorzugsweise von Sämereien.

Aus der Sammlung des Herrn Fr. Sturm in Nürnberg.



Pittacus pileatus. Scopoli mas.
N^o 37.








Pittacus pileatus. Scopoli Edem.
N^o 57.






Pittacus Tendaya Wagler
N^o 58.





Faint handwritten text, possibly a signature or date, located below the bird illustration.





Pittacus senilis Spise.
N^o 59





Psittacus carolinensis Vieill.

16. 10.





2/5

Psittacus acuticaudatus Vieillot.

No. 60.





Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly a signature or a name.





Psittacus haematodus Linné.

No. 61.



Faint, illegible text, possibly a signature or title, located below the bird illustration.





3/8

Psittacus Maximiliani Kuhl
No. 62.



William ...
1853





Psittacus melanotus Lichtenst.

No. 63.



INHALT DES BUCHES


1. Einleitung
2. Die Natur der Sache
3. Die Bedeutung der Sache
4. Die Geschichte der Sache
5. Die Gegenwart der Sache
6. Die Zukunft der Sache

Verlag von ...
Leipzig, im Jahre 1900

Dr. H. ...

111





INHALT DES NEUNTEN HEFTES.

Psittacus, pileatus, *Scopoli*, mas. foem.

» Jendaya, *Wagler*.

» Senilis, *Spix*.

» acuticaudatus, *Vieillot*.

» haematodus, *Linn*.

» Maximiliani, *Kuhl*.

» melanotus, *Lichtenst*.

Von diesem Werke erscheint alle Monate ein Heft.

Nürnberg, im December 1836.

C. H. Zeh'sche Buchhandlung.



Nr. 57.

Psittacula pileatus Scopoli. ♂ et ♀*Psittacula pileata.*

Rothscheiteliger Sittich.

Scheitel, Zügel und Augenrand roth; Flü-
 genfahnen der kleineren Schwungfedern
 anzfedern blau. Schnabel graubläulich,
 tze gelblichweiss. Iris graubraun. Beine

1/2 Zoll.

Psittacula pileatus Scopoli Annus I. historico-naturalis p. 33.
 n. 32.

„ *Newwied* Beitr. IV. 1. p. 247. n. 21.

„ *Latham* Uebersicht übersetzt von Bech-
 stein I. p. 256. n. 113.

„ *erythrocephalus Vieillot* Nov. Dict. t. 25.
 p. 372.

Psittacula pileatus *Newwied* Reise. B. 1. p. 262.

„ *Kuhl* consp. ps. p. 70. n. 122.

„ *Temmink* planches color. 41. 207.

Psittacula pileata *Spix* Av. Bras. t. 29. f. 1. ♂ tab. 30. ♀

Psittacula pileata *Wagler* mon. ps. p. 615. n. 1.

„ p. 253. — pl. enlum 744.

„ Ihm fehlt bis auf ein kleines Stirnleck-
 e, der Kopf ist bis über die Augen blau.